



40992 / B

Parasitology - 1953, B. 1000











PHARMACOPŒIA

CASTRENSIS

RUTHEŒA.

---

PETROPOLI

*In Typographia Medica.*

MDCCCVIII.



# PHARMACOPOEIA

CASTRENSIS

RUTHENA.

AUCTORE

*JACOBO WILHE.*

AUGUSTO OMNIUM

RUSSIARUM IMPERATORI

a consiliis Status actualibus, S. M. Archi-Chiriatro, Medicinae et Chirurgiae Doctore, summo rerum medicarum in universo exercituInspectore Consilii medici membro, Ordinis S. Wladimiri tertiae classis Equite etc.

---

PETROPOLI

IN TYPOGRAPHIA MEDICA.

MDCCCVIII.

31279



EXCELLENTISSIMO

a c

ILLUSTRISSIMO

DOMINO

ALEXIO ANDREADI

COMITI

de

ARAKTSCHJEW,

SENATORI,

INTIMI IMPERIALIS CONSILII MEMBRO,

REI MILITARIS ADMINISTRO,

COLLEGII MILITARIS MEMBRO

PRIMARIO,

PEDITATUS SUMMO INSPECTORI,

REI TORMENTARIAE PRAEFECTO,

ORDINUM: S. ALEXANDRI NEVENSIS,

S. ANNAE PRIMAE CLASSISEQUITI, S. IOAN-

NIS HIEROSOLYMITANI COMMENDATORI,

etc.

VIRO DE PATRIA, EJUSQUE IN PRIMIS

MILITARI RE, MERITISSIMO,

LEVIDENSES HASCE PAGELLAS

D. D. D.

AUCTOR.





## PRAEFATIO.

Si non artium modo; sed cunctarum rerum humanarum emolumentum, ex fine, ad quem earum quaeque dirigitur aestimandum est, dubitari omnino haud potest, tanto plus bonae frugis, labores tuendae militum valetudini impensos polliceri, quanto ardentioribus votis, incolumitas exercituum, nullonon tempore exoptata, procurataque fuerit, quantoque probi viri, quibus haec provincia demandata est, finibus suis satisfecerint cumulatius. Inter plurima adminicula, huc facientia, non postremum tenet locum, Castrensis Pharmacopoeia, ad quam Medico-chirurgi, si bene olim, et honorifice in arte, quam profitentur, versari, sibi-que et aliis vere prodesse velint, velut normam, et regulam, curationes suas dirigere queant. Edend-

dae apud nos ejusdem, jam dudum animadverti coepit necessitas, provinciaque vi maneris mei, elaborandae a me fuisset suscepta, ni continuis fere bellis, aliisque ut gravibus, ita permolestis occupationibus, quibus impliciti fuimus, res haec intra voluntatem solum stetisset. Impraesentiarum requiescens tantisper, ut arduum, ita perutilem, hunc laborem AUGUSTI jussu missa cunctatione, subeundum duxi, eoque, qua potui, celeritate, utcunque perfunctus sum. Pharmacopoeia nostra, in duas diducitur partes. Pharmacologia, seu materia medica, priori continetur, simplices medicinas complexa, iis indicatas nominibus, quibus insignitae sunt ab optimis historiae naturalis scriptoribus, qua in re, opera Linnaei, maximae mihi fuere auctoritatis. Descriptiones earundem curatius adornare placuit,

ut praesto esset, velut enchyridion quoddam, quo Medico-chirurgi, per vastissimum orbis terraquei Imperium, dispersi, in locis a Metropoli longe dissitis, deficientibus bibliopoliis, uti queant, idque servato sequenti ordine: primo loco posita est Linnaeana, cujusvis medicamenti, denominatio, vel eorum, qui hujus summi praeceptoris, studium aemulati sunt, a me, loco officinalium hucusque usitatorum, adoptata, hanc excipit antiquata medicaminum eorundem nomenclatio, et vernacula; classium, et ordinum, quum Linnaei, tum naturalium, ad quae referuntur, mentione subjuncta, cum indicatione durationis plantae, solique natalis. Characteres sensus potissimum ferientes saporis, odoris, principiaque activa, in quibus medicamentosa plantae virtus praecipue residet, ut illa nobis chemica analy-

sis pandit, persecutus sum, quo facilius virtus et usus a me descripta, enucleari queant. Hinc inde alimentarias quoque res interserui, quippe quae basin efficiunt, qua maximam partem nititur valetudo, cujusque cognitio non est supervacua, ubi de diaeta, vel laborantium morbis, vel ex iisdem convalescentium, quaestio est. Neque irrefragabilia indicia bonitatis, fraudulentum mangonii, aut illicitae substitutionis, ubi e re fore existinavi, neglectui habui.

Pars posterior praeparata chemico-pharmaceutica, aut methodum eadem parandi, ut etiam ex his et simplicibus composita comprehendit. In hac, illa artificia, quae recentiorum chemicorum solers industria ad medicamina certioris efficaciae paranda detexit, neutiquam praetervidi; in eo autem non ulti-

ma cura versabatur, ut medicamina haec talia essent, quae perfacile parari a quovis possent, neque raritate, aut caritate sua expetentium desideria, nostramque frustrarentur intentionem, ideo parsimoniae gratia, praeposui ubique fere indigena, modico pretio venalia, easdem facultates habentia, exoticiis; quorum etiam succedanea, hinc inde, notavi. Composita iis solis nominibus definita sunt, quae jam apud luculentissimos hujus aetatis scriptores invaluerunt, ad scientiae usus adcommodatissimis. Ad evitandam nempe titulorum verbositatem, denominationem a praecipuis tantum partibus mutuatus sum, unde vires et usus eorundem pendent, verbo compositionum in omnibus is servatus est modus, ut ab aliarum gentium recentioribus Pharmacopoeis Ruthena haec, quantum quidem fie-

ri potuit, non recedat, curaeque mihi in primis fuit, ut formulae, huic fundamini innixae, sint tam numerosae, ut publicae necessitati respondeant, suaque puritate, quam salutifera ars cum reliquis saeculi praesentis communem habet, se commendent. Doses in omnibus notatae sunt, ut in re tanti momenti exercitibus salutiferam artem omne abesset errandi periculum; in designandis vero iisdem, placuit interdum a primis puerorum aetatulis, ad maturissimum robur, indicare praebia. Neque vero est, quod mihi unus, et item alter, hinc reclamet, illinc insusurret; quid vero tandem Clinico opus est nomenclaturae recentioris, quam pro mineralibus praeparatisque chemico-pharmaceuticis lubens adoptavi, cognitione? malui nempe, (licet non immemor sim, non facile mutari pos-



se, quae semel inculcata sunt) cum praejudicatis luctari opinionibus, atque in offensam obstrigillatorum incurrere, mordicus ea, quae longa consuetudine perceperunt, tenentium, quam inconditam terminorum barbariem, quae apud nos invaluit, atque multorum animis tam pervicaciter insidet, retinere; non enim temere quemquam in scientiarum adyta admissum, fugere potest, nil in vita humana adeo noxium censi debere, quam tironum mentes his imbui, quae operae pretium fuerit aliquando dediscere, et quidem multo majori opera, quam ea, quae recta sunt, vel a primis rudimentis, addiscere. Nomenclaturae recentioris, omnino philosophicae, tum elegantiam et pulchritudinem, quum utilitatem, atque adeo usum ejus apprime necessarium esse, nemo non, etiam, me tacente, perspicere potest,

et quum proximis annis, non modo strenuissimos nacta sit vindices, et propugnatores; sed etiam ab Edinensibus, non ingenio magis, quam industria spectabilibus, recepta sit, nullus dubitavi laudabilibus his insistere vestigiis; commendabilior enim mihi visa est, praecisa lingua, ratioque, qua medicinarum denominatio, potius a partium constituentium natura, quam virtute medicamentosa peteretur. Quae in nominibus, tum in rebus ipsis adhuc novari expediet, id posteris relinquo, quos spero, pro ratione incrementorum, quae medicina ars, chymicaque, procedenti tempore capiet, e scientiae progressibus optime profecturos.

Quum ars salutifera, hoc tempore, in diversas, easque plurimum inter sese dissentientes sectas diducta sit, singula aestimatione justa

metiri, in diversum abeuntia inter se conciliare, veraque a falsis ubique discernere proclivius est dictu, quam factu. Nullam ulli ratiocinationi, utcumque speciosae, cui experientia refragatur, fidem adhiberi posse, et antiquissimum est monitum, et recentioribus non improbatum, satius proinde duxi, nonnulla a veteribus non male prolata, atque etiam ad patrum fere nostrorum memoriam, non sat bene intellecta, ad incudem rationis, et experientiae vocare, atque, quae mihi meliora videbantur, consulere, quam memet ephemeris evanidisque novatorum theoriis mancipare.

Optimi cujusque ex priscis illis, sapientiae \*) consultis praecepta cum novis accessionibus probatis, arctissima colligatione devinciendo,

---

\*) Primo medendi scientia sapientiae pars habebatur. CELSUS.

pro ingenii mei parvitate, proposui. Nullus dubito quin aliquam contraxisse culpam videbor, quod sacculo antiquitatis fastidioso, a veterum placitis immensum discrepante; novitatis vero omnis cupidissimo, illi quoque (antiquitati) non malae praeceptrici, nonnulla, magis pro veritate, quam novitate militans, censuerim tribuenda, neque reformido animi acerbitem, quam forsitan prodituri sunt obstrigillatores; tantum enim abest, ut censoria eorundem virgula, ad indicendas similitates accendar, ut potius, si quid meliora edocto utilitatis capere liceat, submissis disciplinae fascibus (mitiora enim nobis Deus pectora inspiravit) eorum animadversionibus, perlubenti corde atque animo, utar, gratusque nomen, per quos proferam, enunciaturus sim. Si quis me ideo arguendum existimarit, quod

in vario plerarumque medicinarum usu designando, plures quandoque morbos, quam qui locum sibi adsignatum tueri queant, adduxerim, laudatis remediis vix medicabiles, eum ad luculentos scriptores, ad quorum auctoritatem provocandum duxi, causam suam tutaturos, relego; vix enim, arbitrato meo, aliunde necessaria de virtutibus eorundem certitudo aptius petitur, quam ex adversariis Clinicorum, non minus artis experientia, quam doctrina celebrium.

Perspicuitatis potissimam rationem ducere conatus sum, etsi non negarim, quaedam reperiri vocabula artis propria, quae aliquid habeant obscuritatis; ast haec apud recentissimos quoque scriptores medicos, ut Ploucquetum etc: inveniuntur. Nonnulla antecessorum nostrorum credulitate intrusa recidi, plurima no-

va, vel propria experientia, vel attestationibus magnae existimationis virorum probata, in hanc recepi pharmacopoeiam, qua in re, si nimis diligens fuisse videbor, excusatius a me peccatum putabo, quam si parum; satius enim duximus, copia premi, quam penuria. Omnium antiquatorum, apud nos hucusque usitatorum, ut et recentiorum, tum nostrorum, quum in pharmacopoeis ceterarum gentium, puta Edinburgensi, Londinensi, Borussica, etc: a capite ad calcem libelli hujus repperitiorum, amplum adnexui indicem, ne neoterice dicta, difficilia intellectu, negotium quaeritantibus facessero, in primis tironibus, et Medico-chirurgis militaribus, quorum in primis commoditati, utilitatique consultum volui. Duo catalogi ad calcem operis indicant medicaminum praestitutorum quantitatem,

vel e pharmaceuticis caesareis officiniis promendorum, vel a praefectura militari comparandorum.

Si acerrimorum, tum ingeniorum, quum latinitatis aestimatorum, teretes aures, atque Latii sermonis suavitate religiosas permulcere non potuerim, diligentioremque purioris linguae cultum neglexerim, (quod equidem lubens illis concessero) vel hinc inde mendas, quae inter continua jugiter avocamenta irrepere, non evitaverim, (id quod evenire potuisse non negarim) hos admonitos velim, atque etiam obnixe oro, ut memores sint, ea nos conditione natos esse, ut ob rerum humanarum, quam, et in me sentio, imbecillitatem, nihil, quod homini accidere possit, recusare debeamus. Ad postremum ipse ultro, lubensque confiteor communem mihi in omnibus plausum, neutiquam compe-



tere quemadmodum nec eundem captare unquam laboravi, id duntaxat in lucro adponam, si quando constiterit, me in plerisque haud poenitendam collocasse operam. Id nempe volebam, quidquid a me praestitum est, in gratiam Medico-chirurgorum esse susceptum, qui quam, ut his utantur recte, et hinc capiant fructus, nil mihi optatius est, non mediocre relatuero pretium, si haec conamina, nullo impensius merito, quam intemerato reipublicae studio, commendabilia, in generis humani emolumentum, in conflictantium salutem, et salutiferae artis quaecunque apud nos incrementum cesserint.

---

## PONDERA ET MENSURAE

### PHARMACEUTICAE.

Pondera in pharmaceuticis Ruthenorum officinis usitata a castrensibus quoque Pharmacopœis observantur, eorumque hæc est ratio:

Granum (gr. j.) pondere granum pipe-  
ris æquat.

Scrupulus ( $\gamma$ j.) grana viginti continet.

Drachma ( $\gamma$ j) scrupulos tres habet.

Uncia ( $\gamma$ j.) drachmas octo recipit.

Libra medicinali ( $\text{℥}$ j) pondus unciarum  
duodecim continetur.

Bilibra, duplum præcedentis habet.

Semis ( $\beta$ ) est medietas alicujus pon-  
deris, ut selibra ( $\text{℥}\beta$ ), semuncia ( $\gamma\beta$ ), se-  
midrachma ( $\gamma\beta$ ), bilibra cum semisse  
( $\text{℥}\text{ij}\beta$ ).

Sesqui est totum, et dimidium, ut se-  
squilibra ( $\text{℥}\text{ij}\beta$ ), sescuncia ( $\gamma\text{ij}\beta$ ).

# T A B U L A R A T I O N E M P O N D E R U M S I S T E N S.

	Libra.	Seli- bra.	Uncia	Sem- uncia	Drach- ma.	Semi- drach- ma.	Seru- pulus.	Scru- pulus semis	Granum.
Granum .....	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Scrupulus semis..	.	.	.	.	.	.	.	1	10
Scrupulus .....	.	.	.	.	.	.	1	2	20
Semidrachma ....	.	.	.	.	.	1	1 $\frac{1}{2}$	3	30
Drachma .....	.	.	.	.	1	2	3	6	60
Semuncia .....	.	.	.	1	4	8	12	24	240
Uncia .....	.	.	1	2	8	16	24	48	480
Selibra .....	.	1	6	12	48	96	144	288	2880
Libra .....	1	2	12	24	96	192	288	576	5760

Hæc pondera liquidorum portionibus æque, ac solidorum determinandis inseruiunt. Pro liquidis quidem, et in primis aquosis mensurandis vasa adhibeantur idonea, quæ ita facta sint, ut libra, et uncia, pondere respondeant, libræ medicæ divisionibus.

Mensuræ pro medicaminibus siccis; præsertim vero herbis, hucusque apud nos usitatæ, sunt sequentes:

Fasciculus est moles, quæ brachio complicato capitur, manipulos, præter propter, duodecim æquiparans, selibræ æqualis pondere. Alii, fasciculi nomine, unciam pondere intelligunt.

Manipulus est moles, quam manu complecti possumus, pugillis quatuor, vel semunciae æquivalens.

Pugillus est moles, quæ pollice, et duobus digitis capi potest, cum drachma æquiparabilis.

Ast hæ mensuræ sunt omnino vagæ, ut proinde satius sit, sicca æque ac liquida, pondere potius, quam mensura præscribere, ita quidem, ut loco cyathi unciae duæ,

loco cochlearis semuncia,  
..... pintæ unciaē sedecim,  
..... mensuræ libræ quatuor, etc.  
aptius sumi queant.

---

# T A B U L A ,

remediorum præbia, cuivis ætati convenientia, indicans, supposito, quod drachma cujuslibet medicinae sufficiat adulto, cujus ætas a vigesimo primo sexagesimum haud excessit annum.

<i>Ætas.</i>	<i>Dosis in genere sumpta</i> 5. j.	<i>Dosis relata ad ætatem.</i>
7 Hebdomad.	.... $\frac{1}{12}$ ....	.. gr. iv.
7 Mensium.	.... $\frac{1}{12}$ ....	.. gr. v.
14 .....	.... $\frac{1}{8}$ ....	.. gr. vijβ.
28 .....	.... $\frac{1}{6}$ ....	.. gr. xij.
3½ Annorum.	.... $\frac{1}{4}$ ....	.. gr. xv.
5 .....	.... $\frac{1}{3}$ ....	..... θj.
7 .....	.... $\frac{1}{2}$ ....	..... 7β
14 .....	.... $\frac{2}{3}$ ....	..... θij.
21 Annorum.	Dosis integra	..... 5j.
63 .....	.... $\frac{1}{12}$ ....	.. gr. Lv.
77 .....	.... $\frac{5}{6}$ ....	.... θijβ.
100 .....	.... $\frac{4}{6}$ ....	..... θij.

NE. Animadversione dignum est, sexaginta guttas aquae, 100 Alcoholis diluti, vel 120 Alcoholis, drachmae mensurae, aequiparabiles esse.

## M O N I T A.

Solum natale vegetabilium notandum est; constat enim aromaticas odoriferasque plantas, e siccis eminentibusque locis, radiisque solaribus expositis, legendas esse, ita Valerianae sylvestris radix natales imo solo udoque debens. est fere cassa virtute, et monticolae merito postponitur.

Sylvestres etiam plantæ domesticis præferuntur, ita Cichorium Intybus, Daucus, etc. exceptis tamen plantis, quas experiundo didicimus plus odoris, efficaciamque cultura mutuari, ut id in plerisque omnibus labiatis plantis, aut didynamia gymnospermia Linnæi, observare licet, puta de Mentha, Salvia off. etc.

Jure etiam, haud raro, præponuntur partes recentium plantarum, aridis exhaustisque, quod in primis de his intellectum volumus, quarum activa principia e saponaceis partibus coalescunt, ut in Cichorio Intybo, Leont: Taraxaco, etc. Huc spectant cumprimis cruciferae, et ad tetradynamiam pertinentes, ut est Sisymbrium Nasturtium, etc: Colligi eas oper-



tet coelo sudo, et sereno, tellure videlicet, sole jam orto, neutiquam rorescente. Radices annuarum plantarum, legendæ sunt accedente efflorescentia proxime; biennes vero, et perennes, verno, vel urgente necessitate, autumnali tempore. Hoc autumnii tempore caules resecandi sunt, quippe qui tunc efficaciori succo præditi sunt. Ligna ineunte vere scindenda sunt. Herbae antequam flores explicuerint; folia vero postquam emiserint flores; sed ante istorum maturitatem colligantur. Flores nuper expansi decerpantur, antequam antherarum pollinem exploserint, simulac radii solis rorem dissiparint. Semina denique, ubi pericarpia aridiora, maturescentia jam sese explicare incipiunt, vel quum eadem, præsertim nuda, sponte, vel saltem leviter tecta secedunt, lecta, loco ab aere perflato, sine ignis adminiculo, siccentur; capsulas, involucra, etc. retinentia, his munita servantur. Delectus eorumdem, ita habendus est, ut aquæ supernatantia rejiciantur; fundum vero petentia, iterum siccentur.

Baccæ nisi maturæ, non avellantur.

Sedulo autem enitendum est, ut herbæ, et folia colligantur, dum virent, et antequam emarcuerint, aut arida, ubi odoraria sunt, odore gaudeant sibi proprio; folia vero plantarum mucosarum legantur juniora succulenta. Ligneæ radices, antequam exsiccentur, lignea parte priventur, quæve crassæ, succulentæque erunt, in segmenta scindantur. Omnia hæc, æstivo tempore, radiis solaribus, exponantur, donec siccabuntur, quo periculum fermentationis, et marcescentiæ vitare queant; calor tamen immoderatus alienus est. Flores pene omnes siccandi, conservandique sunt absque eorum calicibus, exceptis aromaticis, et classis didynamiciæ gymnospermiciæ, quorum medicamentosa virtus, in calicibus continetur. Semina succulenta, atque oleo abundantia, debent esse recentia, nequaquam rancida, et bene nutrita; farinacea autem arida, integra, etiam rite nutrita esse debent, nec corticem habere levem, fragilem, perfacile divisibilem. Continentia essentielle oleum sint recentia, plena; insipida vero, et inodora, vacua rejiciantur.

In universum non vegetabilium solum, sed et animalium partes, præsertim indigenæ in aridis conserventur locis, suis quæque bene clausis receptaculis, præsertim vitreis, quoad maximam partem, si fieri possit, ne aut mucore, aut teredine lædantur. Aromate autem, et principio acri volatili præditæ, non arido solum loco; sed, et frigido servandæ in vasis plerumque, pro aromatis quantitate, vel alterius principii, hermetice clausis.

---

#### HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

Herbæ et flores vel hypocausti, vel communis foci, leni calore, siccentur, quantitate, qua id perfacile fieri queat; nam ita vires earumdem aptissime servantur, cujus indicium color est natus, quam perfectissime constans; Conii vero maculati folia, et alia subtili materie volatili referta post exsiccationem illico conterantur, et vasis vitreis rite obturandis reponantur.

Simplicium medicamentorum, et facultatum, quae in eis iusunt, cognitio, ita necessaria est, ut sine ea nemo rite medicari queat. Oribasius.

Omnes boni medici ad ea remedia semper confugient (sive modus, quo prosunt intellectus fuerit, nec ne?) quae certa experientia prodesse comprobaverit, et ab iis abstinebunt, quae eadem experientia, nocere, aut nil prodesse, ostenderit. Tantum enim prodest scientia medica, quantum ad bona remedia bonamque curationem perducat, neque profecto, aut leges philosophandi, aut quidem sensus communis, sinunt fidem adhibere ulli ratiocinationi, utcumque speciosae, cui experientia adversatur.

GREGORY Consp. Medic. theoret.

P A R S   P R I M A

P H A R M A C O L O G I A.



НВ. Прежде приступленія къ чтенію Фармакопей благоволятъ со вниманіемъ просмопрѣть  
опечатки и исправитъ какъ ниже означено.

# ERRATA.

# LEGENDA.

P a g.		
1	accomodatissimum . . . . .	accommodatissimum
17	paecipue . . . . .	praecipue
27	Absynthium . . . . .	Absinthium.
32	Ipecacuanhae . . . . .	Ipecacuanha.
49	Buttlero . . . . .	Buttero
96	adscedendo . . . . .	ascendendo
110	sal. . . . .	sal
126	nasolida . . . . .	na solida .
126	Laryx, Larycis . . . . .	larix, laricis
—	Oleum . . . . .	Oleum
147	Sassaparillae . . . . .	Sarsaparillae
156	poliriquesc se . . . . .	polirique se
—	ponderosa, . . . . .	ponderosa
179	retorda . . . . .	retorta
183	ncsmo . . . . .	cnesmo
184	draehmas . . . . .	uncias.
202	aetherius . . . . .	aethereus
207	sub-carbonati . . . . .	Sub - carbonatis
223	sat . . . . .	sat.
227	decimam . . . . .	quintam — lin. 22.
234	althaeae . . . . .	althaea
236	aquaes . . . . .	aquae
253	fixus . . . . .	fixus ;
262	auxillio . . . . .	auxilio
274 - 319	utriusquae . . . . .	utriusque
278	Calcis. . . . .	Calcis
287	putestcenti . . . . .	putescenti
306	lenimen . . . . .	lenimen
311	Carbonatis . . . . .	Sub - carbonatis
317	seminuum . . . . .	seminum
319	Hydrargyry . . . . .	Hydrargyri
322	amenuorrhoea . . . . .	amenorrhoea
350	Murias. . . . .	Murias
356	subsiderint . . . . .	subsederint
391	Alcoholci . . . . .	Alcohol
450	1 Mortaria . . . . .	2 Mortaria
(Ubique)	Polygamia superflua . . . . .	Superflua.
— —	Europea . . . . .	Europaea





# PHARMACOLOGIA.

---

## ACIDUM ACETICUM DILUTUM IMPURUM.

*Acetum crudum. Acetum commune. Acetum  
vini. Уксусъ.*

Acidum aceticum impurum ex quovis vinoso liquore fermentationi acetosæ sub-  
jecto, calore (65 ad 75 Fahrenh.) apto,  
parari potest. Dum sincerum est, debet  
esse limpidum, purum, gustatu et odore  
gratum, tantæque aciditatis, ut duæ un-  
ciæ ad saturandam perfecte Subcarbona-  
tis Potassæ drachmam sufficient; quod  
majori quam quadragesima sui parte al-  
calinis saturatur salibus, pro effoeto iner-  
tique habetur aceto. Congelatione et de-  
stillatione cum pulvere carbonum obtine-  
tur ex acido acetico impuro, purius et  
decolor acidum, quod saporis acidi, gra-  
ti, odoris refocillantis merito præfertur il-  
li, multas aqueas particulas, et extracti-  
vum principium continenti, usuque me-  
dico maxime idoneum est, atque inter om-  
nia acida organismo animali accom<sup>o</sup>odatis-  
simum.

*le* Est in genere stimulans lene remedium, quod perinde, ut est ejus quantitas, pro-ut acrius aut dilutius fit, plus minus cum aliis corporibus permistum mutantur ejus effectus; aliquando etiam prorsus contrarii sunt; nec qualitati ejusdem adstringenti terminos aliter præscribere licet quam hac observata regula: quo dilutius aut tenuius est, aquæ aut similis liquoris mistura, eo magis refrigerans et debilitans fieri acetum, e contrario quanto magis illud concentratur et compingitur, tanto magis calefaciens reddi, atque adstringens. Effectus proinde ex ratione intensitatis ejusdem majoris vel minoris, caloris, auxiliarium partium ut e. gr. aromaticarum, æstimatur; pro horum modo excitat sudorem, interdum alvum liquat, rarius lotium movet; adstringendi atque pronitati in putredinem, ut usu cognitum est, resistendi vim habet; præterea in contenta aqualiculi imo et in ipsos humores chemice agit; cibis additum, stomacho aptum est; usu tamen ejus continuo et immodico ineptus devenit is ad ullam eduliorum portionem digerendam aut retinendam. In omnibus fere febribus in-

inflammatoriis præscribere illud antiquiores: in synocha cum vel sine topica inflammatione, ut etiam in reliquis sthenicis morborum formis, est omnino aptum medicamen, quatenus propinatum dilutius processui vegetationis officit, sthenicum statum deprimit, atque totum debilitat organismum, ventriculo (diutius in usum tractum) insidias struendo. Febris asthenicis minoris gradus, calore, sitique stipatis, si potui detur, non obest, præcipue si stimulantia eidem, pro ratione debilitatis, adcommoda fuerint adjuncta; in plerisque casibus, ubi propensio humorum in putrefactionem et corruptelam oboritur, ut in febris vulgo putridis dictis, aliisque huc spectantibus morborum formis, ut scorbuto etc. utile est, et chemice agendo adinstar cæterorum acidorum, si fortius detur, corruptelæ huic adversatur, adjutum præsertim excitantibus pepticis, nutrientibus adminiculis. In febris biliosis, accumulatis in intestinis et ventriculo rancidis et bili corrupta, quæ illico penitus evacuari nequeunt, nullum citius ea superat, atque indolem eorum commutat, quam acetum, ut minime mirum sit car-

dialgiam, choleram, tenesmum, CELSUS, singultum, GALENUS, medelam ab hoc accipere posse, existimari, idemque adstringentibus alvum medicamentis ab antiquis adnumerari solere, HIPPOCRATES; — ast et in febribus biliosis ratio habenda debilitatis, irritantibus pro re nata aliisque congruis curandæ. Contra lumbricos, ut CELSO placet, adhiberi posse vix crediderim. Nullum adeo universale alexipharmacon contra venena laudant antiquiores ac acetum, præcipue contra papaveris somniferi, conii maculati succum, atque aspidis et canis rabidi morsum, et similia, DIOSCORIDES. Si aceto gargarizetur, tollitur valida illa ex atropa belladonna contractio; (Ephemerid. german.) in peste quoque effectus ejus insignes celebrarunt omnes, qui eadem correptis id exhibuerunt, SENNERTUS. *Extrinsecus* quoque pro diverso caloris gradu aliisque additamentis agit varie.

Exhalationum aceti usus, adhuc apud medicos perstat; imprimis vero concentratum acetum ad refocillandos defectione animi, asphyxiaque laborantes aptum; epithemata ex impuro aceto, et calida et

frigida superdantur, præsertim frigida ad imminuendam ad caput sanguinis congestionem, aliasque partes, ad avertendam sub initio inflammationem; cephalalgiae ita admotum, lenimen præstat, hæmorrhagiam narium sistit, uti etiam magni æstimatur a prægnantibus mulieribus dum metrorrhagiæ metuunt; sic ad mortis metas lochiorum nimio fluxu perductis, eas involvere linteis oxycrato madefactis celebre CHAPMANNI remedium fuit; fomenta calida cum alcohole diluto, aromaticis herbis, camphora etc. in putridis sic dictis febribus, pectori, abdomini, extremis partibus imposita valent. Nec in contusionibus, ecchymomate, imo etiam in frigidis tumoribus etc. irrita. Clystere etiam injecto subterdatur in typho, dysenteria asthenica, obstipatione, herniis incarceratis, aut ascaridibus rectum intestinum occupantibus. In Pituitosis glandularum mucosarum oesophagi et amygdalarum infarctionibus, gargarisma præstans est acetum, paulum dilutum, sic etiam in angina asthenica, stomacace, aphthis; vis synapismorum adjecto eodem, intenditur.

Dum de acido acetico diluto nobis sermo est, acetum destillatum; quum vero de impuro, tum acetum vini in sequentibus intelligimus.

PRAEP. *Acet. camphorat.* — *scillites.* — *Acid. acetic. dilut.* — *Oxymel etc.* ingreditur quoque *Acetat. plumbi crystall.* — *Cataplasmata: acetat.* — *Conii m. ammoniat.* — *Nicotianae T. Synapinum acre et mite.* — *Clyst. acetat.* — *Fomenta: aluminos.* — *vulnerar. aliaque.* — *Gargarismata varia.* — *Haust. acid. carbonic. evolv.* — *Mist. nitrat. potass.* — *Mist. subcarbonat. potass.* — *Serum lact. acetos.* — *Solut. acet. plumbi* — *Solut. acet. ammon: acetatam. etc.*

## A C I D U M   A R S E N I C O S U M.

*Oxydum Arsenici album. Hyperoxidum Arsenici. Arsenicum album.* МЫШЬЯКЪ.

Dum sublimando paratur, massam scoriformem, albam, subpellucidam compactam refert; tempore vero opacam. Carbonibus inspersum, adinstar fumi avolat, odoreque Allii s. se prodit. Cæterum inodorum, Saporis vero dulciculi, dein acriculi, inflammantis tandem.

Us. Mineralium venenorum est valentissimum, nec nisi cautissime adhibitum ad-

versus febres intermittentes commendabile; epilepsiæ quoque, pertussi, anginae pectoris et melancholiæ opponitur; in Indiis orientalibus adversus hydrophobiâ cum successu exhibebatur. In morbis cutaneis refractariolis, ut herpetibus etc. cum sulphure sublimato in carcinomate externe, et interne, THILENIUS, RAENNOW, etc.

Antidota ejusdem sunt: olea, lac, solutio HAHNEMANNI saponacea, quæ partem saponis et quatuor partes aquæ habet, atque tepefacta, tertio vel quarto quoque minuto, sumitur.

Acetum quoque recte opponitur eidem; Hydro-sulphuretum vero Potassæ vel sodæ, quum tardius agat, minus aptum; atamen commendabile.

Dos. Pro usu interno, aqua plus vel minus pro re nata diluenda, ab una decimaquarta parte grani, gradatim augendo ad septimain usque ejusdem partem.

PRAEP. *Solut. acid. arsenic. et Nitrat. potass.* — *Solut. arsenit. potass.*

# ACHILLEA MILLEFOLIUM.

Тысячелистникъ, Гулявица, Деревей.

Folia, summitates florentes.

CL. Syngenes. O. Polygam. superfl. O. N. Compositæ radiatæ. Perennis, in locis siccioribus et ad vias passim occurrens.

QUAL. In volatili oleo, et extractivo amaro residens. *Sapor* herbæ, subadstringens, nonnihil amarus, subaromaticus.

V. Leviter stimulans, stomachica.

Us. In sanguinis profluviis, ut hæmoptysi, hæmorrhoidali fluxu nimio, СТАНЛ; hæmorrhagia uteri, ТНОМАС; profluvio sanguinis per anum e nixu cacaturientis nimio; in phthisi pulmonali; succus quoque in internis ulceribus, СНОМЕЛИО placet. Non sunt tacito prætereundæ СТАНЛИИ laudes, quas plantæ huic in curatione hypochondriaci mali adstruit, subscriptibus dein HOFFMANNO, HEISTERO, IUNKERO aliisque.

*Extrinsecus* admota, pro vulneraria habetur. Commista cum aromaticis fomentis, vulnera et ulcera curat.

*In compositionem Specierum turionum Pini compositarum intrat.*



ACONITUM NEOMONTANUM WIL-  
DENOW, (perperam sub nomine A. NA-  
PELLI a СТОЕРСКІО introductum) Про-  
стрѣльная трава, Борецъ, Преградъ, Лю-  
шикъ. Folia, Herba.

CL. Polyandr; O. Trigyn. O. N. Multi-  
siliq. Perennis pl. in australibus Rutheni  
imperii provinciis obvia.

QUAL. Ejus venenifera, acri principio  
contenta, ipso *Odore* nauseoso fortique,  
et acri *Sapore* cognitu perfacilis.

V. Stimulans, sudorem lotiumque mo-  
vens, narcotica.

Us. Rheumatalgia chronica; arthrody-  
nia, syphilis, et inprimis exostoses; psora;  
herpes; scrofulæ; spina ventosa; amauro-  
sis; ulcera, quæ cacoëthe vocant, ob-  
stinata; scirrhomata; anchyloses; mania;  
febres intermittentes, et inprimis quarta-  
næ, contra Cinchonam off. immorigeræ;  
morbi convulsivi etc.

Dos. Pulveris, granum ad duo.— Suc-  
ci spissati granum, sesquigranum, ad duo  
grana bis, ter, vel pro re nata pluries de  
die, vel additis singulo Aconiti grano, de-  
cem granis Sacchari, vel forma pilularum.

Planta recens, radixque ejusdem incaute sumpta debilitatem, paralyisin artuum, motus faciei convulsivos, vomitiones biliosas, catharsin, vertiginem, insaniam, asphyxiam, et tandem ineluctabile fatum post se trahit.

Succus ejusdem ad extracti spissitudinem densatus, anno vetustior, sensim vires suas perdit ita, ut inertiae merito redarguatur; regula proinde esto, hanc plantam, ubi recens est, et succum ejusdem spissatum, caute, nec nisi, ut dictum est, minoribus dosibus praescribi debere sensim sensinque ad auctiores trans-eundo.

PRAEP. *Succus herbae recentis junioris (vulgo extractum) spissatus, inclaruit.*

## A C O R U S C A L A M U S.

*Calamus aromaticus.* Касашикъ. Ирѣ. Radix. (geniculata, spongiosa, crassitie pollicari, extus rubens, intus alba).

CL. Hexandr. O. Monogyn. O. N. Piperit. Perennis, in Russia australi spontanea.

QUAL. *Saporem* prae se fert aromaticum, acriculum, subamarum; *Odorem* dissecta fragrantem.

V. Præstans: stimulans; peptica; antiseptica.

Us. Morbi asthenici: cacostomacha indigestio; fastidium cibi; scorbutus; stomacace (marcescentium gingivarum vitium), et id genus alia; — Pro succedaneo cæterorum majoris dispendii aromaticorum merito habetur.

Dos. Pulveris radice scrupulum—drachma cum saccharo ter, vel pluries de die, vel aliis medicinis subsidiariam opem præstat.

PRAEP. *Infusum radic* — *Tinct. ejusdem*. — ingreditur quoque *Pulv. aromat.* — *Pulv. supersulphat. Alum. et Potass.* — *species Turionum Pini comp.* — *Tinct. Cinchonae comp.* — *Tinct. Gentianae comp.*

## ADEPS OVIS ARIETIS.

*Sevum ovile, S. vervecinum.* Баранье сало.

Pinguedo solida, ex omento atque adiposis capsulis, præsertim renalibus, et lumbaribus animalium horum eliquata.

Adhibetur ad usus *externos*; ast communius ad paranda unguenta, linimenta, emplastra, etc. Huic, si rarius est, aut majoris dispendii, sebum bovis recte sub-

stituitur, aut plerumque adeps Suis Scrofae.

## ALLIUM CEPA.

Radix recens, ejusque succus. Лукъ.

CL. Hexand. O. Monogyn. O. N. Liliaceæ.  
Biennis, colitur crebro in hortis.

QUAL. Recentis: *Odor* peculiaris allia-  
ceus dictus, volatilis. Radix recens, dissec-  
ta vapores lacrymas excientes spargit.  
*Sapor* acriculus, subdulcis.

V. Stimulans; pituitam, sudorem, lo-  
tiumque movens; rubefaciens; aphrodisia-  
ca; radicis coctæ: emolliens; pus matu-  
rans; assatæ: stimulans.

Us. Præter cibarium, hydropicis, asciti-  
cicis, imo calculosis profuisse perhibe-  
tur. Eduliis addita in coërcendo scorbuto  
valens. Succus radicum expressus ad ali-  
quot uncias cum tantillo sacchari mistus  
in retentione lotii profuit.

*Externe* difficultati auditus, otalgiae rheu-  
maticæ, sonitui aurium gossypio excep-  
tus aurique inditus, ineditur. — Radix,  
forma cataplasomatis in pulpam cocta et  
cum emollientibus regioni vesicæ super-  
data, retentioni vesicæ profuit. Nec in bu-

bonibus, varicibus ani, cataplasma e cepe, sua laude orbandum.

## ALLIUM SATIVUM.

*Allium.* Radix recens, ejusque succus. Чеснокъ.

CL. et O. Præcedentis. Perennis; colitur in hortis frequentissime.

QUAL. In acri principio paucoque volatili oleo residens. *Odor* specificus ingratus, penetralis, volatilis ita, ut sponte in majori quoque oeco diffundatur; *Sapor* acer, subcausticus.

V. Præstans: stimulans; pituitam, sudorem, lotiumque movens; anthelminthica; pus maturans; rubefaciens; antiscorbutica; vesicans.

Us. Radicis, vel succi, *internus*: hydro-  
pisis; tænia solium LIN.; lumbrici; dys-  
pepsia; asthma pituitosum; febres quar-  
tanæ; — In tussi catharrhali sine febre,  
Allium lacti incoctum ad libram mane et  
vesperi potui datum, teste MURRAY, pro-  
fuit. Est inter exempla Allium S. pestilen-  
tiæ oppositum fuisse, imo calculosis quo-  
que subvenisse. *Extrinsecus*: succus, her-  
petibus, clavis, auditui gravi proficiuus,

haud secus ac contusa radix, et cum suilla adipe imposita, verrucas extirpare fertur; cataplasma ex eadem variolas atonicas confluentes retrogradas teste SYDENHAMO revocavit, nec minus profuit pubi admotum in retentione lotii a paralyysi urocystidis orta.

PRAEP. *Pilulae Allii sativi*; succus etiam *clysteri aloëtico* jungitur.

### A L O E P E R F O L I A T A.

*Aloë Socotorina.* Кабъръ. Succus extractivo-resinosus spissatus.

CL. Hexandria. O. Monogyn. O. N. Liliac. Perennis Indiae orientalis Africaeque incola. Quoniam succus incisione foliorum, in SOCOTORA, oceani orientalis insula, obtentus, cæteris bonitate præstat; ideo Aloë Socotorina in medicum usum merito præfertur, præsertim, quæ splens, pellucida, et nigro rubea est, minutaque colorem ex aureo fulvum exhibet.

QUAL. Præstans: in extractivo; non vero, ut quidam falso opinantur, resinoso, sita principio. *Saporis* amaro nauseosi; *Odo-*  
*ris* submyrrhini.

V. Peptica, calefaciens, cathartico-anthelminthica, menagoga, in vasa præcipue hæmorrhoidalia agens.

Us. Alvus adstricta habitualis, hæmorrhoides suppressæ, amenorrhoea, etc. iis præsertim, qui sedentariam agunt vitam, imbecillo laborant stomacho, laxiorisque corporis habitus sunt, adcommodatus. Non minimo quoque præconio dignus est, quod *extrinsecus*, ulceribus atonicis, putrescentibus, cariei, otorrhoeæ admotus, aut epiphoræ, (grano oculis inflato), opituletur.

Dos. Succī spissati: grana duo, tria, ad decem, vel simpliciter per se, vel pro re nata cum catharticiis aliis, ex. gr. sapone, rheo p. vel cum aromaticis, vel cum amaris, vel emmenagogis junctus, ut ferro, gummi-resina Myrrhæ aptius, vel in solutione in alcohole, vel in pilulis.

PRAEP. *Clyst: aloëticus* — *Pilulae Aloës et F: Asae foetidae*. — *Fil. aloëticae* — *Tinct. Rhei et Aloës* — in compositione quoque *pilular: Rhei* est.

## ALTHEA OFFICINALIS.

Просви́рнякъ. Radix, Herba.

CL. Monadel. O. Polyandr. O. N. Columnaceæ.

Planta perennis, in solo humido crescens:

QUAL. Mucilaginosa, insipida.

V. Emolliens, demulcens.

Us. Multiplex ejus: pro *interno* usu propinatae efficacia in raucitate, tussi, pleuritide, nephritide calculosa, diarrhoea, dysenteria, tenesmo, stranguria, blenorhoea etc. emicat.

*Extrinsecus*: per modum clysteris, vel cataplasmatibus: tenesmus, phlegmone, in ophthalmiis siccis, vel illacrymatione acristipatis, decoctura juvat; gargarismata emollientia intrat.

PRÆP. *Decoctura et Species ejusdem compositae.*

## AMOMUM CARDAMOMUM.

*Cardamomum minus*. Fructus triquetri, utrinque acuminati, longitudine semipollicari, pericarpio fragili ex luteo subfusco, et seminibus aromaticis nigricantibus instructi, vulgo Semina. Ка́рдомомъ.



CL. Monandr. O. Monogyn. O. N. Scitamineæ. Indiam orientalem incolens.

QUAL. In volatili pæecipue oleo residens. *Sapor* acris, aromaticus; *Odor* fragrans, acceptus.

V. Stimulans, calefaciens.

Us. Debilitas ventriculi; dyspepsia; chlorosis; fructus masticati foetentem animam reddunt gratiorem.

Dos. Pulveris grana quinque ad scrupulum.

*Massam pil. scillin: et Pulv. aromaticum* intrat.

## AMOMUM ZINGIBER.

*Zingiber*. Radix (tuberosa, articulata, compressa, rugosa ponderosa, extus ex albo cinerea, intus alba) И́нбирь.

CL. et O. præcedentis. Perennis Indiæ orientalis, et insulæ Madagascar.

QUAL. Præstantissima, atque cel. NEÜ-MANNO probante, in extráctivo et resinoso principio; non vero, ut quidam volunt, in volatili oleo residens. *Sapor* masticatæ radicis peracer, os fervoris sensu afficiens. *Odor* aromaticus, non ingratus quidem; ast nares ita laccessens, ut pul-

visculo in superficie separabili, sternutamenta provocari queant.

V. Stimulans, pepticarum auxiliaria; stomacho maxime idonea; salivam movens neque sic, ut cætera aromata excalfaciens, ejusque effectus sunt durabiliores.

Us. Ventriculus languefactus, non concoquens cibos; tussis stomachica, titillatoria; imo pro colico quoque (in colica, flatulenta vulgo dicta) habetur medicamine. *Externe*: uvulæ e pituita nimis prolongatæ justa sedes et magnitudo A. Zingiberis pulvere per manubrium cochlearis admoto, vel Zingibere cum Supersulphate Aluminæ et Potassæ adhibito, restituitur.

PRAEP. *Syrupus ejusdem*, et ad parandum *Acid. sulphur. aromatic.* — *Infus. Gentianæ l. comp.* — *Pil. scillin.* — *Pulv. aromat.* — *Tinct. Rhei amar.* etc. adhibetur.

## AMYRIS KATAF.

*Gummi-resina, olibanum*, seu *Thus*, Ладаһъ, dicta, FORRSKAL teste. Alii thus ex Junipero lycia provenire existimant, alii ex utroque.

Us. Leucorrhoea, item ad suffimenta.

Dos. Semidrachma, drachma.

PRAEP. *Pulvis pro suffimento.*

## ANETHUM FOENICULUM.

*Foeniculum.* Semina (oblonga, striata, pallida). Волоской укропъ.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellat. Biennis, vel perennis hortensis.

QUAL. Valens: in volatili oleo, non acris residens, *Odor* subaromaticus, teter; *sapor* aromaticus, dulcescens.

V. Carminativa, resolvens, pectoralis, lacti augendo par.

Us. Ventriculi debilitati succurrit; inflationes levat; lactis defectui obest; colicos infantum dolores mitigat etc.

Dos. Seminum pulveris, a scrupulo ad drachmam. Pro infuso, ut quibusdam placet, drachmæ duæ, semuncia, in aquæ libra. — Aquæ foeniculi: unciaë tres. — Olei ejusdem: guttæ duæ ad quinque.

PRAEP. *Oleum.* — *Aqua destill.* — et ad parandum *Inf. fol. C. Sennae.*

## ANGELICA ARCHANGELICA.

*Angelica sativa*. Radix (fibrosa, capite oblongo crasso, extus ex flavo rubens, in superficiebus segmentorum transversorum alba, maculis numerosis flavis, oleo æthereo repletis, punctata). Folia, Semina.

Дягиль.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ.

Planta biennis, et interdum perennis, crescens plerumque in alpibus.

QUAL. In oleo volatili residens. *Odor* fragrans; *Sapor* aromaticus, acris, calefaciens.

V. Ad consuetam aromaticorum referenda: stimulans; tonica; sudifica; sialagogica. — Herbæ: antiseptica, secundum experimenta PRINGLEANA.

Us. Norwegi radicem in panem recipiunt. In morbis asthenicis, stimulo egentibus, locum habet: in debilitate ventriculi; inflatione et dependente hinc colica; paralyticis adfectibus; menstruorum obstructione; typho, etc. Alexipharmaci quoque nomen tulit; quin ipsi pesti subigendæ par habita.

Dos. Radix, (plus aromatis continens), in pulvere a scrupulo ad drachmam in aromatica quapiam aqua, vel in chronicis morbis per modum electuarii, vel drachmæ duæ Angelicæ A. cum totidem Valerianæ off. vel Acori Calami, in octo unciis bullientis aquæ infusæ, addito Aethere sulphurico, syrupo, et id genus aliis.

Aequivalet Dorsteniæ contrayervæ, et valerianæ off. iisque apte substituitur, utpote carioris pretii; ab Angelica sylvestri minus efficaci, cui dolose subrogatur interdum, probe distinguenda. — Sylvestris nempe, in locis nascitur humidis, habetque flores rubellos, cum altera, virescentibus floribus gaudeat, ejusque radix sit admodum tenax, multoque fragrantior, exhibeatque copiose puncta flava, transversim secta.

ПРАЕР. *Inf. radidis* — in *Decoct. Cinchonæ off.* adhibetur.

## ANTHEMIS NOBILIS.

*Chamomilla romana*. Римская Ромашка. Flores.

CL. Syngenes: O. Polygam: superfl. O. N. compositæ radiatæ. Planta annua in tota Russia hortensis.

QUAL. Egregia: in volatili oleo, et extractivo amaro sita. *Odor* suaveolens; *Sapor* amarus.

V. Antispasmodica; stomacho apta.

Us. Hyperæsthesia; malum hypochondriacum, hystericum; colica spasmodica ab inflatione; febres intermittentes.

PRÆP. *Pulv: ejusdem cum cort. Quercus. R.*

## ARCTIUM LAPPA.

*Bardana.* Radix, Semen. Репѣйникъ,  
Лапушникъ.

CL. Syngenes: O. Polygamia æqual. O. N. Compositæ capitatæ. Biennis in locis incultis, inaceriisque ubivis perfrequens.

QUAL. Radicis: *Sapor* dulciculus, subamarus, austerulus; *Odor* nauseosus. — Semen, *Sapor* valde amarus; lotium decolorans.

V. Radicis: sudorem, lochia, urinamque movens; blande resolvens.

Us. Rheumatalgia. Lochiis movendis, non esse interdum imparem, puerperarum usus evicit. Haud desunt, qui eidem antiveneream tribuant viin; imo semina calculosis profuisse, est inter exempla. Folia viridia genuum tumores dissipasse do-

lores carcinomatis, podagrasque pacasse, perhibentur. Succus eorundem valentior, HUFFLAND. Multi eandem Smilaci Sarsaparillæ præferunt, ast immerito.

PRAEP. *Decoct. radicis, et Species guajac. comp.*

### ARGENTUM. Cepe6po.

*Argentum nativum.* LIN. CL. II. Mineræ, Metalla. Est metallum indigenum, album, auro levius, ductile, via sicca oxygenium respuens, in acido nitrico solubile, oxydatum cum acido muriatico conubium indissolubile, contrahens. — Rubiginem vero, nisi nitroso tangatur acido non contrahit.

Us. Mechanicus ad quædam instrumenta chirurgica, catheterismo præsertim, et cavo oris destinata; pro parando quoque *Nitrate argenti fuso*, adhibetur.

## ARISTOLOCHIA SERPENTARIA.

*Serpentaria virginiana.* Виргинскій

ЗМѢВНИКЪ.

Radix fibrosa, ex viridi lutescens, fibris tenuissimis, inter se tricatis. CL. Gynandr. O. Hexandr. O. N. Sarmentosæ. Perennis, virginiana.

QUAL. Præstans: in oleo præcipue essentiali residens. *Odor* fragrans, camphoratus, Valerianam off: redolens; gratior tamen. *Sapor* aromaticus, acris, amaricans.

V. Excitans volatilis, Camphoræ non dispar; constantia tamen eandem superans; sudifica; diuretica.

Us. Morbi asthenici et in primis typhus cum impotentia reagendi; febres intermittentes, ut adjutrix Cinchonæ, præsertim, ubi movendorum sudorum ratio habenda, propulsat; asthenicæ pneumoniæ, exanthematibus atonicis, retrogradis, anginæ atonicæ, gangrænosæ, gargarizando et ipsi gangrænæ adcommoda. Morsuræ serpentum, præsertim venenatissimi Boiciningæ, DALE; masticandō plantam, succum deglutiendo, foliaque contusa vulneri admovendo, GEOFFROY, idonea.



*Dos.* Pulveris radiceis forma aptior a scrupulo ad semidrachmam; forma quoque infusi commodissima, in vino vel in aqua.

Decocta, ut usu cognitum est, virtute sua prorsus orbatur; Camphoræ vel Cinchonæ subsidiariam, non sine emolumento, fert opem.

*PRÆP. Infus: radiceis. — Decoct: Cinchonæ off: etiam additur.*

## ARNICA MONTANA.

*Arnica.* Flores (sine calice) Herba, Radix. Баранья шрава.

*CL.* Syng. O Polyg. superfl. O. N. Compositæ radiatæ. Perennis in frigidioribus germinans alpibus, apricisque locis pratensibus.

*QUAL.* Egregia. *Sapor* aromaticus, acris cum amaritie; trita, odorem aromaticum, virosum spargit, utpote peculiari principio acri nixa, paulum olei ætherei, plus resinæ continens.

*V.* Excitans, resolvens, menagoga, errhina etc.

*Us.* In omnibus febribus incitabilitate imminuta stipatis, additis pro ratione im-

becillitatis, plus vel minus, volatilibus stimulis; in rheumatalgia; paralyti et ischuria paralytica; amenorrhoea; in malo hysterico et adfectionibus spasmodicis asthenicis; diarrhoea, et dysenteria asthenica; in amavrosi. Pro anthelmintico quoque a quibusdam habetur. *Extrinsicus*: contusiones; suffusiones; cacoëthes; sphacellus.

Dos. Pulveris est a tribus ad decem grana; sed hæc minus commoda. Aptius in infuso a duabus drachmis, semuncia, ad octo uncias aquæ; vel infusi florum in sacculo suspensorum, drachma, duæ, tres ad libram aquæ dantur, idque fit in connubio Valerianæ off. A. Calami etc. non inepte, vel decoctioni Cinchonæ ad finem Arnica adjicitur. Additamenta stimulantia volatilia ut Aetheris sulphurici, vel ejusdem alcoholisati, vel tincturæ Opii, ad singulum præbium, sunt quandoque necessaria. — Permagni interest flores caute adhiberi; haud raro enim vomitiones provocasse, anxietates, tormina, hæmorrhagias, vertigines etc. excitasse perhibentur. — His ubi eveniunt, acetum occurrit efficaciter. — Radix, quum facilius vo-

mitiones cieat quam flores, ubi in pulverem tenuata est a quinque ad decem grana administratur.

PRÆP. *Infus. florum.* — et compositionem *Spec. Althaeae comp.* ingreditur.

## ARTEMISIA ABSYNTHIUM.

*Absynthium vulgare.* Полынь. Herba, summitates.

CL. Syng. O. Polyg. superfl. O. N. compositæ discoideæ. Perennis, apud nos ubi vis spontanea.

QUAL. Præstans; in volatili oleo, et extractivo amaro sita. *Odor* nidorosus, mora et siccatione evanidus fere. *Sapor* valde et pure pute amarus.

V. Roborans.

Us. Morbi asthenici: cacostomachum roborat; acidum primarum viarum infringit, (imo zythum acescentem, dolio imposita, meliorare fertur). Hypochondriacis, et ictericis utilis; hepatemphraxin quoque extracto A. Absynthii cum sapone in pilulis dato, fuisse resolutam accepimus. Podagræ opitulari, HALLERUS propria edoctus experientia confirmat. Scorbuti est efficax medela radice aqua, cerevisia, vel vino

infusa; nec hydropicis noxia. Contra febres intermittentes, vermes, tineam, achores, gangrænam suetum fuit remedium. *Externus*: forma cataplasmatibus, fottus, imo et herba recens oedematibus discutiendi ergo admota, non officit. Ob vim coërcendi putredinem, gangrænam, aquæ marinæ incocta, subegit BARTHOLINUS.

PRAEP. *Extractum amar*: — *Infusum herbae*. — *Spec. aromaticae*.

## ARTEMISIA SANTONICA.

*Santonicum*. Cacumen. Цытварное сѣмя.

CL. et O. præcedentis. Perennis; frutex in Palæstina crescens; in Alepo optima, ut et in australibus Russiæ oris obvia.

QUAL. Præstans: in volatili oleo posita, *Odor* fortis peculiaris; *Sapor* amarulentus, subacris.

V. Anthelminthica.

Us. Lumbrici, interdum tænia solium  
LINN:

Dos: Adultis, cum melle, drachma; vel in pulvere drachmæ duæ, tres, in infuso lactis interpolando post aliquot dies catharticum. Injecto quoque extrinsecus

clystere juvat, recteque conjungitur cum  
Allio sativo, Valeriana off. etc.

### AVENA SATIVA.

ОВЕСЪ. Semen decorticatum, farina.

CL. Triandr: O. Digyn. O. N. Gramina.  
Gramen annuum, quod per universam se-  
ritur Russiam.

QUAL. Insipida; farinacea.

V. Demulcens; emolliens; nutriens.

Us. Forma decocti, cataplasmatidis aqua  
puls facta, tepideque ad molliendos et  
maturandos tumores, admota, egregie va-  
let.

PRAEP. *Alcohol dilutum.* — *Cataplasmata  
varia.* — *Farina.* — *Pulv. absorbens.*

### BOLETUS IGNIARIUS.

*Agaricus chirurgorum.* Древесная губка.  
мрушь.

CL. Cryptog. O. Fungi. Putrescentibus  
inprimis Quercus roboris, Tiliæ europeæ,  
etc. caudicibus, insidens. Boletus e cau-  
dicibus collectus, duricorius, a cortice  
externo, fistulosaque substantia separatus,  
et discissus, mallei ictibus submitatur,  
donec adeo mollescat, ut in minores dis-  
cerpi partes queat.

Us. Mechanice sanguinem sistit, si arteria, vel vena minor vulneretur, lamellatim ipsi, urgente hæmorrhagia, imponi potest.

### BOS TAURUS domesticus.

Caro, bilis, lac, sebum.

CL. Mammalia, O. Pecora.

V. Lactis; butyri; nutriens, involvens; bilis, stomachica.

Us. Lactis, sacchari ejusdem, et seri; in tabe, hæmoptysi aliisque morbis.

Dos. Sacchari lactis pulverati, cum vel sine Nitrate Potassæ drachma, ter quater ve de die, vel semuncia in duabus aquæ fervidæ libris soluta de die.

PRAEP. *Ius carniū* vide *Clyst. nutrient.* *Vesica bovilla.* — *Butyrum* vid. *Unguenta varia* *Clysteres.* — *Lac* vide. *Serum*; *Cataplasma emoll.* *Clysteres varii.*

### BRASSICA NAPUS.

*Napus sylvestris.* Oleum expressum.

CL. Tetrodynam. O. Siliq. O. N. Siliquosæ.

Planta biennis colitur copiosissime.

Us. Oleum expressum in usum lampa-

dum exhiberi potest; ardens tamen fuligine sua gravat pectus, et supellectilem inquinat, stupaque, dum extinguatur graviter foetet; — saponi insuper viliori, et opificiis laneis inservit.

ПРАЕР. *Oleum expressum.*

## BUBON GALBANUM.

*Gummi Galbanum.* Галбанъ.

Gummi-resina, granis ex albo lutescentibus, sibi invicem vel agglutinatis, vel massæ molliori luteæ, immistis composita, ex trunco prope radicem transversim secto, fluens, mox indurescens.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ. Frutex in Arabia, Syria, et India orientali sponte crescens.

QUAL. In volatili oleo residens. *Sapor* amarus, acer. *Odor* gravis, plerisque ingratus, fere alliaceus.

V. Stimulans, resolvens, expectorans, antispasmodica, menagoga.

Us. In malo hypochondriaco et hysterico, amenorrhoea, asthmate, tussi inveterata etc. in universum cautionem injungunt, arteriarum micatus accelerati, et febrile molimen; secus melius fertur.

*Extus* inposita resolvit, emollit, suppurationem movet; tumores etc.

Dos. Grana decem ad semidrachmam, forma emulsionis, solutionis, vel pilularum, commode cum Gummi-resina Myrrhae, F. Asae Foetidae, extracto Valerianae off. etc. praebere potest.

PRAEP. *Empl. gummi-resinos.* — *Pil. F. Asae foetid.*

CALLICOCCA IPECACUANHA BROTERO.  
CEPHAELIS IPECACUANHA WILL-  
DENOW. *Ipecacuanha.*

Radix (flexuosa, tenuis, annulis eminentibus inaequalibus numerosis conspicua).

Рвотный корень.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Aggregatae. Planta perennis Brasiliae.

QUAL. Principio resinoso nititur. *Odor* mucidus, nauseabilis pulveratae radice; cortex ejusdem inodorus. *Sapor* amaricans acriculus, pungens.

V. Stimulans; emetica majori dosi; minori vero sudifica, antispasmodica.

Us. In sordibus ventriculi; quas per emesin ejici expedit; in induratione testiculi vomitionibus discutienda; dein, ut sti-



mulans in morbis pectoris asthenicis, præsertim, ubi sudorem et pituitam mōveri juvat; in asthmate spasmodico; pertussi; epilepsia; hysteria; melancholia; mania; in febribus intermittentibus; catarrhalibus; diarrhoea; dysenteria; amaurosi; rheumatalgia; hæmorrhagia uteri; hæmoptysi; impetigine; ictero; hydrope. Phthisiscentibus, hernia, hæmorrhagiis, et congestione sanguinis ad caput laborantibus, ut etiam gravidis, vomitionis scopo, aliena.

Ut *C. Ipecacuanhae* abnormis actio vel imminuitur, vel sufflaminatur *Opio*, ita vicissim illa, non est impar effectui *Opii*, æquo majori, infringendo.

Dos. Pulveris: granum, duo, tria, scopo emetico infantibus. — Adultis grana quindecim ad viginti, addito interdum grano *Tartratis Stibii* et *Potassæ*. In ceteris morbis, pro re nata, variat.

PRAEP. *Pulv. C. Ipecac. cum Opio* — *Pulv. vomic.* — *Vinum C. Ipecac.* —

## C A L X.

*Terra calcarea pura. Calx recens usta.*

*Calx viva. Известъ.*

Paratur e lapidibus et terris calcareis; e testis conchyliorum et ostrearum calcinatis.

*Odor* Nullus; *Sapor* causticus.

E testis ostrearum parata præponitur merito.

V. Corrodens.

Us. Parandæ aquæ calcis, et potassæ inservit.

Si calcis in aëre in pulverem dilabentis parti, conjunctæ cum duabus farinæ avenaceæ, addas, adipis suis scrofæ præparatæ, sufficientem quantitatem, adversus lumbaginem, ischiadem, et genuum tumores fungosos, aptissimum cataplasma habebis.

ПРАЕР. Inservit ad parandum, *Acid. tartaric.* — *An.mon. liquid.* — *Aquam calc.* — *Mur. calc.* — *Potass. liquid.* —

## CANNABIS SATIVA.

Конопля. Semina.

CL. Dioecia O. Pent. Annua, in Russia colitur ubique.

QUAL. Præstans: in oleoso, mucilaginosoque principio residens.

V. Demulcens; sedans.

Us. Infusi, aut emulsionis: blenorragia; stranguria; tussis catarrhalis; aurigo spasmodica.

Dos. Semuncia seminum cum unciis quatuor aquæ in emulsione, vel cum selibra aquæ in infuso datur.

Semina contusa, lactique incocta, pro cataplasmate adhibentur.

### CAPSICUM ANNUUM.

Piper indicum. Спручковый перецъ.

Fructus.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Solanaceæ. Annua planta, Americæ australis, Indiæque orientalis. In vaporariis apud Ruthenos colitur.

QUAL. Præstans: in resinoso residens principio. Sapor piperi analogus, acris, subfervidus; diu in ore remanens.

V. Stimulans; peptica; rubefaciens.

Us. Dyspepsia; cardialgia; febres intermittentes; cachexia africana; nostalgia, МАКИТРИКЪ, qua in primis apud nos Parvo-Russi laborant, quum in borealibus oris coguntur militare; scarlatina anginosa WRIGHT; lethargus, et in primis febres tro-

picae, apathia, comate, stipatae (superdato cataplasmate).

Succus fructuum capsici in ophthalmiis asthenicis majorem in modum laudatur, uti, nec infusum capsici in gutta serena guttatim oculis instillatum inefficax: (granum in uncia trihorio infunditur) protracto praesertim usu. Hydropisi, junctum ferratis, ubi ea e re fore existimantur, utile.

## CARBO LIGNI.

УГОЛЬ.

R. Carbonis ligni quantum placet.

Rite, quousque nullum amplius ediderint fumum exusti, laminæ ferreae exponantur, simulac extincti fuerint, ab adhærente iisdem cinere, follis ope, liberandi.

V. Antiseptica, desoxygenans.

Us. Dysenteria? dyspepsia? aptius admoventur ulceribus putrescentibus, gangrænosis; imo foetori oris quoque succurrit. In psora quoque cum Sulphure sublimate a quibusdam commendatur. Fluidorum foetorem corrigit, empyreuma tollit, æque coloris expertia reddit, sic Olei, Acidi

tartarici, Aceti, alcoholis, carbonatis ammoniæ, Supertartratis potassæ, aliorumque salium, dum parantur. — Pronitati quoque aquæ in putredinem a classiariis opponitur, adjecto imprimis Acidi Sulphurici pauxillo. Caro putescens, hoc respersa, recentis gratiam cito præ se fert, fitque inolens. Quosdam antiquitus carbonibus pro sale usos esse VARRO memoriæ prodidit.

PRAEP. *Catapl. antiseptic.* — *Pulv. carb. acidul.* — adhibetur etiam in præparatione, *Acid. acet. diluti.* — *Acid. tart.* — *Mur. baryt.* — *Supersulph. Alumin, et Potass.* — *aquæ purificat.*

## CARBONAS CALCIS.

*Creta pura.* МѢЛЪ.

Lapides, seu oculi cancrorum; testæ ostrearum et ovorum etc. — In Ruthenia australi reperitur. *Inodorus; Saporis terrei.*

PRAEP. *Pulv. absorbens.* — *Solut. mur. cal.* — *Aq. acid. carbon.* — *Aq. miner. acid.* — *Aq. mineral. sulph.* — *Carb. ammon.* — *Acid. Citr. concret.*

## CAREX ARENARIA.

Осока песочная. Radix.

CL. Monoec. O. Triandr. O. N. Calamariæ.

Perennis pl. in arenoso solo crescens.

QUAL. Radicis recentis: *Odor* resinoso-terebinthinaceus; *Sapor* subdulcis.

V. Sudifica; diuretica, radici Smilacis Sarsaparillæ analoga.

Us. Morbi cutis; syphilis.

PRAEP. *Species guajacinae comp.*

## CARUM CARVI.

*Carvi* semina. Тминъ.

CL. Pentand. O. Digyn. O. N. Umbellatæ. Planta biennis in Russia australi spontanea.

QUAL. In volatili residens oleo. *Odor* aromaticus, subgravis. *Sapor* moderate calidus, subamarus.

V. Stimulans; peptica; resolvens; lactifera.

Us. Culinaris. Medicus: colici dolores; ad curandam in primis colicam flatulentam.

Dos. Pulveris: a scrupulo ad drachmam. Olei, gutta ad quinque.

PRAEP. *Oleum — Aq. dest.*

## CASSIA SENNA.

*Senna* Александрийскій листъ. Folia.

CL. Decandr. O. Monogyn. Fruticosa Africae, Arabiaeque, incola.

QUAL. Olor non prorsus gratus, nauseosus. Sapor nauseabilis, amaricans, subacris, in principio volatili residens.

V. Cathartica.

Us. Sordes primarum viarum; obstipatio.

Dos. Infusi: drachmae duae, sex, ad aquae selibram, addito semine aromatico Coriandi sativi, A. Cardamomi, vel oleo C. Carvi, Lauri Cassiae cortice, A. Zingiberis radice etc.

PRÆP. Inf. folior. — Clyst. cathart.

## CERA. Воскъ.

Materia indolis propriae, vegetabilis, apibus mellificae, hymenopteri insecti, productum.

CERA FLAVA. Желтый воскъ, cera cruda apibus collecta, atque separata a melle.

CERA ALBA. Воскъ яровый, или бѣлый Русскій. Cera apricatione sub aquae frequenti adspersione, albata.

Purificata utraque in commercio vulgo venalis.

COMP. *Cerata* — *Emplastra* — *Unguentaque varia.* — *Lin. simpl.*

CERVUS ELAPHUS. Олень.

Cornua; gelatina cornu cervi; Sevum.

CL. Mammalia. O. Pecora.

QUAL. Gelatinæ nutriens. Cornu est substantia e Phosphate calcis composita.

PRAEP. *Cornu cervi rasum*, vid. *Dec. mucia-*  
*gin. Corn. Cerv. calcinatum*; *Subphosph. calcis.*

CINCHONA OFFICINALIS.

*China.* Cortex. Лихорадочная корка.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Contortæ. Arbor regni peruviani in primis in vicinia montana Loxæ, provincia Quito; imo et Americæ incola.

QUAL. Eximia: in principio cinchonino, tanino, resinoso, acido gallico et perpauco volatili oleo residens. *Odor* leviter aromaticus, specificè mucidus, pulvere, aqua bulliente adperso, sensibilior. *Sapor* amarus cum vestigiis mitissimi aromatis, simulque subacidus, austerus, substypticus.

V. Stimulans; tonica; peptica; adstringens; antiseptica; febrifuga.

Us. Asthenici morbi; febres intermitten-



tes; remittentes; typhus; ataxia, (motus systematis nervosi abnormes) spasmata; pertussis; tabes pituitosa; diarrhoea; dysenteria asthenica; pestis; variolæ confluentes atonicæ; morbilli; rubeolæ; febris scarlatina, typhodes; scrofulæ; carcinoma; gangræna; sphacelus; atrophia; hæmorrhagiæ passivæ; rachitis; scorbutus; hydrops, aqua educta. Additum absorbens Cinchonæ, ut quibusdam videtur, juvat; ubi autem pro morbi indole alia intentio est, vel noxas quasdam sub usu ejusdem obortas avertere lubet, tum aliorum quoque conubium perutile. Acidum carbonicum vomitum avertendi causa recte adjicitur, uti etiam Opium, si catharseos metus subest. Ne alvus pertinaciter adstringatur, Rhei palmati radix additur. Aromatum additio cacostomachis, et opressionem quamdam ventriculi sentientibus adcommoda.

Corticis Cinchonæ off. venalis centum libræ, ad nos adlatæ, vix quinque, vel decem genuinas ut experientia haud æquivoca docet, præbent, ideo aliis fere cassis medicamentosa virtute alia opportuna succedanea, adjectis, ubi opus, stimulantibus, substituuntur.

Dos. Adhibetur cortex ex ramis avulsus *interne* in subtiliori pulvere, qui modo in aqua præbetur, modo in vino, nunc etiam sub forma electuarii infra duas ad dimidium drachmæ, bis terve, imo et pluries de die pro ratione circumstantium rerum repetendus. Aliquando, etsi perraro etiam semuncia ejusdem pro vice præscribitur. Exhibetur quoque persæpe, decoctus, infra decem ad duas drachmas pro unica decocturæ libra. In parando decocto cautio sit, ne cortex multum ebulliat, utque in clausis ebulliret vasis. Ceterum scire licet vim bullientis aquæ solventem restringi, tantumque abest, ut continuatione decoctionis, vis ejusdem augeatur, ut potius imminuta quantitate menstrui, solutum quoque deficiat. Ad temperaturam bullientis aquæ constitutivis quibusdam activis partibus oxygenium ex atmosphæra unitur subito, eaque tum resinosa, insolubilem, inertemque præ se ferunt indolem. Pars corticis sufficit ad saturandas sedecim partes bullientis aquæ spatio sesquihoræ, aut bihorii, idque vase clauso, refrigerationi sensim exponendo fiat.

Forma quoque infusi in Alchhole, Vino, apta est.

Tinctura licet sit adcommoda; officit tamen pars Alcoholis, quo minus soluti virtus, vim salutiferam, ita, ut volumus, exserat, idque ob stimulum alcoholis majorem, neque etiam ita propinati corticis præbia sufficient ad præstitutum finem.

Quum extractum præscribitur, existimatur id Cinchonæ virtutem auctiorem, imo concentratam continere; ast quod præter usum ejusdem objici potest, est 1) quod caro pretio constet; 2) quod constitutivæ ejusdem partes, sub præparatione, præpostero consilio instituta, decomponentur, destruanturque. Si rite factum est, usuique medico utile censetur, effingendis bolis pilulisque omnino aptissimum est. Infusionem vel decocturam recentem, misturæ, in qua extractum fuerit solutum, præferendam censemus.

Pulvis *externæ* in ulceribus atonicis proficius est; in vulnerum quoque promovenda suppuratione, cortex haud mediocri in existimatione fuit, forma cataplasmatibus, fomenti.

PRÆP. *Decoct.*—*Mistura*—et *Tinct. ejusdem.*

## CITRUS AURANTIUM.

Fructus recens. *Aurantiorum poma*. Cortex ejusdem flavus; folia, flores.

Померанецъ.

CL. Polyandr. O. Icosandr. O. N. Pomaceæ. Indiæ orientalis et occidentalis, copiose in australibus Europæ regionibus, cultura alitur.

QUAL. foliorum rec. *Odor* debilioris fragrantiae, graviusculus; *Sapor* aromaticus.

Florum: *Odor* fragrantissimus; suaveolens; *Sapor* amaricans, aromaticus, acceptus. Corticis flavi: *Odor* fragrans, Citro in. ingrator; *Sapor* aromaticus, amarus. Succ: *Odor* dulcacidus, vel amaro-dulcis.

V. Foliorum: tonica; cardiaca: florum, analeptica; corticis: stimulans; debiliter nervina; stomacho idonea; pulpæ: æque ac succi: frigerans; antiscorbutica.

Us. Foliorum: ataxia; convulsiones; epilepsia; chorea; foliorum manipulus in libra aquæ ad dimidii consumptionem coquitur et colatura pro unico mane præbio sumitur, vel semuncia eorundem cum viginti aquæ unciiis, ut alii suadent, per quadrantem horæ cocta, spatio unius diei

consumenda offertur. Commodum hoc in casu cum Valeriana off. aliisque congruis, ejusdem connubium. Alii in pulvere propinant scrupulum, drachmam bis, terve de die, TISSOT, LOCHER;—corticis: forma pulveris, infusi, tincturæ: dyspepsia; intermittentes febres. — Succus in scorbuto utilis.

PRAEP. *Aq. destill. corticis.* — *Inf. Gentian. comp.* — *Succus Cochlear. comp.* — *Tinct. Cinchon. comp.* — *Tinct. Gentianae comp.*

#### CITRUS MEDICA. ЛИМОНЪ.

Fructus, ejusque succus, corticis flavedo.

CL. Polyandr. O. Icosandr. O. N. Pomaceæ.

QUAL. Fructus: *Sapor* acidus; corticis, amarus, aromaticus.

V. Succi refrigerans, antiseptica, antiscorbutica eximia; corticis, stimulans, stomachica.

Us. In febribus sthenicis et asthenicis perfrequens, in quibus refrigerat, sitim mitigat; si biliosa diathesis subest, hanc refrenat egregie, nec minus in coërcenda pronitate in putredinem valet.

Explorata acoris ejusdem et salis concreti in scorbuti curatione, eminens efficacia, haud secus ac cortices citri, marcescentibus ab eadem causa gingivis continuo admoti respondent examussim. Hinc facultas ejus antiseptica saturando cum Muriate sodæ, omnino intenditur, WRIGHT; et tum fit dysenteriae, febribus intermittentibus, scarlatinæ anginosæ, et in primis diabeti et lienteriae maxime idoneum medicamen. In vomitu inhibendo acidum cum Subcarbonate Potassæ rite mistum ebullitionis tempore administratur. Flavido corticis nervos refocillat; stomachum roborat.

PRAEP. Succus.—*Aqua destill.* — *Acid. Citri concret.* — *Decoct. antiscorb.* — *Aqua cardiac.* — *Dec. mal'. H. acidula.* — *Haust. acid. carbon. evol.* — *Inf. lini* — *Mist. subcarb. potass.*

### COCHLEARIA ARMORACIA.

*Raphanus rusticanus.* Radix recens, ejusque succus expressus. Хрѣнь.

CL. Tetradyn. O. Siliculosa O. N. Siliquosæ. Perennis, hortensis.

QUAL. Eximia a principio acri volatili repetenda.

V. Stimulans, diuretica, antiscorbutica, rubefaciens.

Us. In scorbuto, infunditur vino vel cerevisia sola. In hydropse post febres intermittentes superstite, succus radicis claret, saccharo vel vino remistus. In asthmate puitoso, in paralyti, arthrodynia rheumatica, paraphonia utilem esse perhibent. Rasa recens radix, atque cuti ad semunciam imposita epispastica eminet efficacia.

Dos. Radicis rasæ: scrupulum, duo, ad drachmam et amplius. Succu expressi: semidrachma in haustu vini.

PRAEP. *Catapl. synapin. acre. — Cerevis. antiscorb.*

## COCHLEARIA OFFICINALIS.

*Cochlearia hortensis* Herba recens, ejusque succus expressus. Ложечная трава.

CL. et O. ut præcedentis.

QUAL. Herbæ recentis: egregia, ab acri principio volatili repetenda; Sapor acris.

V. Leniter stimulans, diuretica, antiscorbutica.

Us. Herbæ et succi: cachexiæ, scorbutus.

PRAEP. *Succ. Cochleariæ compositus.*

## C O L O M B A.

Radix. Obscura. Willdenow esse Bryoniae speciei radicem existimat \*). Корень колюмбы.

QUAL. Ejus in cinchonino principio et magna mucilaginis quantitate, residet. *Odor* subaromaticus, non ingratus. *Sapor* amarulentus, acriculus.

V. Stomacho apta; peptica.

Us. Diarrhoea; dysenteria in primis asthenica, uti et cholera, vomitiones habituales, in connubio pro re nata, Opii, Magnesiae; dyspepsia; malum hypochondriacum; hystericum, addita Quassia amara optime curantur. — *Externus* ulcera inspergendo atonica.

Dos. Pulveris radiceis: Scrupulus ad semidrachmam, secunda, tertia quaque hora, cui interdum aromatica quoque, cor-

---

\*) Insulae Ceylon incolam plerique omnes censent, unde ad universam Indiam transferri credebatur; verum nunc pro certo habemus, eam in Africa, et quidem in regione Caffrorum reperiri, nec mediocrem ex commercio ejusdem in Lusitanos redundare utilitatem, quod in Mozambica, provinciae Tranquebar, exercent.



ticem Cîtri aurantii, radicem Rhei palmati, Ferrum, addere non erit alienam. Infusa quoque vino, aqua destillata, vel Menthæ piperitæ, vel alcohole, in remediis pollet. In aqua facilius solvitur.

PRAEP. *Pulv. supersulph. Alum. et Potassae.*

## CONIUM MACULATUM.

*Cicuta major.* БОЛИГОЛОВЪ.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ.

Biennis planta in australi Russia crescens.

QUAL. Recentis venenata, principio contenta narcotico, acrique. *Odor* putidulus, teter; *Sapor* acris, nauseam movens.

V. Stimulans, narcotica, resolvens, diuretica, antipsorica.

Us. Rheumatalgia, prosopalgia, blennorrhoea, WEICKARD. psora, BALDINGER; scrofula, in connubio in primis gummi resinae F. Asæ foetidæ, saponis antimonialis et pro re nata, Hydrargyri. Strumas egregie propulsat; nec electuarium e Conio maculato, spongia usta, mistum, frustra-  
tui habet. In atrophia infantum sine febre, laudatur. In pertussi a BUTTLERO ali-

isque laudatum remedium. Item in tineâ, induratione testiculi et prostatæ, in cancro (cum Hydrargyro) dolorem imminuit et eundem fere exserit effectum quem Opium, quin alvum comprimat.

In carie ipsa et in ulceribus venereis *extrinsecus* admotum, non est laude sua orbandum.

Dos. Pulveris vel succi inspissati granum, adscendendo gradatim ad scrupulum de die. Succus seminum spissatus citius producit vertiginem, quam foliorum; is proinde a dimidio grano porrigendus sub initium.

A cicuta virosa, Aethusa cynapio, Chærophyllo sylvestri, temulento et bulboso, nec non a Tordyllo anthrisko, omnino distinguendum. — Character ejus est, semen in uno latere striis nitide serratis notatum.

PRAEP. Succ. fol. recent. express. et spissat. vulgo, *extract. cicutæ*. — Catapl. conii m. ammoniat.

## CONVOLVULUS JALAPA.

Ялапной корень. Radix.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Campanaceæ.

Mexicana et Veræ Cruz; mediæ Americæ perennis.

QUAL. In principio acri resinoso residens.

*Odor* ingratus; *Sapor* acriculus, nauseosus, diu inhærens.

V. Cathartica; hydragoga. Resinæ: drastica; anthelminthica.

Us. Febres intermittentes, aliæve ubi alvum duci expedit; lumbrici; tænia solum LINN. adjunctis aliis anthelminthicis. Hydropi, conjuncta in primis cum Supertartrate Potassæ, stimulum intestinis imprimendo, medetur. Alvus adstricta; physconia abdominalis.

Dos. Pulveris radice: a granis decem ad semidrachmam, pro adultis; idque pro ratione ætatis et habitus corporis; in infusione fere nunquam præscribitur. Non spernendum consilium est, ut pulvis cum saccharo teratur, ne tenax resina, intestinorum lacunis adhæreat, et ut ad præ-

pedienda tormina, pauxillum aromatis adjungatur

Vulgaris quoque miscela est cum Supertartrate Potassæ, aut alio quopiam neutro sale, quæ regula observanda est in præscriptione omnium remediorum, quorum cathartica vis a resinoso derivatur principio. Bryoniæ segmenta, a turpilucricupidis mangonibus eidem admista, colore albo et textura spongiosa se produnt.

PRAEP. *Pil. cathart. diureticae* — *Pulv. C. Jalap. et Mur. hydr. oxydul.* — *Pulv. C. Jalap. et Supertart. Potassae.*

## CROTON ELEUTERIA.

*Cascarilla.* Кашкарилъ.

Cortex (coloris extus cinerei intus e ferrugineo fusci; quem etiam comminutus servat, fragilis).

CL. Monoec. O. Monadelph. O. N. Tricoccæ. Arbos in America meridionali, præcipue in Jamaica, insulisque Bahamicis, Floridæ vicinis, obvia.

QUAL. In volatili oleo, atque extractivo amaro residens. *Odoris* (in primis ac-

censi) gratissime fragrantis; *Saporis* amari, multum aromatici.

V. Stimulans; roborans; peptica.

Us. In astheniis chronicis: febribus hecticis, HOFMANN; phthisi, pituitosa vulgo dicta; blennorrhoea; stomacho quoque imbecillo a decem idonea granis ad quadraginta cum tantillo corticis L. Cinnamomi, vel potius L. Cassiæ florum, atque generoso, si præsto est, vino. In profluviis alvinis coërcendis et dysenteria quoque celebratur, additis volatilibus stimulantibus. In chronicis diarrhoeis, per modum infuso-decoctus, cum Opio, Aethere sulphurico, aliisque analogis, utilem esse, experiundo didicimus. An hæmorrhagiis passivis, ut existimatur, conducat, dubito; tutius profecto, ut usu cognovi, recidivas avertit, præsertim in connubio corticis Cinchonæ off; in malo hypochondriaco et hysterico, conducere observavit BOULDUK. Antiquitas eidem, ut febrifugæ, patrocinebatur. Convalescentibus ex morbo, cum liquore vitigeno et amaris, viribus sociatis, calcar subdit.

Dos. In pulvere a granis decem ad viginti vel triginta exhiberi poterit. Pro in-

fuso aquoso vel vinoso drachma, ad libram vehiculi alterutrius. Extracti grana decem ad triginta.

PRÆP. *Extractum.*

### CUPRUM. МѢДЬ.

Metallum ductile, colore rufum, acido carbonico in viride oxydum mutabile. In Nertschinsk Sybiriæ indigenum.

QUAL. *Odoris*, si manu teratur, est proprii; *Saporum* metallicum, nauseolam moventem, præ se fert, vix ex ore, et lingua delebilem.

Us. Præparata. Videsis: *Acetatem cupri.*

### DAPHNE MEZEREUM.

*Mezereum.* Cortex radicis. Волчье лыко, Волчій перецъ.

CL. Octandria. O. Monogyn. O. N. Vepreculæ.

Frutex in Russia, tum boreali, tum australi perfrequens, spontaneus.

QUAL. Venenata: a principio acri derivanda. Acritas ejusdem insignis, tam gustatu, quam externo ejusdem admotu, cutem erodente, abunde declaratur.

V. Stimulans; in parva dosi resolvens, diuretica, sudifica; in majori drastico-ca-

thartica, emetica, arrodens. *Externe*: corrodens, vesicans.

Us. Syphilis refractariola; (improbante tamen PEARSON), herpetibus, scrofula, aliisque similibus stipata; topi; morbi cutis chronici: psora, herpes, ulcera asthenica ichore sublivido mali odoris scatentia, præsertim tonicis, antimonialibus, mercurialibus aliisque congruis, pro re nata additis vel præmissis; scirrhomata; tumores tonsillarum. *Externe* quoque, ut rubefaciens, vesiculas etiam excitandi causa, vices explet fonticulorum, vesicantium, synapismorum etc.

Monogrammis, phthisicisque alienus est.

Dos. Drachmæ duæ corticis radicis, vel semuncia radicis concisæ cum pari portione Glycyrrhizæ glabræ in libris tribus aquæ coquendo ad colaturam bilibræ. Antidotum ejus est Camphora.

PRÆP. *Dec. ejusdem.* — *Spec. guajaci comp. cum eodem.*

NB. Baccarum ejusdem additione acrius reddi acetum, e quæstu turpilucricupidorum, in propatulo est.

## DAUCUS CAROTA.

*Daucus Sativus*. Radix recens, folia, semina. Морковь.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ. Biennis in campis pratisque crescit; in hortis colitur.

QUAL. Radicis a mucilaginoso, saccharino principio derivanda. *Sapor* dulcis. *Semen* *Odor* fragrans; *Sapor* aromaticus, subamarus.

V. Radicis nutriens, demulcens, antiseptica; seminum, stimulans, diureticaque esse censetur.

Us. Succus ex radice emollita, coctione expressus, et in extracti formam reductus, loco sacchari, vel mellis, vel syrupi, edulcandis eduliis, idoneus, nec in tussi, phthisi, et vermibus infantum spernendus. Ab infantibus infestatis ascaridibus, cruda radix jejuno utiliter ventriculo estur. In aphthis oris, decoctum vel succus ex decoctis radicibus expressus, et pauxillo mellis rosacei mistus, penicillo illinitur, vel in aphthis internis ad cochlear parvum commode datur; calculosis quoque profuisse relatum accepimus. Radicis ra-



sæ, forma cataplasmatibus: ulcera phagedænica, cacoëthica, putrida, herpetica, cancræ, minuendo dolorem, fetorem et suppurationem. Conquassatæ radices recens adustis superdatæ juvant, DAREL.

COMP. *Catapl. Dauci.*

## DIGITALIS PURPUREA.

Folia. Нанерсточная трава.

CL. Didyn. O. Angiosperm. O. N. Solanaceæ.

Biennis in campis australis Russiæ apertis persequens.

QUAL. Venenosa. *Sapor* acris, amarus, nauseosus.

V. Arteriosi systematis motum, irritabilitatemque retardans, minuens; actionem absorbentium vasorum augens; diuretica. — Majore dosi: emetica; drastico-cathartica.

Us. *Internus.* Forma pulveris, infusi, vel tincturæ. Rheumatalgia, et in primis acutus rheumatismus, HENRY; epilepsia WITHERING, MACLEAN; eclampsia gravidarum et puerperarum, DUNCAN, *Med. comment.* Pertussis, HAROLD. Catarrhus, MOSMAN. Cynanche trachealis, seu stridula aut

polyposa infantum (Anglis Croup.) asthma spasmodicum cum Opio, FERRIAR. Porro in spasticis constrictionibus utilitas ejus emicat per experimenta, quibus herniæ incarceratæ profuit, DUNNING, HUFFLAND; hæmorrhagiæ activæ, CARSON; epistaxis, hæmoptysis CURRIE; hæmorrhoides, usu tincturæ, et mictus cruentus cum dysuriæ incommodis, MACLEAN; phthisis, DARWIN, BEDDOES; hydrops articuli, BRANDISIUS; hydrothorax, vitiosa vasorum exhalantium sedulitate, pravaque resorbentium inertia ortus, LENTIN; apoplexia hydrocephalica, dato pulvere Digitalis cum Muriate Hydrargyri oxydulato; nuchæ vero vesicatorio, temporibusque admotis hirudinibus curata, GARNET. — Pulveris instar, semina minutissima, quæ, sicuti alia similium plantarum, summam virium, in compendium jungunt in hydropis præcipue usum commendat, SCHERWEN. Mentis alienationibus profuisse, NORD testatur. Aneurisma aortæ, simulac arteriarum micatus ad guinquaginta quatuor fuerint, suborta majori quantitate diuresi, usu remedii hujus supersedendum est.

*Externus:* Infusi, forma lotionis, seu in-

jectionis, unguenti: impetigines et tinea squamosa, MACLEAN, FERRIAR. Psora, ANDERSON. Lepra scorbutica, VICAT. Scrofula, usu unguenti (et succi recenter expressi) PARKINSON. — Unguentum Digitalis e succo recenti, cum successu ad-movet strumæ, THILENIUS.

Dos. Variis illa modis in remedii usum præscribitur a medicis. Aut in pulveris forma ægris exhibentur folia a dimidio grano ad granum, sesquigranum, duo vel etiam tria, vel aqua superfunduntur, vi-desis: infusum Digitalis purpureæ.

Fit quoque mitius infusum drachmæ unius siccatorum foliorum ad uncias oc-to fervidæ aquæ, per quatrihorium, rite digerendum; addita, hoc facto, colaturæ uncia aromaticæ cujusdam aquæ; sumi-tur bis de die semuncia, vel etiam uncia, quæ est dosis media pro adulto.

Tincturæ, præterea componuntur, quæ quidem, ut præparatione, ita effectu mul-tum differunt. Optima est tincturæ for-mula, quæ a MACLEANO proponitur, vide-sis: Tincturam Digitalis purpureæ.

Sub usu hujusce remedii subinde ægro-tus obfuscationem visus, aliaque patitur

incommoda, uti nauseam, vehementes vomitus, oesophagi constrictionem spasticam, singultum, diarrhoeam, interdum ptysma etc. Cujus ubi subest metus, vel minuenda est dosis, vel omnino usu remedii suspensendum, et tum aromata, tonica, et id genus alia, recte adjiciuntur.

PRAEP. *Tinct. digital.* — *Pulv. ejusdem.*  
*Pulv. Supertart. potass. et Digit. purp.*

## FERRUM SELECTUM.

Железо.

CL. II. Mineræ, Metalla. *Odor proprius; Sapor metallicus.*

V. Tonica, deobstruens, menstrua movens, hæmatopoëtica.

Us. Morbi asthenici, vel a menostasia orti: chlorosis; leucorrhoea; rachitis; menorrhagiæ passivæ; cachexia; icterus.

Dos. Ferrum limatum, a granis quinque ad scrupulum cum saccharo in pulvere, vel cum quopiam aromatico, vel per modum pilularum, cum extracto amaro.

PRAEP. *Limatur. Ferr. purific.*

## FERULA AMMON.

Gummi-resina. *Gummi ammoniacum*.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ.

In Nubia, et Abyssinia, interioribusque locis Aegypti.

QUAL. *Oder* gummi-resinæ alliaceus; ingratus, gummi-resinam B. Galbani redolens. *Sapor* acris, amarus, nauseosus. — In ore mollescit et albescit; calore quidem mollitur, sed non solvitur, ast super prunis inflammatur et consumitur. — In aqua et aceto pars tantum solvitur; pars vero resinosa dimidium ejus constituens, quiete separata, subsidet.

V. Stimulans; resolvens; imo, ut cel: ARNEMANN observat, etiam emolliens; antispasmodica; pituitam à granis decem ad semidrachmam; majori autem præbio lotium et alvum leniter movens.

Us. *Interne* in morbis pulmonum asthenicis; in phthisi pituitosa; asthmate; physconia abdominali; chronica rheumatalgia, in dyspnoea catarrhali; amenorrhoea (ab imminuta irritabilitate) conjunctim cum Aloe et Sapone, WICKARD. Hæmorrhoidibus quoque eodem auctore proficua;

in colica rebelli; in hydrope; in malo hypochondrico, hystericoque a quibusdam commendatur. *Externe* acido acetico impuro, vel aceto scillite soluta, forma emplastri et unguenti: induratio testiculorum; scirrhus; lupia; tumores articulorum frigidi; hydrarthrus.

Dos. Grana decem ad scrupulum, semidrachmam. In pilulis excipitur extractis amarum, cum gummi-resina Myrrhæ, Asæ foetidæ, succo Aloës p: Scill: rad. — oxydo stibii hydrosulphurato, — vel etiam in quapiam aromatica aqua potest solvi.

PRAEP. *Pilulae*, — *Emulsio*. — *Solut. in acet. scill. vel aceto et Asa foetida*. — *Empl. Gummi resinos*. — *Catapl. discutiens*.

## FERULA ASA FOETIDA.

Gummi-resina, seu succus gummi-resinosus incisione radicis plantæ obtentus, concretus. Вонючая камедь.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ. Perennis Persidis, in campis ejusdem montosis crescens.

QUAL. In principio resinoso, oleoque volatili sita, Allium cum alio fetoris intolerabilis genere, redolet.

*Sapor* ejusdem amarus, acris, mordens, diutissime inhærens. Ex  $\frac{2}{3}$  gummi et  $\frac{1}{3}$  resinæ constans.

V. Stimulans, sedans, resolvens, menagoga, anthelminthica, antispasmodica, pituitam movens.

Us. *Internus* et *externus*: in chronicis pulmonum morbis, ut tussi; asthmate convulsivo, caduco pulmonum, arthritico, MIL-LAR; in pertussi; hepatemphraxi; ictero; scrofulis; spasmis; doloribus; prosopalgia; (adjuncto Conii m. usu) THILENIUS. Ataxia, hypochondriasi, et hysterico malo, laborantibus, prodest. Lumbrici, caries, paronychia, bubo, recte curantur hac gummi resina; in tympanitide etiam dyspepsia, amenorrhoea, dysmenorrhoea, chlorosi a quibusdam laudatur. In angina polyposa (Croup dicta) præsentissimum remedium.

Dos. Pulveris grana quinque, decem, viginti, ter, quaterve de die per se vel in connubio aliorum; exhibetur quoque in pilulis, et soluta infra duas drachmas ad dimidium scrupuli, quæ augetur ab una ad drachmas tres, si in usum clysteris detur. — In alcohole quoque solvitur.

Ob graveolentiam ejusdem, ut plurimum sub forma pilularum præscribitur; ubi vero adhibenda soluta, ut semper fit in clysteribus, utendum est vitello ovi, aut aliqua mucilagine. Quod semper observandum est in præscriptione gummi-resinarum, quæ plus resinæ, quam gummi continent.

PRAEP. *Clyster Asae foet.* — *Mistura ejusd.* — *Pil. Aloes et Asae foet.* — *Pil. Digit. purp.* — *Pil. Scillinae.* — *Pil. F. Asae foetid. comp.*

## FICUS CARICA.

Fructus. Виноградные ягоды, Смоквы.

CL. Polyg. O. Dioecia O. N. Scabridæ.  
Arborea Europæ australis.

QUAL. Dulcis, mucilaginosa.

V. Nutriens, emolliens, maturans, pectoralis.

Us. Decocturæ *internus*: raucitas; tussis; colica pictorum. *Extus*: fructus, lacte decocti, vel assati; forma cataplasmatidis: odontalgia; cynanche; bubo; anthrax; abscessus maturandi etc. Ano inditi suppositorii vices agunt.

*Vides.s: Decocturum Althaeae off.*



## FUMARIA OFFICINALIS.

Чистякъ. Herba, succus.

CL. Diadelph. O. Hexand. O. N. Lomentaceæ. Planta annua in hortis, et agris, sponte copiosissima.

QUAL. Inodora; sed tota stirps succo scatet intense amaro, salino.

V. Stomachica; antacida.

Us. Herbæ succus, obstructionibus, viscerumque infarctibus reserandis, scorbuto, veterum æque ac recentiorum consensu unanimi, par esse existimatur, et tunc cum succo Sisymbrii Nasturtii, Scandicis Cerefolii, Leontod. Taraxaci, Cochleariæ off. sero lactis, Aqua Selterana etc. aptissime conjungitur. In psora, non spernendum remedium est herba, vel sero lactis infusa, vel cum Zytho decocta; a cl. STRANDBERG magni nominis clinico; in herpetibus quoque, uti a LEIDENFROST, et THOMSON, in leprosis adfectionibus amplissima tulit præconia.

Ictericis et calculosis utilem esse, BICKER auctor est. Hepatemphraxeos laudatum ab excellentissimo ROGERSON reme-

dium. An melancholiæ sit par discutien-  
dæ, ut quidam contendunt, dubito.

COMP. *Spec. turion. Pini comp.* — *Succ. Cochl. comp.*

## GENTIANA LUTEA.

*Gentiana rubra* radix. Горечавка желтая.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Rotaceæ.

In alpinis temperatæ Russiæ perenni-  
ter crescens.

QUAL. Amarulenta.

V. Stomacho apta, peptica, antiseptica,  
anthelminthica, febrifuga.

Us. Ventriculi et intestinorum debili-  
tati medetur; bilis inertiae, juncta saponi,  
subvenit; acidum primarum viarum frangit,  
hinc suetum in dyspepsia remedium; fe-  
bres intermittentes in connubio adstringen-  
tium propulsat; denique in physconia ab-  
dominali, ictero, leucophlegmatia, chloro-  
si, arthritide, podagra et in primis in hel-  
minthiasi merito commendabilis.—Sub mi-  
scela aromatis grati, menstruoque vinoso  
vel spirituosissimo soluta, efficacior, melius-  
que fertur. *Extus*, ulceribus putrescentibus  
non inepta.

Dos. Radicis, a granis decem ad scrupulum, duo.

PRÆP. *Extr. Gentian.*—*Tinct. Gent. comp. Dec. Salic. comp.*—*Extr. amar.*—*Inf. Gent. comp.*—*Pulv. Salic. comp.*—*Tinct. Rhei. amara.*

### GLYCYRRHIZA GLABRA.

*Liquiritia.* Radix, succus ejusdem expressus et spissatus. Солощковый корень.

CL. Diadelph. O. Decandr. O. N. Papi-lionaceæ.

In australiori deserto ad Jaikum Rutheniæ sponte crescens.

QUAL. A principio mucilaginoso saccharino derivanda. *Odor* crudus, exacte leguminum rec. phaseoli vulgaris; *Sapor* intense dulcis, simul in legumen pisi incidens idque, parte in primis corticali, et nonnihil mucilaginosus; diutius masticata, leviuculam præ se fert amaritudinem.

V. Demulcens, expectorans.

Us. In infuso cum aliis, vel succi in tussi, raucitate, screatu, in adfectionibus pectoris, nephritide, blennorrhagia, stranguria, catarrho, paraphonia, dysenteria, ubi deficit mucus naturalis etc. — Additur quo-

que radix aliis, ad celandum eorundem ingratum saporem, ut pilulis pulvis, vel eo inspergitur fine, vel ideo, ne inter se cohærescant.

PRAEP. *Succ. spissat, vulgo extractum.*

*Decocturis, infusis, pilularum massis, pulveribus additur. Spec. Althaeae comp.*

### GUAIACUM OFFICINALE.

*Guajacum*: lignum; cortex ejusdem; succus gummi-resinosus, ex arbore exsudans, concretus. Баккаймъ.

CL. Decandr. O. Monogyn. O. N. Gruinales.

Arbos in Hyspaniola, Jamaica, Barbados, Brasilia, aliisque regionibus Americæ meridionalis spontanea.

QUAL. Ligni scobis *odore* debili, resinoso; masticata, *Sapore* subamaro, acriculo. Corticis *Odor* debilis, resinosus; cortex masticatus, inter dentes friabilis; gummi resinæ *Sapor* acris, pungens.

V. Eximia: stimulans, sudifica ægro in primis calidius cooperto; eodem vero frigidius servato, diuretica. Majoribus dosibus alvum liquans, imo protracto usu, salivam movisse fertur.

Us. Rheumatalgia chronicæ indolis, arthrodynia, syphilis, PELL: Admodum verisimile est, quibusdam tantum syphiliticis morbis opponi posse, præsertim aliis acrimoniis, ut scabiosa, herpetica, scrofulosa, stipatis; virus autem venereum per se non tollit. Prodest quoque in duritie ligamentorum, et periostii post usum mercurialium superstitibus, DUNCAN. Non minimo præconio dignum est Guajacum, quod morbis cutaneis propere subveniat plerisque omnibus. In hydrope quoque vago RICHTERI, ozæna, in adfectionibus membrorum et ligamentorum scrofulosis etc. laudatur. — *Interne* sumtum caloris sensum in stomacho, siccitatem oris et sitim excitat, calorem corporis aucto et circulatione sanguinis accelerata; hinc sthenicis morbis alienum.

Dos. Lignum, in infuso, vel leni decoc-tura præberi solet; ast hæc minus efficax esse videtur; resina enim pars constitutiva, nonnisi minima quantitate in aqua solubilis, vix, ac ne vix quidem potest exere-re vim, quam præstituimus medicam; datur autem a quibusdam a drachma ad sex. Persæpe aliis additur decoctionibus;

sed cum per se adhibetur, paulum Glycyrrhizæ, ut quibusdam placet, adjici expedit. Interdum in collutorio quoque adhibetur decoctio aut ipsa per se, aut additis remediorum adminiculis. — Gummi-resina exhibetur in forma pilularum, vel in aqua, forma emulsionis a granis decem ad triginta, vel in solutione in diluto alcohole, vel pulverata a granis decem ad viginti.

PRAEP. *Gummi-resina.* — *Haust. Guajacin.* — *Tinct. Guajac. simpl. et ammoniata.* *Pulv. Guajac. et Carbon. ammon.* — *Pulv. Guajac. comp.* — *Pulv. Guajac. et Tartr. Stib. et Potass.* — *Spec. Guajac. comp.* — *Pil. Guajac. comp.*

## HÆMATOXYLON CAMPECHIANUM.

*Lignum Campechianum seu Campechense.*

Лазоревое дерево. — *Lignum; extractum.*

CL. Decandr. O. Monogyn. O. N. Lomentaceæ. Arbos in meridionali America, Jamaica, Hondura, nominatim ad sinum Campeche, regni Mexicani, copiose, sponteque crescens.

QU'AL. Tinctoria, Sapor subadstringens et subdulcis, in extractis quoque, seu

aqua, seu alcohole paratis, se prodens;  
*Odor* vix ullus.

V. Roborans, adstringens.

Us. Alvo, si fusa est firmandæ, vel decoctum vel extractum ejusdem aptum est, nec minus sub finem dysenteriae vis ejusdem medicamentosa prædicatur. Hoc remedium sæpe respondere experimenta testantur.

Dos. Unciæ duæ ad libras duas aquæ coctæ ad libram, unciatim præbendam; — extracti grana decem ad triginta pro dosi.

PRÆP. *Extractum. Dec. ligni.*

## HORDEUM DISTICHON.

*Horileum.* ЯЧМЕНЬ. *Semina excorticata*, Перловая крупа, *Maltum*, солодь.

CL. Triandr. O. Digyn. O. N. Gramina. Planta annua, ubique colitur.

QUAL. Mucilaginoso, farinacea, amylaceæ indolis.

V. Seminum: demulcens, emolliens, et plus quam avena nutriens; malti, antiseptica, alvum liquans.

Us. Farina, conficiendis cataplasmatibus, et fomentis siccis apta; cui tamen pro re nata, secalitia, subrogari potest. Malti de-

coctum scorbuto non alienum. — Ptisana ejusdem acidulata morbis acutis apta.

PRÆP. *Acetum, Alcohol, Cerevisia, Maltum, Decoct. Hordei.*

## HUMULUS LUPULUS.

ХМЪЛЪ. Strobili (coni), antequam floruerint colligendi et siccandi sollicite.

CL. Dioec. O. Pentandr. O. N. Scabridæ. Perennis, in quibusdam insulis fluvii Jenisei H. Lupulus spontaneus, tam bene viget, ut venditio in vicinas terras, incolis Krasnojarcensibus insigne lucrum adferat, alibi vulgaris ad sepes, alibi adornatis lupuletis, pro usu oeconomico colitur.

QUAL. *Odor* grate aromaticus, nidorosus; *Sapor* amarus.

V. Narcotica, stomachica, excitans.

Us. Fere ubique, ubi Opium dare expedit, utilitatem promittit; cervicali subditi coni, somnum arcessunt.

Dos. Pulveris grana tria; Tincturæ guttæ quadraginta. Pro succedaneo Opii habetur, eique merito subrogatur in variis casibus. *Videsis: Dissert. inaug. de Hum. Lupul., a cl. de'ROCHES, Edinburgi 1803, publici juris factam.*

PRÆP. *Tinct. Hum. Lup. — Pil. ejusdem.*



## HYDRARGYRUM.

*Hydrargyrum virginicum.* Ртуть, живое  
серебро.

LIN. CL. II. Mineræ, Metalla.

Est metallum in calore atmosphærico liquidum; in summo autem frigoris gradu sub  $34\frac{1}{2}$  Reaumuriani thermometri solidescens, atque malleabile, coloris splendidi, argentei, ponderosum nimis, et in mediocri igne totum evaporans.

Purum neque adulterationis suspectum facile globulis exacte rotundis, levissime iterum coëuntibus currens in charta, in cursu nil impuri relinquens, acetum minime dulcificans, vel plumbeas particulas per reagentia detegendas, nequaquam prodens, per corium expressum, fere nil imundi, vel pulverulenti relinquens, cognoscitur.

Reperitur, seu nativum Mercurius virginicus, dictum, seu Sulphure, in Sulphuretum Hydrargyri rubrum, seu Cinnabarin versum, in quod ubi vertitur, pro variis, quibus inhæret terris, varias effingit mineras. Sit purum, nullo alio contaminatum metallo, quod deflagratione

in cochleari ferreo supra carbones detegitur, ubi Hydrargyrum avolat, metallo, quod admistum fuit, relicto. Cujus superficies neutiquam nitet, ast fusca et quasi membranula obducta, adparet, tardius et globulis quasi caudatis currens, nigra vel cinerea relinquens vestigia, adulteratum est. *Sapor* dulcis Aceti cum Hydrargyro digesti, colorque obscurus ex admisto liquore vini probatorio HAHNEMANNI indicat depravationem cum Plumbo; Acidum nitricum Hydrargyro adfusum, stannum commistum in oxydum album corrodit. Bismutho inquinatum in acido nitrico diluto solutum Hydrargyrum, adfusa aqua destillata, albo præcipitatur colore, quod præcipitatum, est oxydum Bismuthi. Pro medico usu instituitur optime revivificatio Hydrargyri via humida, coctione cum ferro in aquæ sufficiente quantitate et Muriate Hydrargyri oxydato (corrosivo). Ex Idria, Hispania, India orientali, et Palatinatu obtinetur, in variis quoque Siberiæ montibus, obvium.

V. Stimulans, solvens, resolvens; minime vero, ut WEICKARD adserit, roborans. Agit in omnia systemata; præcipue vero

in lymphaticum, in omnes excretiones; maxime vero in glandulas salivales, deincutim. Dum datur calcinatum, ventriculo et intestinis struit insidias debilitando. Salia ex eodem lotium movent etc.

Hinc liquido perspicitur, usum Hydrargyri in morbis latius patere, atque pro ratione connubii, habitus corporis, temperaturæ, præparationis etc. varium exercere effectum; agit vero, ut errhinum Subsulphas Hydrargyri, ut sialagogum idem, in quavislibet forma, ut catharticum Murias Hydrargyri oxydulatus, ut diureticum Murias Hydrargyri oxydulatus et oxydatus in connubio præsertim aliorum diureticorum, ut sudificum Murias Hydrargyri oxydulatus, ut stimulus idem, imo ut antispasmodicum, anthelminthicum etc.

Us. Hoc proinde scopo sub variis formis præscribitur in febribus intermittentibus rebellibus, morbis sthenicis, in inflammationibus chronicis et in primis viscerum, jecinoris, lienis etc. in morbis exanthematicis, variolis, DIMSDALE. Profluviis, dysenteria etc. spasmis, tetano, trismo, hydrophobia, cachexia, anasarca, ascite, hydrothorace, hydrocephalo, sy-

philide, impetiginibus, scrofula, lepra, ictero, morbis localibus, caligine corneæ, amavrosi, blennorrhoea, herpete, tinea, psora etc.

## HYOSCIAMUS NIGER.

Блекоша, Бѣлена. Herba, folia recentia.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. solanaceæ.

Biennis ubique ad vias, et in pingui-  
bus desertis crescens.

QUAL. Venenata, in principio sita nar-  
cortico, *subinsipida*; odor virosus.

V. Narcotica, anodyna, antispasmodica,  
resolvens. Alvum tantum abest, ut adstrin-  
gat prout Conium maculatum, ut potius  
interdum solvat eandem.

Us. Paralysis; varix ani; hæmorrhagiæ  
ab irritatione; palpitatio cordis; variæ-  
que nevroses, ut mania, melancholia, epi-  
lepsia, hysteria, algemata, videlicet, ubi  
e re est, actionem præternaturalem immi-  
nuere, doloremque sedare, in omnibus his  
casibus, tantam quantam Opium, promit-  
tit utilitatem, persæpe utiliore hoc se  
præstat, loco cujus, præcipue ubi obsti-  
patio usum Opii contraindicat, adhibetur

aptissime. *Externe* forma cataplasmatidis foliorum, vel emplastri ex oleo seminum, pulveris herbae, cera et terebinthina, vel unguenti ex pulvere et adipe suilla: scirrhum resolvere fertur. Ulceribus quoque rebellibus pulvis foliorum inspersus, proficius. Usu cognitum est, majores doses effectus esse notabilioris, et quidem sudoris copiosam eruptionem, placidum et profundum somnum, animi serenitatem, et corporis vigorem, capitis obnubilationem, gravitatem et cephalalgiam, vel vertiginem, sensuum internorum torporem, exanthemata vel fusca serpigiosa, pustulosa, in mento et gena oriri; nasci quoque in quibusdam copiosum lotii profluvium, crebrioresque alvi dejectiones, haud secus ac alios vomitum experiri, quosdam ventris tormina, soporeque sub dilatatione pupillae tentari, experiundo didicimus.

Dos. Granum dimidium, grana duo ad viginti, sensim, sensimque idque ascendendo cautissime; adsuetis major quoque dosis impune dabatur.

PRAEP. *Succ. spissat. (extractum) foliorum. — Tinct. Hyosciami n.*

## INULA HELENIUM.

*Enula campana.* Девесилъ.

Radix, (carnosa mucilaginea, crassitie pollicis, extus fusca, intus alba).

C. L. Syngenes: O. Polyg. superfl. O. N. Compositæ radiatæ.

QUAL. Præstans: a volatili repetenda oleo; Sapor ex acri sub-amarus, sub-nauseosus; Odor subaromaticus. Camphoræ, acidoque benzoico, attestantibus NEUMANN et GEOFFROY, similis.

V. Stimulans, Angelicam A. æmulans, incidens, expectorans anthelminthica.

Us. In morbis pectoris asthenicis; tussi; asthmate pituitoso; chlorosi, etc. laudatur. Contra psoram in unguento celebritatem consecuta est. An pro alexipharmaco, quin pro præservativo contra pestem, ut RAJUS et DIEMERBROECK contendunt, haberi queat, non scimus pro certo.

Dos. Vel in pulvere ad semidrachmam, vel supra, vel aqua decocta, sive infusa datur. Præcipue infusum vino factum arridet.

PRAEP. Spec. Alth. comp. — Ung. Inulae.

## JUNIPERUS COMMUNIS.

Lignum; baccæ. Можжевелъникъ.

CL. Dioec. O. Monadelph. O. N. Coniferæ.

Frutex in acclivibus exsuccis, aridisque  
Rusiæ temperatæ germinans.

QUAL. Baccarum, in oleo volatili copioso, et dulci mucilaginoso proprio residens. *Odor* baccarum pulpæ aromaticus, satis gratus; *Sapor* aromatico-dulcis, dein subamarus; ligni idem; sed debilior.

V. Baccarum, ligni et resinæ: stimulan-  
s, sudifica, diuretica, tonica; decocti  
et extracti: minus stimulan-  
s, magis diuretica.

Us. Hydrops; scorbutus; syphilis; morbi cutanei. Olei: vermes. — Suffimen, non tam ad corrigendum aëra, quam ad graveolentiam, ubi opus fuerit, obtundendam, vulgatissimum.

Dos. Adhibetur lignum, baccæ et oleum. — Lignum rarius in infuso, vel leni decoctura a duabus drachmis ad unciam. Baccarum antea contusarum, in infuso drachma, semuncia, ad selibram vel libram aquæ vel vini. Olei guttæ duæ ad decem. *Externe*: non tantum suffiendis va-

letudinariis, aptæ; sed etiam fomentis, cataplasmatisque uniuntur commode. A quibusdam lignum radicis, trunci ligno, minus odorario, præfertur, imo pro succedaneo ligni Lauri Sassafras habetur.

PRÆP. *Roob bacc. Jun. — Infus. bacc. Jun. — Spec. turion. Pini comp.*

## IUNIPERUS SABINA.

*Sabina.* Донской или козацкой можжевельникъ. *Folia.*

CL. Dioec. O. Monadelph. O. N. Coniferæ. Fruticosa, hortensis, locis excelsis Sibiriae spontanea.

QUAL. Eximia, a copioso volatili oleo dependens. *Odor* hircosus; *Sapor* acris, subamarus.

V. Stimulans, menagoga, diuretica, diaphoretica, antispasmodica, anthelminthica, corrodens.

Us. *Internus*: amenorrhoea atonica, podagra; *Externus*: psora; tineæ; ulcera fungosa; gangræna; verrucae; condylomata; odontalgia; idque forma pulveris, decocti, infusi, aut cataplasmatibus. — Pulvis, cerebri fungis, et ossibus cariosis, recte inspergitur.



PRAEP. *Infus. summitat.* — *Pulv. Iunip. s.*  
*Pulv. Superfulph. Alum. et Potass.*

## K I N O.

*Gummi Kino.* Gummi rubrum adstringens Gambiense, FOTHERGILL. Gummi-resina, obscura; haud desunt, qui existimant esse succum Eucalypti resinosæ spissatum; alii autem extractum Coccolobæ uviferæ sibi persuadent.

Africana.

QUAL. Præstans: in tanino residens, styptica.

V. Valde adstringens, antiseptica, roborans.

Us. Pulveris vel infusi *interne et externe*: hæmorrhoea; hæmorrhagia; blennorrhoea; diarrhoea; leucorrhoea; dysenteria; lenteria; metrorrhagia. Amaris juncta, febribus intermittentibus opponebatur. *Extrinsecus* injectione, ulceribus saniosis, medetur.

Dos. Pulveris a granis decem ad scrupulum. *Extractum Tormentillæ erectæ* (a SCHWENSONIO factum) huic æquiparabile, idque in repositoriis haberi debet.

PRAEP. Tinctura cum alcohole diluto parata, ad semunciam danda. *Pulv. Sulph. Ferri et Kino.* — *Vin. lusitanic. artefact.*

## LAURUS CAMPHORA.

*Camphora.* Камфopa.

Substantia concreta, resinoso-oleosa, subpellucida, splendens, friabilis, summe volatilis, in sordidis deformibus glebis, per Batavos allata, atque ab iisdem nova, uti videtur sublimatione, calcis ope, per se extinctæ et dilapsæ, depurata et in orbiculares massas, infra concavas, coacta CAMPHORÆ insignita nomine.

CL. Enneandr. O. Monog. O. N. Oleraceæ. In India orientali nominatim Java, item Capite Bonæ Spei, haud secus, ac in Japonia occidentali et contiguis insulis Saikokf, Nipon, aliisque, præsertim in provincia Satsuma, arbos vulgaris; in hypocaustis vero hortorum Europeorum florens interdum.

QUAL. Egregia, in principio residens volatili. *Odoris*, est fragrantissimi, penetrantis ad Rosmarinum accedentis; *Saporis* calidissimi menthæ piperitæ æmuli, linguam et fauces penetrantis.

V. Stimulans, nervina, diffusibilis, res-  
solvens, sudifica, antiseptica, antispasmo-  
dica, anthelminthica.

Us. *Interne*: quod de plerisque volatili-  
bus stimulantibus prædicatur, id de Cam-  
phora quoque in universum dici potest,  
in omnibus nempe formis, gradibusque  
febrilis et chronicæ debilitatis utilitas  
ejusdem emicat. In genere calorem in cor-  
pore auget, idque ad sudorem præparat,  
quin arteriarum micatus auctiores red-  
dat. In principio vires vitæ excitat; in  
statu autem morbooso actiones abnormes  
sedat, nec minus dolores a spasmis.

Dum pulsus est durus et contractus,  
propinata Camphora fit mollior; in de-  
liriis quum Opium irritato conatu adhi-  
betur, Camphora placidum arcessendo  
somnum juvat; nominatim vero in omni-  
bus asthenicis febribus, ut putridis vul-  
go dictis, petechialibus, aliisque exan-  
thematis, ut variolis, morbillis, pur-  
pura, vel scarlatina ob fatiscentiam viri-  
um, subito retrocedentibus, atque ad cu-  
tem resuscitandis, languenti horum exan-  
thematum eruptioni utilem stimulum sub-  
dendo. Sic et psora infantum, perfrictio-

ne, vel intempestiva inunctione retrograda, si eclampsiam excitavit, isque adfectus recens est, in pristinam hocce auxilio sedem restituitur, ROSENSTEIN. In catarrhalibus, rheumaticis, arthriticis morborum formis, imo in dysenteria, si debilitati, spasmis, occurrendum est, atque etiam transpiratio promovenda. In maniae variis formis, PARACELsus, FRIEWALD, et quidem auctiore dosi a drachma ad duas de die. Spasmos quoque et convulsiones compescit: hinc in epilepsia, CULLEN, HANNES, asthmate convulsivo, pertussi, chorea St. Viti, helminthiasi; in morbis viarum urinarum et obscænarum partium, ut in priapismo, nymphomania, dolorifica mentulæ vel cunni tentigine stipatis; in inflammatione renum, ad sistendam irritantem Lyttæ vesicatoriæ vim, vel aliorum acrium diureticorum, ut Scillæ m. hinc profectam.

Vires sialagogas Hydrargyri, et drasticonum evacuantes infringit, QUINCY, BARRY, HUXHAM. Cum Sulphure, pictonum colicæ occurrit. In iisdem fere omnibus morbis Camphora *extus* admota, juvat, præsertim, si parti adfectæ, vel ejusdem

viciniæ stimulum quemdam imprimere subdereque expedit, quem in finem in variarum præparationum forma propinatur, et quidem, ad discutiendas sugillationes et inflammationes oculorum, laudatur, uti etiam in morbis a debilitate eorundem oriundis, morbosaque irritabilitate, per modum vaporum, lotus, unguenti etc. Unguentorum mercurialium ex Oxydis Hydrargyri paratorum efficacia, sæpius addita tantum Camphora, in inflammationibus chronicis enitescit; — in erysipelate per modum sicci fomenti, addita aromaticis herbis, nec minus in topicis catarhalibus, rheumaticis, arthriticis adfectionibus utilis, parte nimirum adfecta, panno laneo, vel gossypio, Camphora resperso, tecta. In variis internis spasmis, asthenicis inflammationibus, topica debilitate, paralysi, meteorismo etc. Camphora, Alcohole vel Æthere soluta, vel per modum unguenti irritantis, idoneum remedium. Gangrænam et sphacelum arcet; ulcera fungosa corrigit, morsuram insectorum lenit, etc. Medicina adeo valens, æque facile sine dubio insidias struere potest, ac prodesse, nisi provida cura evitentur

scopuli; hinc cavendum est ne colluvie in primis viis latitante detur, aut congestionibus ad superiores partes factis. Acutis, tutius instante crisi, aut præsentē, et sub declinationem convenit.

Dos. *Interne*: pro ætatis, sexus, temperamenti, morbi differentia, variat. In universum convenit initium minoribus præbiis facere, nisi vis mali aliud urgeat; — in acutis febribus exigua grani unius dosi ad quatuor pluries per diem adquiescimus, in asthenicis ad decem, eaque sola datur per se pulverata cum saccharo, Alcohole, gummi Mimosæ niloticæ, etc. trita; vel cum Magnesia, vel cum Nitrate Potassæ, Opio, Moscho, conjuncta. In infusionibus stimulantibus, decocturis, in vino, Alcohole, Æthere sulphurico, vel eodem alcoholisato, Acido acetico diluto, emulsionibus e mucilagine gummi Mimosæ niloticæ, saccharo, albumine ovi, amygdalisque, parandis. Per modum pilularum cum extractis amaris, gummi-resinis, foetidis etc. Quoniam effectus ejus sunt evanidi, sæpius repetenda sunt præbia; in mania, majores exhibentur doses; circumspecte tamen ne, quod

fieri interdum adsolet, syncope, anxietas, nausea, vomitus, convulsiones, deliria etc. excitentur, qui effectus, vel mitigantur Opio, vel tolluntur.

ПРАЕП. *Acetum camph.* — *Aeth. sulph. alcohol. camph.* — *Tinct. Opii camph.* — *Alcohol. camph. Catapl. antisept.* — *Haust. guajacin.* — *Lin. camph. ammoniat.* — *Mist. camph.* — *Pil. guajac. comp.* — *Pil. Mur. hydr. oxydul. et camph.* — *Pil. Mur. hydr. oxydul. stibiatae.* — *Ung. opht. cuprat.* — *Ung. Tart. Stib. et Potass.*

## LAURUS CASSIA.

*Cassia lignea.* . Cortex, flores.

Дикая корица.

In Indiis orientalibus, et Sinensi Imperio crescit.

\* QUAL. Ab oleo volatili repetenda. Odor fragrans; Sapor acris, aromaticus.

V. Stimulans, calefaciens, peptica.

Dos. Scrupulum ad drachmam.

Substituitor in promercio interdum cortici Lauri Cinnamomi, vel illi fraude interseritur, pro succedaneo ejusdem, licet sit debilior, recte habetur.

ПРАЕП. *Aq. destill.* — *Acid. sulph. aromat.* — *Dec. Cinchon.* — *Dec. Haematoxyli* —

*Inf. Mim. Catech. — Pulv. aromat. — Tinct. Mim. Catechu.*

## LAURUS CINNAMOMUM.

*Cinnamomum verum.* Cortex. Корица.

CL. Enneandr. O. Monogyn. O. N. Oleaceæ. Arborea in variis Indiæ orientalis, Americæque regionibus crescens.

QUAL. Heroica: ab oleo volatili, quod ei inest, dependet. *Odorem* gratissimum aromaticum spargit, et cum *Sapore* suavissimo, acriculum dulcemque, et leviuculum adstrictionis sensum conjungit.

V. Stimulans, cardiaca, roborans.

Us. Ob gratiam saporis, cortex, pro conditura eduliorum adhibetur; a medicis vero sæpe medicinis additur ejusdem virtutis, saporis quoque corrigendi gratia, idque in morbis atonicis, dyspepsia, anaphrodisia etc.

Dos. Pulveris, grana decem ad triginta.



## LAURUS MYRRHA. LOUVEIRO.

Cortex; Gummi-resina, MYRRHA dicta, quæ ab aliis, Mimosæ cujusdam esse productum existimatur? Мирра или Смирна.

CL. Enneandr. O. Monog. O. N. Oleraceæ. Arborea; Chinæ, Cochinchinæ litto-  
risque meridionalis et orientalis maris Ery-  
thræi. Optima est, quæ e Troglodytitia  
Abyssiniæ provincia, adfertur.

QUAL. Non ingrata odorifera, admôdum  
amara, et aromatica, sapida.

V. Stimulans, stomacho idonea, mena-  
goga, antiseptica; secretiones quoque le-  
niter movet.

Us. *Internus*, masticatæ Myrrhæ vel in  
alcohole diluto solutæ: Morbi pectoris  
atonici; phthisis; asthma pituitosum; ca-  
tarrhus; amenorrhoea atonica. *Extrinsecus*:  
inspergitur pulvis ejusdem, ulceribus ato-  
nicis, cariosis, putidulis; quin gangræna  
adfectis. Nec Cynanchæ atonicæ, laxitati  
gingivarum, aphthis aliena.

Dos. Grana decem, scrupulum, semi-  
drachma. Tincturæ: drachma.

PRAEP. *Tinct. Myrrhae. Mist. Myrrhae. ferr. — Pil. aloët. — Pil. Assae foet. comp. — Pil. Rhei.*

## LAVANDULA SPICA.

Лаванда, Увѣчная трава. Flores.

CL. Didynam. O. Gymnosp. O. N. Verticillatae.

Suffruticosa, Europæ australis, hortensis.

QUAL. Præstans, ab oleo volatili copioso, quod eidem inest, repetenda. *Odor*, fragrans, acceptus; *Sapor* subamarus, aromaticus, calidus.

V. Stimulans; nervos reficiens, roborans.

Us. In defectionibus animi; paralysi; tremoribus artuum affinisque systematis nervosi morbis; ut etiam in aphonia, balbutie, laudes tulit; ast, meo arbitrato, tutius sacculis, et fomentatione *extus*, ad varias humorum stagnationes dissipandas, superdatur.

PRAEP. *Pulvis pro suffimento.*

## LICHEN ISLANDICUS.

Исландскій мохъ.

CL. Crypt. O. Algæ. Perennis, in borealis Russiæ, nemorosis saxetis, perfrequens.

QUAL. Eximia subamara, mucilaginosa.

V. Nutritia, subadstringens, roborans.

Us. Morbi pulmonum asthenici: phthisis; tussis; hæmoptysis; catarrhus chronicus; atrophia; cita alvus, dysenteria.

Dos. Alga, integra usualis, perraro adhibetur in pulvere; ast potissimum, vel lacte decocta, (prius tamen in grossum pulverem redacta) a duabus drachmis ad unciam in selibra, vel libra aquæ, vel lactis. Gelatina quoque fit ex eadem cochleatim administranda.

PRAEP. *Dec. Lichen Island.*

## LINUM USITATISSIMUM.

Ленъ. Semina.

CL. Pentandr. O. Pentagyn. O. N. Grinales. Annua planta in agris seritur.

QUAL. Mucilaginosa, oleosa; semina Saporis ingrate dulcis, mucilaginosi, unctuarii, inodora.

V. Emolliens.

Us. Decocti vel infusi: nephritis; pneumonia; catarrhus: tussis; dysuria; blennorrhagia; *externe*, forma clysteris: tenesmus. — Farina, apta cataplasmatibus in cynanché, phlegmone. — Mucilago quoque cum aqua fervefacta, vel infusione, vel coctione, elicitur perfacile, quæ efficacia sua vix cedit, mucilagini Althææ off. seminum Plantaginis Psyllii, et Pyrus Cydoniæ, et gummi Mimosæ niloticæ, meritoque his in militari praxi substituitur.

PRAEP. *Oleum. Farina. Catapl. varia* — *Infus. seminum.*

## LYTTA VESICATORIA. FABRICII.

*Meloë vesicatorius* LINN. *Cantharides* ПН. R. Шпанскія мухи. Oblonga e viridi splendens, antennis nigris filiformibus.

CL. Insecta. O. Coleoptera. In regionibus calidioribus Europæ abundans; in Ruthenia vero in districtu Samarsky, et proximo Sergiewsky, dum Fraxinum, Ligustrum, Populum albam, Sambucum, Loniceram tataricam, quibus in primis delectatur, gregarie depascuit, legitur, atque, vel ope vaporum aceti, vel per immer-

sionem in eodem, morte adfecta, siccatur leviter. Minor, non ultra perpauca grana ponderans, integra non pulverulenta, recensque merito præfertur.

QUAL. *Odor et Sapor*, nauseosus, teterimus et piceus est.

V. Irritans, rubefaciens, vesicans. In minori dosi, diuretica, sudifica.

Us. In morbis viarum urinarum athenicis, et quidem in paralyti vesicæ; ischuria; incontinentia urinæ; in blennorrhoea chronica. Pro aphrodisiaco tantum abest, ut haberi possit, ut potius hoc scopo sumta, vix impune feratur. — Hydrophobiam eadem coërceri WERLHOFFIUS magnæ existimationis vir, adseverat. Formula, quæ ad eum refertur, habet: granum Lyttæ vesicatoriæ, sesquigranum Muriatis hydrargyri oxydulati, et decem Camphoræ grana, gummi Astragali Tragacanthæ sufficienti quantitate excepta, et in æquales pilulas divisa. In pertussi, SUTCLIFF, BURTON, tutissime, nonnisi sub declinationem, id est, ultimo stadio, arbitrato meo, convenit. An expectorationis causa, ut CHALMERS (in peripneumonia) suasor est, exhiberi queat, dubito.

Morbis cutaneis a quibusdam cum successu opposita, ut herpetibus, lepræ etc. MEAD, BRISBANE. Tincturam Lyttæ, adversus herpes, efficaciorē esse SIMMONS testatur. Nec defuerunt, qui in ipsis malignis, vulgo putridis, nervosisque febribus, uti etiam in hydropisi, multis eandem encomiis deprædicarent. Lytta vesicatoria vim suam potissimum, in vesicam et renes exserit, etsi, ut quibusdam placet, addita Camphora, tutius administretur; nihilo tamen secius, magna cura cavendum, ne malos effectus pariat, puta: nauseam, violentos evomitionis conatus, colicos dolores, molestam sitim, viarum urinæ inflammationes, ingentem lotii ardorem, mictum cruentum, exulcerationes intestinorum, animam foetentem etc. quæ incommoda, ubi præpòstero consilio evenerint, reparari possunt, si emetico non est amplius locus, demulcentibus potionibus, seu illæ decoctiones fuerint, seu emulsiones vel lactis, vel olei, vel, ut quidam asserunt, camphorata emulsione. *Externe*: ut stimulans, vel rubefaciens, vel vesicans adhiberi potest: 1) ad intendendam nervosi systematis totius corporis actio-

nem, vel organi cujuspian singillatim sumti. 2) ad diminuendam actionem morbidam, quorundam organorum, stimulum parti admovendo. In plerisque typhodibus morbis utilis, præcipue, si viscus quoddam, ut cerebrum, pulmones, jecur, affectum fuerit, tum vesicatoria, etsi non laboranti admovenda parti, propius tamen ad illam superdantur; ubi vero organon quoddam obstructum, torpens, excitari expedit, tum parti ipsi imponendum irritans. Utilitas proinde talis modi irritantium emicat in primis in paralyysi, malo ischiadico, rheumatalgia, item derivandi scopo in exanthematibus, metastasibus, apoplexia etc.

Dos. Perraro in pulvere datur interne; si tamen danda est, initium fiat a sexta grani parte ad dimidium, dein ad granum, et sic gradatim ad maximum gradum granorum quinque perveniendum; miscenda vero cum saccharo, ac præscripta dosis vicibus repetitis, suscipienda. In forma pilularum a grani  $\frac{1}{4}$  ad  $\frac{1}{2}$  et granum.

Frequentissime in tinctura exhibetur a quinque ad quindecim guttas, idque cum emulsione amygdalina, vel aqua, sensim

adscedendo. Sub administratione ejusdem decoctiones mucilaginosæ, ptysanaria, emulsiones non sunt alienæ. Ad imminuendam Lyttæ acritatem additionem camphoræ quidam suadent; sed Nitras Potassæ, et demulcens potio, aptior est huic fini.

PRAEP. *Emplastrum et Tinctura ejusdem.*

## MATRICARIA CHAMOMILLA.

*Chamomilla vulgaris.* Ромашка. Flores.

CL. Syngen. O. Polygamia superfl. O. N. Compositæ radiatæ. — Annua in Ruthenia australi spontanea.

QUAL. A volatili oleo, principioque extractivo, amaro, dependens. *Odor* florum, fragrans, non admodum gratus; *Sapor* amarus.

V. Leviter stimulans, sudifica, antispasmodica, peptica.

Us. Febribus intermittentibus, diarrhoeis, dysenteriis, colicæ flatulentæ, denique podagræ, typho, gravibus utero mulieribus, puerperis, multis modis, apta esse censetur. *Extrinsecus* quoque, recte admovetur, forma balnei, clysteris, cataplasmatidis, infusi, pulveris.



Dos. Florum: a semidrachma ad duas per se, in infuso, forma Theæ.

Cavendum est, ne flores hujus, cum floribus Anthemidis Cotulæ confundantur. Disconveniunt illi, tum odore, tum setacea palea in anthemidis cotulæ receptaculo, repertitia. Infusum tepidum promovet usum emeticorum, frigidum stomachicum est; oleum vero essentielle antispasmodicum.

PRAEP. *Infus M. Cham. cum Subcarbon. Potass.* — *Inf. per se.* — *Spec. aromat.*

## MEL CÔMMUNE PURUM.

*Mel virgineum.* Медъ.

Ex cellulis nidi apis mellificæ suspensis sponte stillans.

QUAL. Principio, ut verisimile est, privo acido succumque Sacchari officinarum crystallisatum æmulante nititur. *Odoris* est fragrantis haud raro plantas, e quibus legitur redolens, quod in taurica Chersoneso obtinetur apud nos, odoratius; *Saporis* est proprii, dulcis. Mel sub torridis zonis, quod mellificæ apes e narcoticis plantis legunt, est veneniferum.

V. Nutriens, resolvens, antiséptica, ec-coprotica; *externe* maturans.

Us. Morbi pulmonum pituitosi; ulcera crurum scorbutica. Saccharum melli præferendum; subinde enim hoc dolores colicos, tormina etc. producit.

Dos. Uncia, duæ, ter de die.

PRAEP. *Cataplasma fermentans.* — *Catapl. pus maturans.* — *Mel despumatum.*

## MENTHA CRISPA.

Мята.

CL. Didyn. O. Gymnosperm. O. N Verticillatæ. Planta perennis Sibirica, in hortis colitur a Ruthenis.

QUAL. Ab oleo volatili pendens: *Odor* fragrans fortis, non admodum gratus; *Sapor* aromaticus cum amaritie levi.

V. Stimulans, menagoga, resolvens, stomacho apta.

Us. Inflationem levat, hinc hypochondriacis, hystericisque, ructus excitando, utilis, nec proinde immerito, a MARTIALI ructatrix dicta. Colicos quoque dolores ex eadem causa ortos, mitigare fertur. *Extus* admota, dolores artuum a spasmo; lactis in mammis coagulum; ecchymoma; tumores frigidos discutit.

Dos. Infusi, uncia ad libram aquæ.

PRÆP. *Oleum. dest. — Aqua dest. Infusum herbae. — Spec. aromat.*

## MENTHA PIPERITA.

*Mentha piperitis.* Перечная мята. Herba.

CL. Didyn. O. Gymnospermia. O. N. Verticillatæ.

Perennis, in australi Russia hortensis.

QUAL. Præstans: a volatili oleo camphorino derivanda. Gustata herba, mox aromaticum atque camphoraceum prodit *saporem*, et primum fauces, fervore quodam replet, insequente dein, haud ingrato frigoris sensu. *Odor* ejus fortis, non ingrate fragrans.

V. Stimulans, peptica, antispasmodica, resolvens.

Us. Febres asthenicæ, vomitu, cita alvo, colica flatulenta, hypochondriasi, hysteria, inflatione, ructibus etc. stipatæ; satyriasis; gastrodynia a spasmo etc.

Dos. In pulvere grana decem, ad scrupulos duos. Infusi: uncia ad libram aquæ. Aquæ: uncia ad duas. Olei: gutta ad tres, quinque.

PRÆP. *Oleum volatile.* — *Alcohol.* — *Aqua dest.*

## MENTHA PULEGIUM.

Полѣй. Herba.

CL. Didyn. O. Gymnosperm. O. N. Verticillatæ.

Perennis Europæ australis.

QUAL. A volatili repetenda oleo, eadem ac Menthæ crispæ; acrior tamen.

V. Eadem, ut Menthæ crispæ.

Us. Spasmis durante menstruatione, uti et pertussi olim ab Anglis opponebatur, quem in finem succum ejus ad unum cochleare commendavit BOYLE. Decoctura ejusdem edulcata in raucedine; infusum theæforme in asthmate laudatur, CHOMEL; infusum vero cum vino albo et limatura ferri præparata factum, pro certissimo et nunquam fallente emmenagogo habetur; HALIER.

PRÆP. *Aqua destill.*

## MENYANTHES TRIFOLIATA.

*Trifolium fibrinum.* Baxma. Folia.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Rotaceæ. Perennis, locorum paludosorum et lacustrium, occurrit per omnem Rutheniam.

QUAL. A principio extractivo amaro repetenda; *Odoris* nonnihil fatui; *Saporis* amarulenti, substyptici.

V. Roborans, subadstringens, anthelmintica, diuretica, majori dosi emetica, alvum ciens.

Us. Roborando in dyspepsia cacostomachum, non modo variis ejusdem topicis vitiis subvenit, sed etiam remotiora ex hujus labe pullulantia, medicatur, ideo hypochondriacis et hystericis adprime accommoda, plurimas cum aliis amaris, similis naturæ remediis, communes exserens vires. Ideo febribus quoque intermittentibus, cuticularibus vitiis, scorbuto, chlorosi, leucophlegmatæ, hydropisi apta. In Britannia succus ejusdem expressus, domesticum est apud ruricolos in foedis grassantibus exanthematibus scorbuticis, primo vere, BUCHAN. Verminantibus puellis,

opem tulisse certiori fide pronunciatur. Britanni, dum cerevisiam parant, persæpe amaritiei gratia, loco selibræ Humuli Lupuli, unciam foliorum Menyanthes trifoliatæ adhibent; idque per modum infusi, vel extracti administratur. *Extrinsecus* per modum clysteris, (KÆMPF) subterdatur.

Dos. Infusi uncia ad libram aquæ; extracti, a decem ad triginta grana.

Comp. *Extr. amar.* — *Spec. turion. Pini comp.*

### MIMOSA CATECHU.

*Catechu.* Gummi-resina, seu succus gummi-resinosus, decoctione ligni, et inspissatione parabilis.

CL. Polygam. O. Monoec. O. N. Lomentaceæ. Arborea, Indiæ orientalis, provinciæ Bahar.

QUAL. A principio tanino, peculiarique extractivo-resinoso adstringente dependens. *Sapor* subamarus, dein dulcescens, stypticus.

V. Roborans, adstringens, antiseptica.

Us. Pulveris vel tincturæ: Diarrhoea, dysenteria typhodes; hæmorrhoea. *Externe* Ulcera atonica faucium, aliarumque par-

tium, relaxatio uvulæ, hæmorrhagia, stomachace.

Dos. A scrupulo ad sesquialterum, vel majori quantitate, pro dosi.

PRAEP. *Tinctura.* — *Succus spissatus* (vulg. *extract*). — *Infusum.* — *Infus. cum Opio.* — *Pulv. Sulph. ferri et Kino.*

### MIMOSA NILOTICA.

*Gummi arabicum.* Аравійская камедь. *Succus fructus immaturi*, expressus et inspissatus, et gummi, quod ex aliis etiam ejusdem speciebus, arboribusque variis, ut *Swietenia febrifuga*, *Melia Azadirachta*, et diversis speciebus *Terminalium*, obtinetur.

QUAL. Gummi: nimis mucilaginosa, dulcescens, alimentaria, inodora; succi spissati, styptica.

V. Gummi: antiquitas emollientem, acritates involventem, tribuit. Succus: adstringens, roborans.

Us. Hanc ob causam, *interne* in aquosa solutione, tussi, pertussi, raucitati, paraphoniæ catarrhali, diarrhoeæ, dysenteriae, tenesmo, stranguriæ, apta esse censebatur. *Extrinsecus*: congrua forma adhibitum

juvat, uti etiam erosio mamillarum papillis aliisque excoriatis inspersum, aut mucilagine iisdem illita, neutiquam frustratur. Commode quoque, injecto clystere, aut mollimenti, aut nutritus gratia, adhibetur.

Adcommodum est hoc gummi fortioribus medicinis vehiculum; præscribitur quoque, ut in vehiculis aquosis resina, gummi-resina, et olea iisdem admista teneantur. Succo, tum resolutionem alvi, quum sanguifluxum sistendi efficacia, adscribitur.

Dos. In pulvere et solutum, a drachma ad semunciam, in octo unciis aquæ. Cum vero misturis additur, dosis non debet duas excedere drachmas, evitandæ densitatis incommodæ, causa.

PRÆP. *Mucilago*.—*Acet. camph.*—*Dec. mucilag.*—*Haust. guajacin.*—*Haust. terebinth.*—*Inf. Mim. Catech. c. Opio.*—*Mist. Carbon. Calc. comp.*—*Mist. Cinchon. off.*—*Massae pilularum variae.*—*Pulu. nitrat. potass. camp.*



## MOSCHUS MOSCHIFERUS.

Moschus. Мскусъ. Кабардинская струя.

Est substantia animalis unguinosa, fragrantissima, in folliculo oblongo, orificio exili prædito, prope umbilicum ante præputium sito, collecta, atque cum eodem simul exsiccata, granula nigricantia, refert, in textu celluloso deposita.

CL. Mammalia, O. Pecora. Asiæ mediæ montes inhabitat, et in primis elevationes ejusdem regiones, ut Altaicas alpes, montesque Thibetum a China dissociantes.

QUAL. Egregia: *Odor* excitatissimus, ambrosiacus.

V. Excitans, quin excalfaciat, nervina, sudifica, antispasmodica, præcipue in cerebrum agit, facultatem cogitandi, sensationem et motus voluntarios intendens.

Us. In febribus asthenicis in genere, et in primis, singultu, subsultu tendinum, deliriis, etc. stipatis, in spasmodicis, organi singularis, vel totius systematis, convulsivisque morbis, ut in epilepsia, risu sardonico, ROBAEL; in trismo infantum, tetano, pertussi, BERGHER; in hydroce-

phalo convulsionibus stipato; in hydrophobia, colica pictonum, in exanthematibus atonicis retrogradis, ut variolis, Huxham; in epilepsia et mania ab exanthematibus retropulsis, in arthrodynia atonica, retropulsa, paralyysi rheumatica etc.

Dos. Grana tria et amplius, omni vel alterna quaque hora. GREGORY in nervosis refractariolis adfectionibus ad semidrachmam propinavit. Quum in pulvere datur, aptum est ejusdem connubium, cum Valeriana off. Camphora, Saccharo, in forma pilularum vel boli, cum Opio, gummi-resina F. Asæ foetidæ, per modum misturæ, ope mucilaginis, sacchari, liquoris anodyni, teritur, atque cum aqua commiscetur.

Moschus Tunquinus, optimus, nempe e regno Thibetano adfertur, vesicam magnitudine ovi columbini replens, instructam cute, pilis radiatis, ex albo subfuscis, obsita. STÖLLER et REINICK, artificialem Moschum a se paratum, commendant, naturali, ut sibi persuadent, æquiparabilem, nos quoque parsimoniae studiosi, artificiali nostro, locum in hac pharmacopoea dedimus.

Quidam tincturam Moschi præferunt, nec immerito; Alcohol enim, eidem solvendo adcommodatissimum est. Quæ habet Moschi drachmas duas, Alcoholis libram, commista, et per septimanam macerata, colataque, præbetur a drachma ad semunciam.

### MURIAS AMMONIÆ.

*Ammonium muriaticum dep.* Ph. B. *Ammoniacum sal depuratum* Ph. R. Перечищенный нашатырь.

LINN. CL. II. Mineræ, salia. Est sal neuter constans ex acidi muriatici 42.75, ammoniæ 25.00, et aquæ 32.25.

Paratur in Germania, Gallia, Aegypto; quin etiam nativum, montes ignivomi et Calnucorum regio, largiuntur.

V. Stimulans, resolvens, lotium, pituitamque movens, anthelminthica.

Us. Adversus febres, præsertim intermittentes, in eo præsidium esse fertur; sed tum cortici Cinchonæ off. ejus succedaneis, aliisque roborantibus eundem misceri oportere, quidam adseverant. Usu profecto cognitum est, adversus hypersthenicas febres, medicamentum esse valenti-

us; gastritidi tamen et enteritidi ob sensibilitatem adfectarum partium alienum.

Non desunt, qui eundem adversus physconiam abdominalem, amenorrhoeam, helminthiasin, chlorosin, rachitidem, longam alvi resolutionem, phthisin, hydropisin, morbum caducum, scorbutum etc. accommodatum esse velint; non ubique tamen subscribente experientia.

Aptius admovetur *extrinsecus* forma lotionis, fots etc. idque stimulandi causa ex aqua, aceto, aut alcohole, præsertim in discutiendis tumoribus frigidis, aquosis, mammarum ex lacte, ecchymomate, distorsionibus, luxationibus, contusionibus, obstructionibus glandularum mania, apoplexia a plethora, vulneribus capitis, urgentibus passivis inflammationibus, cephalalgia, phrenitide, angina pituitosa, ophthalmia etc. Ulceribus sordidis, gangrænæ, morbis cutaneis, præsertim psoræ utilis, PLENCK, ARNEMAN. Solutio ejus si, dum calet, superdetur, valentior est, HORN, nisi frigoris admovendi, ut in SCHMUCKERIANIS fomentis, inciderit necessitas.

Dos. A granis decem ad scrupulum; non tamen ultra duas drachmas datur.

In majori quantitate ventrem exstimulat. Modo in pulvere, modo solutus præscribitur; ast plerumque aliis commistus remediis. Juvat eundem saporis gratia cum saccharo vel melle vel extracto aut infuso Glycyrrhizæ vel syrupo quodam misceri. Nec additamenta neutrorum salium; ut Supertartratis aut Nitratis Potassæ aliena sunt.

Adjectio Camphoræ, Cinchonæ off. vini, extractorum amarorum, aliorumque stimulantium, vix ac ne vix quidem impune fertur, HORN.

Quoniam Murias Ammonizæ in promercio præstans, non tam purus sit, ad usus medicos depuratur sequenti modo:

Muriatis Ammonizæ q. l. pulveretur in mortario lapideo, solvatur in quinque partibus aquæ simplicis ferventis, filtretur, et in vase vitreo ad cuticulam vaporet in loco frigido reponatur, et crystalli inde enatæ, exsiccatae servantur. Cum residuo, hicce labor eo usque repetatur, donec nullæ amplius crystalli surgant.

PRAEP. *Ammon. liq.* — *Carbon. ammon.* — *Cat. Coniæ m. ammoniat.* — *Cat. discut.* — *Cat. synap. acre.* — *Empl. Oxyd. Plumb. semiv.*

*comp. — Fom. comm. — Garg. Mur. ammon. — Sol. Mur. ammon. acetata. — Sol. Mur. hydr. oxydati. — Sol. Mur. hydr. oxyd. corroded. — Sol. Mur. hydr. oxyd. et ammon.*

### MURIAS SODÆ.

MURIA FONTANA LINN. CL. II. Mineræ, Sallia. *Natrum muriaticum* Ph. B. *Sal communis* Ph. R. Поваренная соль.

Ex lacubus Chersonesi tauricæ, aliisque copiose obtinetur.

QUAL. Odor nullus; Sapor salsus proprius.

V. Excitans, antiseptica, resolvens.

Us. Morbi cutanei; digestio ciborum promovenda; ad sistendum vomitum et hæmorrhagiam, hæmoptysin; sugillationes; vermes expellit; majori dosi, hæmatemesin cohibet. Per modum clysteris: obstipatio, a drachma ad semunciam; forma fatus: ecchymoma; Muriatis Sodæ, torrefacti calidi in sacculis: odontalgia; orchiocele hydropica, etc. forma balnei: in cachexiis, psora, rachitide, herpetibus.

PRAEP. *Acid. mur. concentr. — Aq. mar. artef. Aq. min. acid. — Cat. discut. — Cat. ferment. —*

*Clysteres varii.* — *Mur. hydr. oxydatus.* — *Sol. acid. mur. oxyg. vaporif.* — *Sol. alexiter. oxygen.* —

# MYROXYLON PERUIFERUM.

*Balsamum Peruvianum.* Перуви́анскій бальзамъ. *Balsamum.*

CL. Decandr. O. Monogyn. O. N. Papilionaceæ. Arborea, in regno Peruviano, Brasilia, Terra firma, Mexico, habitans.

QUAL. *Odor* suaveolens; calefaciens, roborans. *Virtus* eadem.

Us. In phthisi pulmonali, diarrhoeis, dysenteriis, blennorrhoea antiqui laudant; in colica vero plumbea a 20 ad 30 guttas in saccharo, SYDENHAMUS exhibuit; sed *extrinsecus* majorem promittit utilitatem, læsis tendinibus, vel nervis, dum leniter calefactum, vulneri instillatur; vulnera ulceraque sordida.

Dos. Guttæ vj ad xxx. sæpius de die, cum vitello ovi, vel saccharo.

PRAEP. *Linimentum albuminis ovi.*

## MYRTUS PIMENTA. Baccæ.

Ямайскій перецъ.

CL. Iccsandr. O. Monogynia. O. N. Hesperideæ, arborea Indiæ orientalis.

QUAL. *Odor* fragrans, gratus; *Sapor* aromaticus.

V. Stimulans, calefaciens, stomachica.

Us. Aliis aromaticis carioris pretii, ut nuci Myristicæ, cortici Lauri Cinnamomi, floribus Caryophylli aromatici, recte subrogatur.

Dos. Grana quinque ad scrupulum.

PRAEP. *Aqua destillata.*

## NICOTIANA TABACUM.

Folia siccata. Табакъ.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Solanaceæ.

In America perennis; annua vero apud nos, cultuque frequens.

QUAL. Venefica, ab essentiali acri oleo narcotico derivanda, *Odore* gravi peculiari ingrato; *Sapore* vero acri nauseoso, conspicua.

V. Stimulans, narcotica, emetica, drastico cathartica, phthiroctona, sialagoga, diuretica.



Us. Infusi, vini, tincturæ: in hydrope, dysuria; calculosis stimulo suo, aut anodyna vi prodesse videtur. Adfectionibus spasmodicis asthenicis, ut hystericis, spasmis, colicis doloribus, pertussi, herniis incarceratis auxilio fuisse perhibetur, idque, vel injecto clystere, vel fumo. In asphyxia, clyster ex infuso injectus utilis. *Externe*: In psora, herpete, tinea, cum aqua saponacea, et pulverato carbone infusum tabaci recte conjungitur. Phthiriasin caute adhibita curat, ut et alvum pertinaciter adstrictam clyster solvit. — Fumus tabaci in pestilentia suetum remedium. Pulvis ejusdem, ubi sternutamenta evocari expedit, efficax; insuefactis tamen eidem irritus; odontalgiam sedat; scorbutum gingivarum masticata impedit.

Dos. A duabus drachmis ad semunciam, pro libra aquæ, vini; vel tincturæ, guttæ triginta et ultra, in hydrope, secunda quaque hora.

PRAEP. *Catapl. Nicot. T.* — *Clyst. Nicot. T.* — *Infus. Nicot. T.* — *Vinum. Nicot. T.*

## NITRAS POTASSÆ IMPURUS.

*Nitrum nativum.* Селифра LIN. CL. II.

Mineræ, salia.

Est sal neuter, ex Acido nitrico et Kali constans, peculiari modo ex propriis excoctus terris, depuratus, crystallos effingens hexaëdras prismaticas. *Odoris* nullius; *Saporis* subamari, frigerantis.

V. Antiphlogistica, diuretica, antiseptica, etc.

Us. Febres sthenicæ, hæmorrhagiæ etc.

Dos. A sex granis ad duodecim, scrupulum, et in maxima dosi sua ad sex drachmas, spatio viginti quatuor horarum in plures exhibendus vices. Pro clysteribus quoque, gargarismis et fomentis in aptis solutus vehiculis, adhibetur.

PRAEP. *Acid. nitrico-nitros.* — *Mist. nitr. potassae.* — *Pulv. ejusd. comp.* — *Sol. acid. nitr. vaporifera.* — *Sol. acid. arsenicos. et nitrat. potass.* — *Succ. V. Oxycocci c. nitr. potassae.*

## OLEA EUROPEA.

*Olivum, Oleum olivarum.* Seu oleum fixum, expressione fructus paratum. Деревянное масло.

CL. Diandr. O. Monogynia. O. N. Sepiariae.

Arbor Europæ australis, et Africæ septentrionalis.

QUAL. Oleosa, olivum pallide e fulvo virescens, inodorum, *Saporis* blandi quin gustatu rancidum sentiatur ad 36 therm. Fahrenheit. vel 2 Reaum. congelascens.

V. Emolliens, alvum liquans, anthelminthica, involvens.

Us. Olei, in dysenteria et tenesmo rarius, in nephritide, stranguria, enteritide, colica pictonum, et id genus aliis, sæpius respondet; vermes. Acrium stomacho, vel interaneis incaute insertorum vim noxiosam, involvendo, frangit. *Extrinsecus*, calidum, corpori frictione admotum, donec sudor motus fuerit, pestilentiam et febrem americanam flavam arcere, morsiunculas, apum, vesparum, aliorumque insectorum, imo ictum ipsius viperæ, mitigare, enervareque, quidam medici per-

hibent. Oleo Ricini communis e seminibus, olivum, dum sincerum, leviorisque pretii est, merito præfertur.

Dos. Vel ipsum olivum per se uncia-  
tim, et ultra, vel sæpe sub forma emul-  
sionis ad demulcendum, per unionem cum  
aqua ope mucilaginis gummi Mimosæ ni-  
loticæ, cui sæpe ad conciliandam grati-  
am, vel saccharum, vel mel, vel syrupus  
quipiam additur, atque in dosi duarum  
drachmarum, ad duas uncias adhibetur.

PRAEP. *Oleum expressum*, ingreditur ce-  
rata, linimenta, unguentaque varia. — *Haust.*  
*saponac.*

## ORCHIS MORIO. Radix.

*Radix Salep.* Кокушкины слезы.

CL. Gynandr. O. Diandr. O. N. Mono-  
cotyledones.

QUAL. Mucilaginosa, eximia.

V. Nutriens, involvens.

Us. Diarrhoea, dysenteria, hecticæ fe-  
bres, morbi viarum urinariorum; mucilago quoque ex eadem fit.

Dos. Drachma ad duas pulveris ad li-  
bram aquæ in decoctu.

PRAEP. *Decoctura radicis.*

## ORIGANUM VULGARE.

Душица, материнка. Herba.

CL. Didyn. O. Gymnosp. O. N. Verticillatæ. Perennis in locis montanis, nemorosis, siccis, et ad margines dumetorum creberrima.

QUAL. Ab oleo volatili copioso repetenda. Proprio fragranti, gratoque *Odore* nares; *Sapore* vero acriculo, subamaro, aromatico, linguam feriunt folia; tinctoria.

V. Nervina, stimulans, resolvens.

Us. In asthmate, tussique sine febre, virtus ejusdem explorata; in phthisi quoque pituitosa a quibusdam cum successu exhibebatur, nec minorem foeminis quoque, quibus sanguis per menstrua non respondet, præstitisse vim fertur. Frequenter ad epithemata discutientia, et balnea roborantia recipi solet; in oedematibus aliisque malis exotericis et quum evidens aroma habeat, non male exoticis stirpibus cognatis præfertur. Folia siccata, aqua rite perfusa succedaneum Thææ Boheæ non ignobile præbent.

PRAEP. *Spec. aromat.*

## ORYZA SATIVA. Semina.

Сарачинское пшено.

CL. Hexandr. O. Digynia.

Annua, Æthiopiæ incola; in australi vero Europa, cultu perfrequens.

QUAL. Mucilaginosa, farinacea, insipida, inolens.

V. Nutritia, leniter adstringens.

Us. Præter cibarium, in diarrhoea, dysenteriaque, dato pro re nata, vel ptysanario oryzæ, vel alia forma laudatur. Ex eadem quoque et Alcohol paratur.

## OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

*Magnesia vitrariorum.* Марганецъ.

Venale prostat.

Us. Pro parando Acido muriatico oxygenato, in primis adcommodatum. *Extrinsecus* in modum unguenti in cutaneis morbis: scabie, tinea, herpetibus, utilis esse censetur.

Dos. Drachma ad unciam adipis Suis scrofæ.

PRÆP. *Acid. muriat oxygenat.* — *Vapores oxymuriat. acid.*

# OXYDUM PLUMBI ALBUM.

*Cerussa, Calx plumbi alba. Oxycarbonas plumbi.*

Бѣлилы. Venale prostat.

E plumbo vaporibus vegetabilium acidorum exposito, aut iisdem soluto conficitur. — Sit album, ponderosum et gustatu dulce, sub forma lamellarum friabilium, quod est sincerissimum, illique sub forma panum conoideorum, charta involutorum, prostanti, vel Veneto vel Belgico, merito præferendum, in variis Rutheniæ locis præcipue in Iaroslav paratur.

QUAL. *Odoris* est cretacei, *Saporis* adstringentis.

V. Exsiccans, discutiens.

Us. Destinatur tantum ad *externos* usus, præcipue in excoriationibus integumentorum ab acri humore productis; speciatim vero ad curandas infantum partes lotio arrosas; sed monemur a magnis viris, præparationes plumbi, extrinsecus quoque admotas, fuisse damnosas. Hinc tantum caute, præsertim ineunte ætate, adhiberi debet.

PRAEP. *Oxydum plumbi alb.*

# OXYDUM PLUMBI SEMIVITREUM.

*Lythargyrum.* Глѣмъ. Venale prostat.

QUAL. Venenifera, nervoso systemati insidias struens.

V. Sedativo-adstringens, exsiccans.

Us. Ad præparata et compositiones varias; præsertim vero conficiendis emplastris, prius in subtilissimum pulverem reductum, maxime idoneum.

PRÆP. *Empl. ejusdem nominis.*

# PAPAVER SOMNIFERUM. Макъ.

Capsulæ seminales. — Succus gummi-resinosus, incisione, vel expressione capsularum seminalium immaturarum obtentus OPIUM dictus.

CL. Polyandr. O. Monogynia. O. N. Rhoeades. Annua Aegypti, et Asiæ meridionalis; Europæ hortensis.

QUAL. Heroica; a principio narcotico cum gummi-resinoso volatili juncto derivanda. *Odor* virosus, teter; *Sapor* acris, amarus, nauseabilis.

V. Excitans, narcotica, nevrantistasin sedans, sudifica, cardiaca, majori dosi, soporifera; magna vero; lethifica. Effectus



sedans est longe major, quam irritans, cui ille statim subsequitur.

Us. Nevrantistases, id est, reactiones vis vitæ præternaturales: dolores omnigeni, ut cephalalgia, odontalgia, omne genus colicæ, præter flatulentam, præsertim in connubio aliorum. Mitigat quoque dolorem et febrem symptomaticam post vulnera, fracturas, adusta. Febres intermittentes non inflammatoriæ indolis, earumque varia stadia, imo etiam in apyrexia, opium recipit. Cum parva videlicet Cinchonæ off. quantitate, adeo iisdem proficuum est, ut nec hydropem, nec obstructionem viscerum post se trahat. Utiliter adhibetur, ubi febrientes, insomnes ducunt noctes, citaque laborant alvo; sin minus, vix utile esse potest, quum alvum adstringat, sitimque producat, et aliquas secretiones et excretiones minuat. In morbis inflammatoriis, ut phrenitide, ophthalmia, pneumonia, angina spasmodica, gastritide, hepatitide, enteritide etc. Opium cum Muriate Hydrargyri oxydulato et camphora junctum, activis inflammationibus esse adcommodatissimum censetur. Spasmi, convulsiones: in spasmo maxil-

læ inferioris cynico, et opisthotono, a longioribus ejus dosibus, egregios vidit effectus MACAULAY, HUCK, uti etiam in trismo a vulneribus, BERENDS; in pertussi WEICKARD etc. Tussis ex acri tenui, cholera, dysenteria atonica, diarrhoea, lochia dolorifica, et hæmorrhagiæ ab irritatione locali aut spasmo, menstruatio dolorifica, blennorrhagia, tumor epididymidis, vel testiculi syphiliticus, ulcera syphilitica rebellia, phagedænica, gangræna senilis et in primis extremarum partium etc. usu Opii curationem recipiunt.

*Externus:* Per modum fomenti, linimenti, clysteris; syphilidis quædam symptomata mitigat, noxas ex usu Hydrargyri ortas, corrigit, virui delendo impar; abortui, doloribusque a conamine ortis remoram ponit; imo etiam hæmorrhagiam abortu motam, sistit.

Dos. Quantitas præbii pro ratione individui, ætatis, sexus, idiosyncrasiae, habitus, variarumque circumstantiarum rerum, differt. Effectus ejusdem stimulantes magis emicant, propinatis sæpius parvis dosibus; anodynæ vero, majoribus. Quod deplerisque omnibus valde stimulantibus;

præsertim vero sic dictis narcoticis intellectum esse volumus, id etiam de Opio, id est: id ab  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{4}$ , grani, initio facto, dari debere, atque usque ad granum, quæ quantitas, vix sine noxa, excedit.

In chronicis morbis, quibus laborantes, facile adsuefiunt opio, atque in variis sævis, ut tetano, trismo, catalepsi, ad scrupulum et ultra propinari potuisse, usu cognitum est. Interdum, granum vel plura, singula semihora, vel hora, repetuntur, atque per vices cum majoribus stimulis, ut Camphora, Moscho, æthereis oleis etc. propinantur, sed hæc augmenta, nonnisi per gradus cautissime facienda sunt. Quum datur in pulvere ad faciendam facilius, tutiusque æqualem ipsius partitionem, cum saccharo, pulvere Glycyrrhizæ gl. aut aliis substantiis idem conjungi oportet; cum vero in massa pilularum præscribitur, aut in aliquo electuario, tum antea solvendum est, aliqua vini copia, aut aliquo syrupo, vel alio fluido, quod præparato congruum, ut ejus partitio accurata in massis fiat. Adstringentibus, salibus metallicis, carbonatibus alcalinis, ut usu cognitum est, præcipitatur Opium,

hinc, quum his idem addi expedit, modi, quo administretur, ratio habenda.

PRAEP. Opium, quod sequentia ingreditur. *Pil. Mur. hydr. oxydul. et Camphorae.* — *Easdem stibiatas. Pulv. C. Ipecac. c. Opio.* — *Tinct. Opii, eandem ammoniatam, et camphoratam.*

CAPSULAE SEMINALES vid. *Spec. Althacae comp.*

## PHASIANUS GALLUS.

*Gallina domestica.* Курица.

Ova, albumen eorundem, vitellus, testæ.

CL. Aves, O. Gallinæ.

QUAL. Albuminis et vitelli; oleosa, mucilaginosa, gelatinosa. Testæ, antacida.

V. Ovorum: nutriens.

Us. Vitelli per se, aut cum saccharo, vel forma linctus, aut emulsionis: morbi ventriculi ex acido. Vitellus unus, vel duo, omni mane deglutiti, icterum curant, WHITE.

PRAEP. Vide *catapl. aluminosum*; — *linimentum albuminis ovi.*

Vitellum cum gummi-resinis trituratur ut faciliùs solvantur.

## PIMPINELLA ANISUM.

*Anisum.* АНИСЪ, Ганусъ. Semen.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Umbellatæ.

Planta annua in Ægypto, Syria, aliisque regionibus orientalibus; apud nos colitur copiose.

QUAL. In volatili oleo non acri sita; Saporis dulcescentis, aromatici; Odoris, virosi, fragrantis.

V. Stimulans, lactifera, resolvens:

Us. Pulveratorum seminum: inflatio; pituitosæ pulmonum adfectiones asthenicæ. Olei: rheumatalgia.

Dos. Pulveris, scrupulum, semidrachma pro infusis in connubio aliorum; Oleum, a guttis decem ad semidrachmam pro dosi, exhibetur.

PRAEP. *Oleum. destill. Infus. fol. C. Sennae.*

## PINUS ABIES.

*Abies.* ЕЛЪ. Summitates; resina granulata incisione corticis obtenta; resinasolida, vulgo Pix navalis.

CL. Monoecia. O. Monadelph. O. N. Coniferæ. Arbor in borealibus Europæ et Asiæ crescens.

QUAL. Summitatum: resinosa: sapor acescens, resinosus. Resinæ, Sapor sat gratus, subamarus; Odor, fragrans.

V. Excitans, sudorem et lotium movens.

Us. Decocti summitatum: morbi cutis. Resinæ fusæ cum sebo externe: lepra ichthyotosis, CULLEN.

PRAEP. Resina fusa per linteum colata, vulgo Pix burgundica; resina adjecto cocta aceto ad siccitatem usque, vulgo Colophonium.

## P I N U S L A R Y X.

Лиственница. Balsamum Pini Larycis, resina liquida, terebinthina veneta.

Терпеншинъ.

CL. Monoecia. O. Monadelph. O. N. Coniferæ.

QUAL. Resinosa.

V. Diuretica, stimulans, lotium odore violaceo imbuens.

Us. Emplastra, unguenta, oleum Terebinthinæ.

PRAEP. Oleum destill. — Oleum. Catapl. antisept. — Lin. ammoniato-terebinthi. — Lin. resinoso tereb. — Lin. sulphurico-tereb. — Sapo terebinthinatus. Balsamum. Clyst. terebinth. —

*Empl. gummi-resin.* — *Haust. tereb.* — *Pil. suboxydi hydr.* — *Ung. suboxydi hydr.*

## PINUS SYLVESTRIS.

Сосна. Turionēs, сосновыя шишки. Resina alba liquida, perforatione aut incisione arboris obtenta, Balsamum Pini sylvestris, простой терпентинъ, dicta.

CL. et O. atque O. N. præcedentis.

QUAL. Resinosa, amara, acris.

V. Exsiccans, lotium, sudoremque movens, depilatoria.

Us. *Internus*: rheumatalgia, blennorrhoea, scorbutus. Decocti turionum, vel balsami Pini sylvestris: morbi cutis, herpes. *Externus*: balsami Pini sylvestris, forma clysteris: alvus adstricta; forma unguenti vel emplastri: ulcera atonica.

Dos. Turionum: semuncia ad libras duas aquæ vel seri lactis, cocta, de die; Balsami Pini sylvestris: semuncia, vitello ovi subacta cum aqua mista pro clystere. Interne grana quinque decem, ovi vitello vel saccharo subacta.

PRÆP. Balsamum Pini sylvestris exsiccatum, ignis calore, vulgo Colophonium. — Resina nigra s. Oleum empyreumaticum per descensum, destil-

*lotione obtenta, fumo inquinata liquida, vulgo Pix nigra liquida, æзомъ. — Extractum turionum pini. Balsamum liquidum, terebinthina communis, dictum. Oleum destillatum, oleum tercb. vocatum: BALSAMUM. Empl. gummi-resin. — Ung. resinos. BALSAMUM EXSICCAT. Empl. Simpl. — Empl. T. meliloti — Ung. resin. OLEUM EMPYREUMAT: Pil. piceae. — IDEM EXSICCAT. Ung. picis arid. — DESTILLAT. Sapo terebinthinatus.*

## PIPER LONGUM.

Fructus. Пёрець.

CL. Diandr. O Trigyn. O. N. Piperitæ.  
 Planta frutescens, sarmentosa, in variis Indiæ orientalis regionibus habitans.

QUAL. In principio quærenda-resinoso et cinchonino THOMSON. Acris, aromatica.

V. Incitans, stomacho imbecillo apta, calefaciens, inflationes levans, pituitam, salivamque movens, phthiroctona.

Us. Stomachi languor, dyspepsia, vertigo ab eadem causa, hæmorrhoids mucosa. *Externe*: uvulæ relaxatio, pediculi.

Dos. Perraro in pulvere ab octo ad de-



cem grana. In pituitosa ventriculi atonia in vino diffusum.

ПРАЕР. Pulv. aromat.

### PIPER NIGRUM.

*Piper rotundum*. Черный перецъ. Fructus.

CL. et O. ut et patria, QUAL. VIRT. Ususque eadem, quæ præcedentis.

ПРАЕР. Pulv. aromat.

### PLUMBUM. Свинець.

PLUMBUM NATIVUM LINN. CL. II. Mineræ, Metalla. Est metallum ex albo cærulescens, ductile, molle, via sicca, facile oxygenium adtrahens, et acido acetico nuptum subdulci sapore præditum. *Odoris et Saporis*, metallici peculiaris.

V. Adstringens, siccaus.

Us. Ad varia præparata, videsis: *oxydum Plumbi album*.

### POLYGALA AMARA.

Изподъ горькій. Radix, folia.

CL. Diadelph. O. Octandr. O. N. Lomentaceæ. Subperennis, in nemorosis montibus.

QUAL. Radicis: subdulcis, subamara, foliorum: *Sapor* amarulentus.

V. Radicis et foliorum: leniter stimulan-  
s, roborans, stomacho apta, expecto-  
rans.

Us. Radicis: morbi pulmonum atonici;  
phthisis pituitosa, in connubio in primis  
Lichenis Islandici; pertussis etc.

Dos. Radicis pulveratæ, semidrachma  
bis terve; decocturæ radicis uncia ad ses-  
quilibram aquæ de die, per duas uncias  
ter quaterve sumendæ.

ПРАЕР. *Decoctura radicis.*

## POLYPODIUM FILIX MAS.

Солошковый папоротникъ.

CL. Cryptogam. O. Filices. Perenne in  
nova Russia trans Borysthenem, et alibi,  
spontanea.

QUAL. *Inodorum; Sapor initio dulcis, de-  
in nauseose-amarus, stypticus.*

V. Anthelminthica.

Us. Tænia lata et cucurbitina, lumbrici,  
præcipue in aliorum connubio.

Dos. Pulveris grana triginta ad drach-  
mam infantibus; drachmæ duæ, tres, adul-  
tis.

## PRUNUS DOMESTICA.

Fructus, pulpa.

CL. Icosandr. O. Monogyn. O. N. Pomaceæ.

Arborea in australibus Rutheniæ Europææ et Asiaticæ regionibus, crescens.

QUAL. *Sapor* dulcacidulus, a principio mucilaginoso et saccharino repetendus.

V. Frigerans, alvum ducens.

Us. Febres inflammatoriæ, hepatemphraxis, alvus adstricta.

Dos. A tribus unciiis ad selibram decocti fructus cum foliis Cassiæ Sennæ, Supertartrate Potassæ, vel Rheo palmato, addito aromate et id genus aliis remedium adminiculis. Pulpa a duabus unciiis ad tres commodè præscribitur in electuariis, additis præsertim aliis, si vires remedium intendere placet.

Addito huic, acido tartarico crystallisato, obtinetur massa pulpæ fructus Amlicæ Indicæ (Tamarindorum) analoga, quæ utpote parabilis commodè, et ubique, merito præfertur illi majoris dispendii, et adulterationi subjectæ, præsertim ubi præscribi eandem oportuerit militaribus præ-

fectis. Pro succedanea quoque fructuum pulpæ Cassiæ Fistulæ habetur, ut proinde unius indigeni remedii usu, dispendium duorum exoticorum tuto vitari queat.

## QUASSIA AMARA.

*Quassia excelsa*. Квассия. Lignum.

Arbor, Cayennæ, Surinamiæ, Jamaicæ, Carybearum insularum etc. incola.

CL. Decandr. O. Monogynia. O. N. Grinales.

QUAL. Fere *inodora*; Saporis intense et pure amari, corticis ligni, amarioris.

V. Tonica, quin irritet, adstringat, nauseam moveat, alvumque ducat, hinc ob certos præstitutos fines, ceteris amaris subinde præferendum remedium. Præterea anthelminthica quoque et antiseptica eidem facultas merito adscribitur.

Us. Debilitas stomachi, dyspepsia, febres intermittentes, diarrhoea, dysenteria, arthritis retrograda, colica arthritica, sudores phthisicorum foetulenti, hyperæsthesia, helminthiasis. Idque, aut decocti (melius infusi) cum vino, vel aqua, triturando, vel extracti forma, adhibetur.

Dos. Pulveris, grana decem; rarius tamen in hac forma. Drachma ad semunciam in libra, vel aquae, vel vini infusa cochleatim propinatur.—Extractum, forma misturæ, pilularum, a quindecim granis, ad scrupulum, recte datur.

PRÆP. *Infus. ligni.*

### QUERCUS CERRIS.

Excrescentia a punctura insecti lepidopteri, (Cynips quercus dicti) cujus nidum constituunt gallæ (Gallæ turcicæ) vulgo dictæ. Чернильные орѣшки.

CL. Monoec. O. Polyandr. O. N. Amentaceæ. Arbor in Russia australi perfrequens.

QUAL. Eximia styptica, a tanino principio, et acido gallico repetenda.

V. Adstringens, roborans.

Us. *Externe*: utiliter adhiberi possunt, maxime in infuso aquoso, tam ipsæ per se, quam cum aliis commistæ adstringentibus præsertim in blennorrhoea, varice ani, prolapsu, forma unguenti: in hæmorrhoidibus mucosis; gargarismi: etiam apta est.

Conficiendo quoque atramento idoneæ. In usum medicum seligendæ sunt exiguæ molis, ponderosæ, compactæ, aculeatæ.

PRAEP. *Decoctura gallarum ad clyst. adstring. c. Opio.*

## QUERCUS ROBUR.

*Quercus.* Дубъ. Fructus seu glandes, cortex, folia, cupola glandis.

CL. et O. præcedentis. Arbor Russiæ australis incola.

QUAL. *Odor* fere nullus; *Sapor* stypticus, acerbitate permistus.

V. Adstringens, roborans, alvum comprimens.

Us. In pulverem difficulter tenuatur, ac proinde hac in forma interne vix dari potest commode per se. Decocto aquoso, debilitas, intermittentes febres, blennorrhoea, diarrhoea, hæmorrhoides mucosæ curantur. *Externe*: foliorum, corticis, cupolæque glandis ex vino rubro, vel aqua decoctorum, forma gargarizationis, fomenti, injectionis, utilitas, in relaxatione uvulæ, prolapsu recti, vaginæ, cynanche atonica, gangræna, (saturæ decoctionis) immo in leucorrhoea, blennorrhoea, hæmorrhoea, emicat. Cortex in pulvere sacculis lineis conditus, vino immersus, atque herniis superdatus, præsertim ægrotorum teneræ-

ætatulæ in remediis pollet. Glandes tostæ, per modum Cinchonæ præscriptæ, adjutabilem præstitisse operam perhibentur.

Dos. Uncia ad libram aquæ, cochleatim sumenda datur. Pulveris cupolæ glandis semidrachma propinatur. Nonnulli torrefactas glandes a semidrachma ad tres drachmas adinstar coffeæ ad colaturam circiter unciarum octo dant. Pro succedaneo Cinchonæ habetur.

PRÆP. *Dec. cortic. Quercus R. aluminosa.*—  
*Pulv. c. Salic. comp. Pulv. c. Quercus et Anthem. n.* —

## RHEUM PALMATUM.

*Rhabarbarum verum.* Ревень. Radix.

CL. Enneandr. O. Trigyn. O. N. Oleraceæ. Planta perennis, septentrionalis Asiæ, passim hortensis.

QUAL. Lutea, a principio mucilaginoso, extractivo tanino et volatili salinoque peculiari (Oxalas Calcis) inprimis derivanda. Eo autem major Oxalatis Calcis, continetur copia, quo antiquior est radix, quæ pulverata, criterium est tutum pro dignoscenda præsentia cujuscunque portio-

nis alcali liberi in omnibus corporibus. — Radicis recentis *Odor* nauseoso - aromaticus; *Sapor* amaro - adstringens.

V. Cathartica, anthelminthica, peptica, roborans.

Us. In acido primarum viarum, inflationibus a debilitato ventriculo, immo, ortis hanc ob causam colicis doloribus; uti etiam hystericis hypochondriacisque convenit.

Minoribus exhibita dosibus, cita alvo laborantibus, prodest. In dysenteria sub finem, subductis videlicet cruditatibus, remittente dolore ex inflammatione utilitatem promittit, commendatur quoque contra aphthas, uti etiam (RIVERIUS) contra lumbricos et vermina. — Plethoricis, febrientibus, obstipatione sæpius laborantibus et profluviis sanguinis congestionibusque obnoxiiis, aliena esse censetur. *Extus* pulvere rad. Rhei p. putidula ulcera, non inepte resperguntur.

Dos. Pulveris a scrupulo ad duos; minori vero in dosi aliis catharticis recte conjungitur. Sæpe aroma quoque utiliter adjicitur.



PRAEP. *Infus. radicis.* — *Pilulae Rhei p.* — *Tinct. Rhei amara.* Dec. *Cinchon. off.* — *Pulv. Rhei p. et Mur. hydr. oxydul.* — *Pulv. supersulph. Alum. et Potass.*

## RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

Кашкара, шабина права, келарскъ, черногривъ, пьяная шрава. *Stipites et herba.*

CL. Decandr. O. Monogyn. O. N. Bicornes.

Fruticosa in nivalibus alpibus jugi Sajansensis ad Jeniseam fluvium, in alpium elatioribus inter Sibiriam, et Dauriam, in alpestribus elatioribus ad lacum Baikal, in Kamtschatka quoque et insula Beringia, tam in elevatis rupestribus, quam depressis muscosis, ad radices montium et stagna. In alpinis pedali minor, in depressioribus sesquipedalis.

QUAL. A principio extractivo amaro, adstringente, narcoticoque derivanda. *Odor siccorum*, ad odorem Rhei paulum incli-nans. *Sapor* austerus cum notabili acritate et amarore, stypticus.

V. Narcotica, sudifica, adstringens; fere instar Ledi.

Us. Infusi: arthrodyniæ arthriticæ, ZAHN, uti et doloribus artuum syphiliticis profuit, quin tamen in Dauria, in usum tracta, virus sufflaminarit. Ischiadi esse impari tollendæ ex singulari casu, adnotavit KOELPINUS; PALLASIUS vero, virum diuturna ischiade laborantem, usu ejusdem esse sanatum refert. An tussim et screatus, ex malo pectus occupante, ut quidam volunt, levet, experiri expediet. Sylviculis Tataris, Sijanensis jugi accolis, adinstar Theæ, quotidiano usu, ut sibi persuadent salutare, venit. Utilitatis quoque ex applicatione *externa*, documenta nonnulla adsunt: in ulceribus crurum, rigiditate articulorum post podagras, in tumoribus canceraticis et scirrhis mammarum (Bützow), contractura, paralyti etc.

Pulvis in Sybiria, sternutamentorum evocandorum ergo, quum catarrho vel cephalalgia laborant, naribus adtrahitur a ruricolis.

Dos. Drachmæ duæ stipitum et foliorum, vel semuncia ad uncias novem vel libram aquæ calidæ, per viginti quatuor horas in vase obturato digesta; hujus in-

fusi mane unciae duæ sumuntur. Curæ providæ est, infusum pro re nata, vel saturatius, vel debilius adornari, aut dosin minuire præbiaque aut si opus intercapedinem sumendi facere, ad avertendas noxas, quæ ex usu ejusdem suboriri queunt.

PRAEP. *Dec. herbae.*

## ROSA CENTIFOLIA.

*Rosa damascena.* Роза. Petala.

In hortis hospitatur.

CL. Icosandr. O. Polygyn. O. N. Senticosæ.

QUAL. *Odor* fragrans. *Sapor* substypticus.

V. Leviter adstringens.

Us. Præcipue cosmeticus; profluvia; decoquuntur quoque cum aliis, atque instar collutorii, vel gargarismi ad vitia oris, fauciumque putredinosa, curanda, nec non ad inflammationem tonsillarum, aut anginam dissipandam, usurpantur.

PRAEP. *Aqua petalorum Rosae destill.*

## SACCHARUM OFFICINARUM.

Succus expressus, per evaporationem depurationemque densatus, et in formam salis concreti redactus, vulgo SACCHARUM ALBUM dictus. Сахаръ.

CL. Triandria O. Digynia. O. N. Gramina.

Gramen perenne, palustre, utriusque Indiae et Ægypti.

QUAL. A proprio mucilaginoso principio repetenda. Sapor salino-dulcis, acceptus.

V. Altrix, parum irritans, antiseptica, demulcens; *extrinsecus*, leviter stimulans, escharotica.

Us. Raucitas, tussis, dysenteria biliosa, scorbutus, stomacace; stomacho imbecillo vix aptum. *Extrinsecus*, pulvis ejusdem oculis inflatus, corneae maculas tollere; naribus vero, sternutamenta provocare fertur. Ulceribus fungosis adpersus, quod supercrevit, exest.

Dos. Vel simpliciter in pulverem tenuatum, vel aliis efficacioribus unitum medicinis datur, nec nisi, ut constituens, aut corrigens, ingreditur formulas.

Mel eidem persæpe, ut succedaneum,

merito subrogatur, præsertim in curatione armigerorum.

PRÆP. *Syrupi omnes.*—*Elaeosacchara.*—*Acidum oxalicum*; *alcohol. dilutum* RUM dictum.—*Acet. camph.* — *Aq. cardiac.* — *Pulv. Nitratis potass. comp. Molasses*; SYRUPUS MOLASSES, est pars succi spissati sacchari officinarum incrystallisabilis. *Cerevisiam* et *Decocturam antiscorbuticam* ingreditur.

SALIX ALBA, AMYGDALINA,  
PENTANDRA. etc.

Венла, Верба.

Ramulorum cortex.

CL. Diœc. O. Diandr. O. N. Amentaceæ.

Arborea, Rutheniæ incola, ubivis crescens.

QUAL. Arbos, omnibus balsamica partibus, et amaro-adstringens.

V. Roborans, adstringens, antiseptica, anthelminthica, febrifuga.

Us. Succedanea functionibus Cinchonæ officinalis; non est tamen adeo, ut illa valens, nec Cinchoninum proprium continet, Quassiæ quoque Simarubæ, merito subroganda; majori tamen exhibita dosi.

Decoctura corticis putredini resistit, acido sulphurico acidulata eadem, luem bovillam, teste CAMPERO, propulsavit.

Dos. Ramulorum cortex externe et interne in pulvere et decoctus exhibetur; utilius tamen si fuerit viridis. Pulveris, scrupulum, drachma. Decocti semuncia, uncia, in sesquilibra aquæ ad libram decoquendo.

PRAEP. *Extractum.* — *Dec. corticis.* — *Pulv. salic. comp.*

## SALVIA OFFICINALIS.

Шалфей. Folia, herba.

CL. Diandr. O. Monogyn. O. N. Verticillatæ. Planta perennis in Ruthenia australi spontanea, in hortis vero sub dio hospitans commode.

QUAL. In volatili oleo et adstringente extractivo residens. *Odoris* fortis fragrantis; *Saporis* subamari, styptici.

V. Leniter stimulans, roborans, menagoga; *extus* admotæ, resolvens.

Us. In variis ventriculi incommodis, ut inflatione, colica flatulenta; in siti febrili per modum infusi theæformis addito succi Citri m. tantillo, ad jucundum aco-

rem. Ill. VAN SWIETEN commendavit illam adversus nocturnos sudores in infuso aqueo vel cum alcohole, quem in finem Æther quoque sulphuricus non inepte adjicitur. Infuso contra metrorrhagias frigide propinato, juvat. Infusum vinosum tumori mammarum ex lacte post ablactionem utile esse SWIETEN testatur. Uti nec leucorrhœæ alienum fertur. Infusum aquosum, forma gargarismi: in cynanche mucosa, relaxatione gingivarum, ulceribus oris, aphthis etc. utile se præstitit.

Dos. Grana quindecim, ad scrupulos duos in pulvere.

PRAEP. *Infusum ad gargarisma aluminos: — variaque alia.*

## SAMBUCUS NIGRA.

Бузина. Flores.

CL. Pentandr. O. Trigynia. O. N. Dumosæ. In Russia australi, spontanea, et Petropoli subsistens.

QUAL. *Odor* teter, fetidus. *Sapor* acris, nauseosus.

V. Florum, sudifica; *extus*, resolvens.

Us. Flores infusi omnium partium usitatissimi, ob resolvendi vim in tussi, re-

pletione pectoris pituitosa, item sputis peripneumonicorum languentibus, proficiunt. Noxas a perfrictione utiliter, perfacile concipiendas, avertunt, sudorem movendo; morbillos, scarlatinam, erysipelas, aliaque exanthemata in eruptione torpescencia, vel retrograda incitant, vel reducunt.

Dos. Drachmæ duæ, semuncia, ad libram aquæ pro infuso.

ПРАЕП. *Infus. Sambuci n. — Gargarisma aluminosum.*

## SAPO OLEOSUS.

*Alicantinus.* Гишпанское мыло.

Ex olivo et lixivio, quod ex binis sodæ, una calcis parte conficitur, coquendo spissatus sapo, in primis Marsiliæ confectus. Sit albicans, durus, levis, digitos non inquinans pinguedine, neque ingrato et rancido odore, corruptam adhibitæ pinguedinis indolem, prodens. Variegatus est rejiciendus, nec unquam internis usibus inserviat, quippe non exiguam auripigmenti quantitatem admistam habens. — Alicantinus veneto præfertur.

*Interne* in pilulis datur, fereque semper



cum aliis remediis, præsertim aromaticis aut tonicis, ut sunt amara extracta, gummi-resina F. Ammon. etc. conjungitur.

Dos. Pro adulto, est a dimidio scrupulo, ad duos, drachmam, duas. Pro infantibus a duobus granis ad quatuor, ad decem usque, pro ratione ætatis, idque vel in aqua, vel in lacte solutus. Solutum quoque adhiberi expedit, ubi noxii effectus reparandi sunt, quos acida mineralia, murias hydrargyri oxydatus, aliaque hujus indolis venena, produxerint.

Connubium ejusdem cum acidis vetatur.

Ad usus *externos*, modo in aqua simplici solutus, vel lacte, modo in aliis liquoribus, et utroque modo, inservit clysteribus, balneis, ablutionibus, fomentis, etc.

PRAEP. *Pilulae Allii sativi — Aliaeque.*

## S A P O P I C E U S.

Vel *niger*, qui est semper mollis.

PRAEP. *Cataplasma pus maturans.*

## SAPO SEBACEUS.

*Sapo domesticus; Sapo Wologdensis.*

Вологодское мыло.

Est massa, coquendo sebum cum solutione Sodæ vel Potassæ parabilis.

Usui *externo* solummodo inservit, quum ab opificibus non satis purus paretur, idque per modum lotionum, fots, suppositorii adhibetur. In sorditie ulcerum, tumoribus frigidis induratis, scabie crustosa, etc.

ПРАЕР. *Clyst. comm. — Empl. oxyd. Plumb. semivitr. comp. — Sapo tereb. — Solut. sapon.*

## SAPONARIA OFFICINALIS.

Мыльная трава. Radix (fibrosa, extus rubens, flavescens intus, saporis dulcescentis, cum quadam dein amaritate, et leviculo acremento; a radice *Lychnis dioicæ*, ramosa, fibrata, alba, lignosa intus, inodora, saporis subamari, quæ a rhizotomis præpostero consilio, *Saponariæ* loco legitur; uti etiam a *Cucubali Behen*, et *Saponariæ albæ* radicibus, probe distinguenda). Folia.

CL. Decandria, O. Digynia.

Perennis, in australi Russia perfrequens.

QUAL. Recentis radicis: contrita spumescit, saponaceamque indolem præ se fert.

V. Saponacea: diuretica? Vix ut quibusdam placet resolvens.

Us. In morbis cutaneis, syphilide (præsertim in aliorum consociatione) in articularibus (laudante impensius BERGIO) uti etiam in splanchemphraxibus, morboque Regio, BOERHAAVII præconia olim tulit. Ventriculum, diutius in usum tracta, debilitat, HORN.

Dos. Radix decocta, sæpius non nisi interne præscribitur. Radix recens a semuncia, ad duas uncias; sicca vero a drachma ad semunciam, addito grati saporis ergo, Glycyrrhizæ glabræ tantillo.

Pro succedanea Smilacis Sassaaparillæ /r' habetur.

PRAEP. *Species Guajaci compositae:*

## SCILLA MARITIMA.

Морской лукъ. Radix (bulbus prægrandis, ponderosus epidermide ex fusco rubescente tunicatus. Squamæ recentes albidæ succo peracri mucilagineo turgent; calore vero leni siccatae, peramaro sapore sunt præditæ).

CL. Hexandr. O. Monogyn. O. N. Liliaceæ.

Perennis Rutheniæ australis, ad littora marium arenosa perfrequens.

QUAL. Eximia; ab acri volatili principio derivanda, Sapor amarulentus, nauseam movens, acer.

V. Stimulans, resolvens, pituitam, lotium movens, alvum ducens, vomitiones provocans. Scilicet in majori dosi vomitum, in minori alvum, in minima lotium movet. *Externe* radix recens, rubefaciens, vesicans.

Us. Morbi pulmonum asthenici, asthma pituitosum, tussis, hydropisis, præsertim in connubio muriatis hydrargyri oxydulati.

Dos. Radicis recentis, grana quinque, decem scrupulum; siccatae, grana duo, sex, in forma pilularum aptissime, in in-

fuso drachmæ duæ ad libram vini, a maximis dosibus cavendum, quibus suboriuntur erosiones aqualiculi, stranguria, mictus cruentus, etc.

Vinum scillites quod ad Hautesierckium refertur habet.

R. Radicis scillæ maritimæ recentis sem-  
unciam.

Corticis fructus Citri aurantii.

Rad. A. Calami utriusque drachmam.

Vini albi libram. digere per triduum  
et colatis adde:

Oxymellis scillini unciam.

Idque cochlearii mensura sorbendum.

## SECALE CEREALE.

Рожь.

Seminum farina.

CL. Triandr. O. Digyn. O. N. Gramina.

Annua planta in Rutheno Imperio cultura ubivis communis.

V. Nutriens. — Fermenti, leniter stimulans, antiseptica.

Us. Farina et fermentum, pro synapsimis, cataplasmatibus, epispasticisque recte adhibentur.

PRÆP. Farina, fermentum, alcohol dilutum. —  
*Ad varia adhibetur farina cataplasmata.*

## SERUM LACTIS VACCINUM.

СЫБОРОШКА.

In curatione armigerorum prout apud vendentes prostat adhibeatur. Solum, a se libra ad tres libras præscribitur, interdum ut excipiens, vel ut constituens, in quarundem potionum, aliorumque remedium præparatione. Interdum adduntur illi Sisymbrium Nasturtium, Leontodon Taraxacum, Cichorium Intybus, aliæque plantæ, et si temporis ratio favet, succus quoque ex hisce plantis expressus apte additur loco ebullitionis cum istis herbis faciendæ. Juvat quoque, ne in ventriculo acesceret, aut ad corrigendum, si quem suscepit acorem, adjungi quidpiam Magnesiæ, idem cum lacte faciendum, cui additio Magnesiæ imbecillo in primis stomacho, apta.

## SESAMUM ORIENTALE.

Кунджушъ.

Oleum seminum expressum.

CL. Didyn. O. Angiospermia.

Annua Chinæ et Japoniæ.

QUAL. Oleosa.

V. Emolliens.

Us. Oleum in culina commodum et in lucernis usitatum. Datur quoque a quibusdam in pruritu, doloribus, marasmo, phlegmone.

PRÆP. *Oleum expressum.*

## SISYMBRIUM NASTURTIUM.

*Nasturtium aquaticum.* Жеруха. Рыжуха.

Herba recens, succus expressus.

CL. Tetradyn. O. Siliq. O. N. Siliquosæ.

Planta biennis ad rivos et fontes spontanea.

QUAL. A principio acri derivanda. *Saporem* habet acrem, subamarum, trita, pungentem spargit *Odorem*.

V. Diuretica, antiscorbutica.

Us. Scorbutus.

Dos. Succī, uncīæ duæ.

PRÆP. SUCCUS, qui *Succum Cochleariae* off. comp. ingreditur.

## SOLANUM DULCAMARA.

Паслюнь сладко-горькій. *Stipites* repentes. *Ramuli* biennes vel triennes, cortice tecti ex cinereo subfusco, saporeque ex dulci amaro præditi, a stipitibus Solani nigri, quibus interdum admiscentur, distinguendi.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Solanaceæ.

Frutex scandens, in sylvaticis paludosis Rutheniæ frequens.

QUAL. Recentis: *Sapor* teter, amaro-dulcis. *Odor*, virosus.

V. Stimulans, sudifica, diuretica, præsertim cathartica.

Us. Rheumatalgia, febres rheumaticæ, morbi cutis, ut psora, tinea, herpes etc. Scrofula, syphilis, flavedo.

Dos. Stipitum recentium contusorum semuncia, uncia, ad libras tres aquæ, decoctorum ad libras duas. Sumatur libra quotidie, cum vel sine lacte, vel uncia eorundem libra bullientis aquæ superfundatur, addito pro re nata, volatili congruo stimulo. Extractum quoque Dulcamaræ, in aromatica quadam aqua solutum utilitatem promittit. Majores doses quum perfacile vomitiones provocent, aliasque inferant noxas, caute præscribantur.

PRÆP. *Spec. Guajac. comp.*



## SPONGIA OFFICINALIS.

*Spongia marina*. Губка грецкая. Nidus mollis.

CL. Vermes. O. Zoophyta. In mari mediterraneo, rubroque reperitur, scopulis adhærens.

Est habitaculum vermis zoophyti, vel polypi cellulosum, album, vel coloris citrini, pluribus pervium foraminibus, exiguis, leve, elasticum; *Odoris* minus grati, proprii; *saporis* expers.

V. Humidum absorbens; puris absorptionem impediens.

Us. *Externus* pro ulceribus deligandis et abscessibus.

ПРАЕП. *Spongia usta*. — *Eadem* cerata, cujus si necessitas inciderit, tunc parari cito potest, cera flava liquefacta.

## STALAGMITIS CAMBOGIOIDES.

*Gummi Guttae*. Succus gummi-resinosus ramulorum incisione, vel cortice arboris vulnerato, exsudans, inspissatus.

Желтая камедь.

CL. Poly. O. Mon. O. N. Tricoccæ. Arbor Indiæ incola.

QUAL. Lutea, opaca, in principio gummi-resinoso residens, fere insipida, inodora.

V. Drastico-cathartica; subemetica; diuretica.

Us. Vermes; præsertim vero tænia solium, addito Muriate hydrargyri oxydulato, emeseos avertendæ causa, vel æqua portione cum Subcarbonate potassæ conjuncta, ad quindecim grana secunda quaque hora propinatur ter, donec vermes exierint. Hydropisis, in connubio pulveris C. Jalapæ, Supertartratis potassæ, vel utriusque, vel alterutrius, actionis intendendæ causa; obstipatio.

Do s. Grana tria, quatuor, pulveris cum saccharo contriti tertia quaque hora in hydropse. In tænia grana decem, scrupulum. In obstipatione granum, sesquigranum, grana duo. In forma liquida a granis tribus ad decem.

Antidotum ejus est alcali.

PRAEP. *Pil. Aloës et Stalagm. Cambog.* — *Pulv. Supertartr. Potassae et Stalagm. Cambog.*

## SUBBORAS SODÆ.

*Borax officinalis.* Бѣла.

Borax promercialis ex sale in Perside, Thibet, India orientali, Sinaque obvio, a Batavis et Sinensibus peculiari processu paratur.

V. Alcalescens, absorbens, resolvens.

Us. In morbis ab acido primarum viarum, hinc adversus aphthas in primis est utilis. Semidrachma Subboratis sodæ in uncia destillatæ aquæ soluta, et has extrinsecus admota propulsat, et tuberculis hæmorrhoidalibus medetur. Collyrium quoque ex eodem adversus varia oculorum valetudinis genera, idoneum esse perhibetur. Maculis corneæ, a THEDENO, RICHTERO, ARNEMANNO, opponitur; non minus, leviori visus obscurationi, et cataractæ recenti, utilis esse existimatur.— Hunc in finem semidrachma Subboratis sodæ cum drachma sacchari in aquæ destillatæ uncia, solvitur.

## S U C C I N U M.

*Electrum.* Янтарь.

Substantia bituminosa, flava, et alba, ad littora Baltici maris lecta, densa et fragilis, tantaque duritiei, ut tornari, cædi, poliriquese se sinat. Prunis injecta spargit acceptum odorem. Fractura splendens, insipidum; dum fricatur, corpora levia attrahit, fitque electricum. In tenui solutione Subcarbonatis potassæ, frigore solubilis; in aqua insolubilis; alcohol vero dilutum exiguam duntaxat portionem resinæ extrahit. In æthereis et pinguibus oleis non solvitur, nisi pro parte in carbonem mutatur.

Pro suffitibus adhibetur. Videsis: *Pulverem pro suffimine*, et ad conficiendam *Resinam succini balsamicam*, *Moscho succedaneam* etc.

## S U L P H A S B A R Y T A E.

Тяжелый шпашъ

*Terra ponderosa, vitriolata* BERGMANNI.*Spathum ponderosum.*

Sal hicce, forma lapidea in variis Europæ regionibus occurrit.

Us. Præparata. Ut *Mur. barytae*.

## S U L P H A S C U P R I.

*Vitriolum coeruleum.* Синій купоросъ.

L. C L. II. Mineræ, salia.

Centenarius constat ex Cupri 24. Oxygenii 8. Aquæ, 10. Acidi sulphurici 33. Aquæ crystallisationis 25 partibus.

V. Corrosiva, adstringens.

Us. Præparata. Ut *Subsulphas cupri et ammoniac.*

## S U L P H A S F E R R I.

*Ferrum sulphuricum crystallisatum* Ph. B.

*Vitriolum martis* Ph. Ross. Зеленой или сапужной купоросъ.

R. Limaturæ Ferri pur. selibram.

Acidi sulphurici uncias octo.

Aquæ bilibram cum semisse. Misce et ubi effervescentia cessarit, aliquamdiu super calidam digere arenam, deinde liquorem per chartam effusum cola, atque post idoneam exhalationem, ut crystalli fermentur, sepone.

V. Styptica, roborans, anthelminthica.

Us. Morbi asthenici, vermes, BOERHAAV: — RUSH, Britannus, tantum huic medicinæ tribuit, ut tæniæ solium pro-

fligandæ parem esse, usu cognovisse, fateatur.

Adversus phthisin pituitosam quoque laudatur; sed aptius in formula, quæ ad GRIFFITHIUM refertur convenit, haud secus ac in diabete.

PRÆP. *Acid. acetic.* — *Carbon. ferri præcip.* — *Pulv. Sulph. ferri et Kino.*

### SULPHAS MAGNESIÆ.

*Magnesia Sulphurica* Ph. B. *Sal anglicus*; *Sal amarum* ph. Ross. Сибирская горькая соль.

Est sal medium terrestre, e pura Magnesia et Sulphurico acido constans. Elicitur e fonte Ebshamensi, vel ex ultimo salis marini lixivio; crystallis gaudet teneris, acicularibus. In confinibus Irkutsk copiosus, venalis prostat; *Sapor* ejus subamarus.

V. Solvens, cathartica, diuretica.

Us. Obstipatio, saburra primarum viarum etc. item ad parandam Magnesiam.

Dos. Semuncia, uncia, raro sescuncia, simplici aqua, aut alio vehiculo pro rei indole congruo, ut in liquore Cucumerum salito (орпечный россоль) datur. Abstinentum ab eo in gastritide, enteritide, dysenteria etc.

PRAEP. *Aq. marin. artefacta.* — *Carbon. magnes.* — *Clyst. cathart.*

### SULPHUR. Сѣра.

Comburendo, oxygenio nuptum, acidum sistit sulphuricum. In Islandia, Germania, Italia, Hispania, Russia (circa Samaram ad Wolgam) et aliis oris nativum. Flavum, in cylindros fusum, quod vulgo citrinum audit, recipiendum est, aut in flores sublimatum. Est autem solidum, friabile, le- ni igne liquescens colore rubro, ardens flamma coerulea vapore forti suffocante.

*Odor*, nisi fricetur, vix aliquis, si accendatur acidus, penetrantissimus. *Sapor* quoque, si purum est, nullus.

Us. Videsis: Sulphur sublimatum.

Dos. Grana quinque ad triginta et drachmam, *Extus*: unguenta.

SULPHURETUM STIBII NIGRUM  
PRÆPARATUM.

*Stibium præparatum* ph. Dublin. *Antimonium crudum*. *Stibium Sulphuratum nigrum*. *Stibium striatum*. Сюръма.

LINN. CL. II. O. Mineræ, Metalla.

Est minera metallica ex Sulphure et Regulo constans, per eliquationem in clausis vasis a matrice purgata, et crystallis acicularibus, nitentibus conspicua. Oportet, ut sit illud longis et splendentibus striis donatum, et sub igne strenuo totum exhalet; illud vero rejiciendum est, quod acubus coloris rubei obscuri instructum adparet, quod simul ac incenditur, Allii odorem emittit, et quo, si cum multa aquæ destillatæ copia ebullitioni subjectum fuerit, aqua, si deinceps filtretur efficitur turbida ope aliquarum guttarum Hydrosulphureti Potassæ, in aqua destillata soluti; quod ostenderet Stibium Arsenico infectum esse. Illud quoque rejiciendum, quod si cum aceto ebulliat, eidem dulcem saporem communicet; id enim indicaret, in eodem Plumbum contineri.



Obtinetur ex Hungaria, reperitur quoque circa urbem Nertschinsk Rutheniæ.

QUAL. *Odor*, et *Sapor* nullus.

V. Sudifica, diuretica, expectorans, minori dosi; majori vero, vomitum ciet, vel alvum ducit.

Us. *Interne* exhibetur in morbis cutaneis, ut in psora etc. in rachitide, rheumatalgia, catarrhis, deposita arthritica materia, tumoribus, et glandularum obstructionibus, scrofulis.

Dos. In pulvere, vel per modum boli datur.

Initium fit tuto a decem granis ad scrupulum, gradatim ad semidrachmam ascendendo.

Magna cura cavendum ab acidis, ne colici dolores, diarrhœa, vomitus, suboriantur; ideo recte eidem adduntur absorbentia. — Connubium cum salibus non convenit.

PRAEP. *Oxyl. Stib. hydrosulphurat. praecipit.* — *Oxyl. Stib. c. Subphosph. calcis.*

S U P E R S U L P H A S  
A L U M I N Æ E T P O T A S S Æ.

*Alumen.* Квасцы. L. CL. II. Mineræ, salia.

Est sal medium terrestre ex Alumina, pauxillo Potassæ et Acido sulphurico constans; postremo tamen præponderante.

In commercio prostat; crystalli ejusdem octaëdræ, pellucidæ, sunt saporis dulcescentis et adstringentis, multam crystallisationis aquam continentes. In gubernio Tamboviensi conficitur.

V. Acido-adstringens, styptica, roborans, antiseptica.

Us. *Internus*: hæmorrhagiæ atonicæ; præsertim vero metrorrhagia; colica pituitosa, spastica, plumbea, GRASHUISZ; diarrhœa, dysenteria? diabetes, leucorrhœa, febres intermittentes, putridæ, VOGEL; variolæ, WENDT. *Externe*: forma injectionis gargarizationis, collutorii, collyrii: ophthalmia membranacea, cynanche atonica, mucosa, relaxatio uvulæ, gingivarum laxitas, prolapsus ani et vaginæ uteri, incipiens spina ventosa, HAHNEMAN. *Inseruit ad parandum Supersulphatam aluminae fustum, et Serum lactis aluminosum.*

Dos. A grano, gradatim ad scrupulum sæpius de die.

ПРАЕП. *Pulv. Supersulph. Alum. et Potass.* — *Supersulph. Alum. fus.* — *Cat. aluminos.* — *Fom. aluminos.* — *Garg. aluminos.* — *Clyst. adstring. c. Opio.* — *Collyr. Supersulph. Alum. et Potass.* — *Dec. Querc. R. aluminos.* — *Pulv. Sulph. Ferri et Kino.* — *Serum lact. aluminos* — *Sol. Sulphat. Zinci aluminos.*

### SUPERTARTRAS POTASSÆ.

*Cremor tartari.* ВИННОЙ КАМЕНЬ.

Hic sal in promercio est.

V. Frigerans, diuretica, cathartica, et ut quibusdam placet, resolvens.

Us. Febres inflammatoriæ, gastricæ; hæmorrhoides (in connubio Sulphuris sublimati et Nitratis potassæ) hydropsis, HOME, FERRIAR. Præsertim cum Digitali purpurea, vel gummi-resina Stalagmitidis Cambogioidis, MEDICUS, vel cum oportunis aliis, ut Anomo Zingibere, MONRO; colica plumbea, idem; obstipatio. *Externe:* forma pulveris pro dentifricio, in primis in connubio Cinchonæ off. Magnesicæ; vel in morbis oculorum, aliis congruis junctus, et inflatus.

**Dos.** Ubi purgatione alvum sollicitare expedit, a duabus drachmis ad sescunciam datur, passim in aqua simplici, vel sero, si ad aliud refertur, praescribi solet a semidrachma ad integram, secunda; vel tertia quaque hora in convenienti vehiculo, repetendus. Additur interdum apte cathartici, resinosi, juvat quoque eundem, vel cum saccharo, vel cum melle mistum praebere, quo, praeter alia comoda, sumentibus redditur gratior.

Præparatio ejusdem in cupreis adulterata vasis, proditur partibus cupreis, addito Carbonate ammoniac liquido, vel ipsa ammonia, innotescentibus, ortaue hinc; post saturationem, tinctura cœrulea.

Supertartratis Potassæ 100 partes ex 33 Potassæ et 67 Acidi tartarici constant;  $1\frac{6}{100}$  ejusdem partes solvuntur in 100 partibus aquæ ad thermom: REAUMUR:  $12\frac{1}{2}^{\circ}$ , et  $3\frac{3}{10}$  ad  $80^{\circ}$  ejusdem thermometri; si vero sexta vel septima Subboratis sodæ portio adjicitur, tum solubilior fit, et a drachma ad tres, cathartico-diuretica virtute conspicuus, a QUARINO hepatemphracticae ascitidi oppositus fuit cum successu; in hydropisi autem, a semuncia ad duas

uncias, in tredecim aquæ partibus solutus, alterno quoque mane, exhibitus, efficacissimum se præstitit.

P R A E P. *Acid. tartaric.* — *Inf. fol. C. Sen-  
nae.* — *Pot. acid. veget.* — *Pulv. C. Jalap. et Su-  
pertart. potassae.* — *Pulv. Guajaci et Tart. stib.  
et potassae.* — *Pulv. Supertart. potassae et Di-  
git. purpureae* — *Pulv. Supertart. potass. et Sta-  
lag. Cambog.* — *Subcarbonas potassae* — *Tar-  
tras Stib. et Potass.*

## SINAPIS NIGRA.

Горчица. Farina seminum.

CL. Tetradyne. O. Siliquosa O. N. Sili-  
quosæ.

Annua, in australi Russia, fera; copioseque colitur in hortis.

QUAL. In acri principio, oleoque insipido sita.

V. Stimulans, rubefaciens, peptica, majori dosi emetica; minori vero diuretica.

Us. Suetissimum eduliorum; in primis vero carnum pisciumque ad intinctus condimentum, acredine sua nares, ori inditum titillans, lacrymasque exciens, morbis asthenicis idoneum, hinc concoctio-

nem ciborum juvat, menti hilaritatem conciliat, variis morbis a debilitate oriundis proficuum, ut scorbuto semen tritum, cum vino albo mistum subvenisse, hydropisi, asthmati pituitoso, febribus intermittentibus, paralysi profuisse magnæ existimationis clinici, testantur. *Externe*: rheumatalgia, herpes etc. præcipue sub epispastici cataplasmatibus, lotionisque forma propulsatur.

Dos. Seminum integrorum drachmæ duæ ad semunciam subinde in pulvere; sæpius tamen in infusione, in aqua, vel sero præscribitur, idque a semuncia ad unciam.

PRAEP. *Serum sinapium.* — *Farina pro Sinapismis.* — *Cerevisia antiscorbutica.* — *Infusum seminum.* — *Gargarisma commune cum Sinapi.*

## THYMUS SERPILLUM.

*Serpillum.* Тиміянъ ползучій. Богородская трава. Herba.

CL. Didyn. O. Gymnosp. O. N. Verticillatæ.

Suffrutex in aridis campestribus locis perfrequens.

QUAL. A volatili repetenda oleo. Sapor

subamarus, aromaticus substypticus; *Odor* fragrans, aromaticus.

V. Stimulans, nervina, stomachica, resolvens.

Us. Ope ejus infusi, a crapula nepotina, cephalæam tolli, LINNEUS contendit. *Extus* subinde discutiendi, et roborandi causa in usum trahitur, et ad balnea uterina.

ПРАЕР. *Spec. aromaticae.*

## TORMENTILLA ERECTA.

Завязной корень. Radix.

CL. Icosandr. O. Pentagyn. O. N. Senticosæ.

Planta perennis in tota Russia, in sylvis, et pascuis sterilibus obvia.

QUAL. Eximia; styptica: *Odoris* expers; *Saporis* styptici, subaromatici.

V. Roborans, adstringens.

Us. Menorrhœa, diarrhœa, dysenteria;?

*Extrinsecus* in uvulæ relaxatione, dentibus cum cruentatione vacillantibus, et in prolapsibus varii generis, locum habere potest. Præterea ad conficiendam gummi-resinam Kino artificialem, ejusdem extractum est maxime idoneum.

TRIFOLIUM MELILOTUS OF-  
FICINALIS.

Донникъ или Бурчунъ. Flores, herba.

CL. Diadelph. O. Decandr. O. N. Papilionaceæ. Planta annua, vel biennis in Ruthenia australi spontanea.

QUAL. A volatili oleo pendens. *Odor* gravis, fragrans; *Sapor* mucilaginosus, acris, subamarus.

V. Resolvens.

ПРАЕР. *Emplastrum nominis ejusdem.*

T R I T I C U M  
Æ S T I V U M ET H Y B E R N U M.

Яровая и озимая пшеница.

Semina, farina triticea, amyllum, fures.

CL. Triandr. O. Digyn. O. N. Gramina.

Annua planta in Russia colitur.

QUAL. Farinacea, mucilaginosâ, insipida.

V. Nutriens, emolliens; panis azymi: alvum adstringens.

Us. Farinæ, præter diæteticum siccatae probe, discutiendis tumoribus œdematosis, et erysipelatosi; in cataplasma vero coctæ, ad molliendum, ciendamque sup-



purationem, haud ineptus. — Domesticum quoque est, ad abscessuum maturationem accelerandam, ut in emplastro ex farina cum sufficiente mellis quantitate subacta. Amylum clystere injectum, in diarrhœa, dysenteria, tenesmo, stranguria, fuit proficuum. — Decocti furfures tussi ab acri; extrinsecus vero in balneis opitulantur.

Dos. Amyli, sesquidrachma ad libram aquæ ad selibram cocti, pro clystere.

PRÆP. SEMINA: *Alcohol dilutum*. — FURFURES: *decoctura furfuris*. — AMYLUM: *Clyst. nutriens*. — *Pil. Mur. hydr. oxydati*.

## TUSSILAGO FARFARA.

Подбѣлъ, Бѣлокопышникъ, Мать и мачиха. Radix, herba, flores, folia, succus foliorum.

CL. Syngenes: O. Polygam. superfl. O. N. compositæ discoideæ. Planta perennis, in solo argilloso ad fossas et in campis humidis crescens.

QUAL. Totius plantæ recentis: *Sapor*, mucilaginosus, subamarus, acris et aliquantum aromaticus; *Odor* gravis.

V. Expectorans.

Us. Succī foliorum, verno tempore expressi: in scrofula, CULLEN, FULLER, MEYER. Tussientibus ab omni ævo commendata fuit, potio-remque inter pectorales locum tenuit. Fumum foliorum arundine vel infundibulo exceptum, tussi et orthopnœæ, DIOSCORIDES, GALENUS, PLINIUS, per fumisugam fistulam, suctum, odontalgiae esse adcommo- dum, alii referunt.

PRAEP. *Species Althaeae comp.*

## ULMUS CAMPESTRIS.

Ильмъ, береснъ. Cortex ramulorum interior et arboris junioris.

CL. Pentandr. O. Digyn. O. N. Scabridæ.  
Arborea, in Russia temperata perfrequens.

QUAL. Sapor subamarus, stypticus. Inodorus.

V. Adstringens, roborans, diuretica.

Us. Decocturæ: varii cutis morbi, ut psora, tinea, herpes, lepra; in rheumat- algia, arthrodynia, quidam laudant.

Dos. Uncia, duæ, ad libram, duas, aquæ; coctæ ad libram.

PRAEP. *Decoctura Ulmi campestris.*

## VACCINIUM OXYCOCOS.

*Baccae Oxycocci.* Клюква. *Baccæ recentes, succus expressus.*

CL. Octandr. O. Monogyn. O. N. Bicornes.

Suffrutex in Russia septentrionali crescens.

QUAL. *Sapor* acido - stypticus; *adustarum gelu baccarum acidulo-gratus; Odor* vix ullus.

V. Refrigerans, subadstringens, antiscorbutica, antiseptica.

Us. Roob earum in febrientium usum aqua solutum, pro potu exhiberi potest, et in primis in biliosis, putridis febribus, in ipso scorbuto; his succus quoque idoneus est.

Dos. Succī, uncīæ duæ, cum libra aquæ, addito sacchari tantillo, propinantur.

ПРАЕР. *Succus* — *Roob*.

## VALERIANA OFFICINALIS.

*Valeriana sylvestris.* Мауень, дикий булдырянь, земляный ладань.

Radix, ex trunco brevi, fibrosa, capitulo oblongo, quodammodo truncato, fibris tenuibus subfuscis, tenacibus, hirtis.—

*Gustatu* subamara, acricula; *Odoris* gravis, hircosi, cum radice Valerianæ dioicæ inertī, neutiquam confundenda, uti etiam crassior minus pilosa, magis lignea, fragilis et cinereo-castanei coloris merito rejicienda.

CL. Triandr. O. Monogyn. O. N. Aggregatæ.

Planta perennis, per totum Ruthenorum imperium crescens.

QUAL. Præstans: ab oleo volatili, principioque mucilaginoso salino, repetenda. *Odor* hircinus; *Sapor* subamarus, aromaticus.

V. Narcotica, excitans, antispasmodica, anthelminthica, menagoga.

Us. Pulveris vel infusi: hyperæsthesia, malum hypochondriacum, et hystericum, dolores, spasmi, morbus caducus, chorea S: Viti, hemicrania spasmodica, amaurosis incipiens, helminthiasis.

Dos. Radix interne in pulvere a granis decem ad scrupulum et drachmam usque propinatur.

PRÆP. *Tinctura* — *Infusum* — *Decoctura*.

NB. Ineunte vere, ante productionem caulibus, ex locis siccis elevatisque colligen-

dā, atque radix a squalore liberata, probeque siccata, in vasis vitreis rite clausis, inque loco sicco et frigido, servanda, in pulverem, ubi usus inciderit, rectenter quoad fieri potest, tenuanda.

VERATRUM SABADILLA. RETZII:

Semina cum capsulis, oblongo acuta, nigra, pericarpio membranaceo fusco tecta. Вшивой порошокъ.

CL. Polygam. O. Monœc. O. N. Liliaceæ  
Pl. Mexicana.

QUAL. Venenifera. *Gustatu* amara, acriâ urentia; *Odoris* vix ullus.

V. Drastico-cathartica, anthelminthica, phthiroctona.

Us. Tænia S. LINN. Phthiriasis. *extrinsecus*.

Dos. Infanti bimulo, quadrimo, granum, duo; octenni, grana quinque; duodecenni grana decem cum Syrupi vel mellis quantitate suffîcienti, post quinos dies catharticum interpolando. — Provectioris ætatis hominibus a duodecim granis ad scrupulum extracto quopiam amaro excepta. Decocturæ usus, vix tutus.

Pulverem, ut phthiroctonum extrinsecus, in valetudinariis militaribus adhiberi juvat; cavendum tamen est, ne pulvis aut Piperis, aut Veratri albi eidem male-suada fraude, subrogetur.

PRAEP. *Infusio pro clystere*, videsis: *clysterem aloëticum*.

## VERONICA BECCABUNGA.

Herba recens.

CL. Diandr. O. Monogyn. O. N. Personatae. Planta perennis, ad rivos, et in fossis fluentibus copiosa, in omni Europa.

QUAL. Subamara, inodora.

Us. Succum e V. Beccabunga expressum, contra scorbutum valere M. HOFFMANN adseverat, cujus uncias duas ad quatuor epotari etiam in connubio seri lactis, CHOMEL suadet; nec inepte cum succo Cochleariae off. vel alterius anti-scorbutici efficacioris commiscetur. *Extrinscus*: ulceribus scorbuticis cum successu admovebatur PAULI teste.

PRAEP. *Succus Cochleariae comp.*

## VITIS VINIFERA.

## Виноградъ.

Baccæ recentes, siccataëque, et folia.

CL. Pentandr. O. Monogyn. O. N. Hederaceæ. Fruticosa, in Chersoneso taurica, ad Tanaim, mareque Hircanum, colitur.

QUAL. *Gustatu* dulces, acidulæ, acceptæ baccæ, et pro varietate etiam moschataë. — Folia subadstringentis Saporis.

V. Fructuum: nutriens, sitim sedans, antiseptica, alvum liquans. Foliorum: subadstringens; fructuum siccatorum vulgo PASSULARUM: nutriens, pectoralis.

PRAEP. *Vinum; Acetum vini; Spiritus vini (Gallicus dictus) FRUCTUUM SICCATOR. — Decoct. Althaeae. VINI. — Vin. C. Ipecac. — Vin. Nicot. T. — Vin. Tartr. Stib. et Potassae. — Vin. scillites.*

## ZINCUM. Цинкъ.

Est metallum lamellosum, ex albo cœrulescens, subtenax, malleo parum obediens. Ignitu sub aëris accessu flammam concipiens viridem, abit in album Oxidum, partim sub flocculorum levissimorum

forma avolat. Sinense, illi, quod in officinis metallurgicis Goslariensibus produci-  
tur; præstat puritate. In India, Anglia,  
atque Hercynia potissimum ex Pseudo-  
galena eliquatur.

*Odor et Sapor nullus.*

PRAEP. *Sulphas Zinci. — Oxydum zinci.*

---



P A R S   S E C U N D A.

P R Æ P A R A T A   E T   C O M P O S I T A.



# PRAEPARATA ET COMPOSITA.

---

## ACETAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

*Aqua Ammoniae acetatae. Ph. Lond. Aqua acetitis ammoniae Ph. Edin. Liquor ammonii acetici Ph. Bor. Spiritus Mindereri. Росоль уксу-  
сонашашырный Миндереровъ.*

R. Subcarbonatis Ammoniae triti quantum vis ,  
Adfunde :  
Acidi acetici diluti (vel deficiente hoc) impuri,  
quantum satis ad Ammoniam accurate saturandam.

Quo fortior, et magis in viribus suis fiat uniformis, sequentes parandi ejusdem methodi proponuntur:

R. Subcarbonatis Potassae uncias quatuor  
Acido acetico diluto saturata, et solutio ad uncias triginta sex evaporet, dein admisce:  
Muriatis Ammoniae uncias duas

et destillatio Acetatis Ammoniae liquidi, in retorda vitrea fiat.

Methodus a Pruthenis proposita:

R. Subcarbonatis Ammoniae sicci uncias tres ,  
Acidi acetici libram.

Dein aqua simplici destillata diluatur, ut totius sit unciarum viginti quatuor pondus.

Sic praeparati, quaevis uncia, drachnam Subcarbonatis Ammoniae, continet.

V. Sudifica; ægro tamen calidius cooperto; diuretica vero dum frigori exponitur, agens, quin circulum sanguinis acceleret, caloremque corporis augeat.

Us. Febribus sthenicis et asthenicis, præsertim a perfrictione, vel aliis, ubi sudor quidem movendus; sed stimulus major est alienus, idoneum medicamen. *Extus* testiculis inflammatis induratisque, vaporum forma, aptum.

Dos. A semuncia ad sescunciam per se, aut in connubio auxiliariorum eandem facultatem habentium.

PRÆP. *Collyr. ejusdem.* — *Dec. Cinchonae off.* — *Foment. Sapon. ammon.* — *Haust. acetat. ammon. et stib.* — *Mist. Asae foetid.*

## ACETAS CUPRI.

*Aerugo crystallisata. Aerugo Aeris. Viride Aeris crystallisatum.* Венеціянская ярь.

R. *Limaturae vel laminarum cupri quantum velis, Acidi acetici quantum satis.*

Digere, donec solutum fuerit cuprum; solutionem denique, ut crystalli surgant, seponito.

V. Corrodens, styptica, antizymica.

Us. *Internus* vix ac ne vix quidem commendandus. *Extrinsecus*: in ulceribus fungosis, scorbuticis, venereis (in solutione)

verrucis, aliisque excrescentiis, per modum injectionis, vel lotionis in blennorrhœa asthenica, non spernendus. Ubi optio fit selectionis, massæ, cœruleo-viridis coloris, acris Saporis, quæ nec facile frangantur, nec ad aëris contactum hument, jure præferri merentur.

PRAEP. *Lin. acet. Cupri.* — *Pulv. supersulph. Alum. et Potassae.* — *Solut. acet Cupr. et Mur. ammon.* — *Sol. subacet. Cupr. et ammon.* — *Ung. acetat. Cupr. cryst.* — *Ung. ophthalmic. cuprat.* — *Vapor. acid. acet.*

## A C E T A S

### PLUMBI CRYSTALLISATUS.

*Cerussa acetata. Ph. Lond. Plumbum aceticum Ph. Boruss. Saccharum Saturni Ph. Ros. Свинцовый сахаръ.*

R. Oxydi Plumbi albi quantum velis, cucurbitae indito et affunde:

Acidi acetici impuri fortioris decuplum.

Stet super calidam arenam mistura, donec acidum dulcescat, hoc dein separato, novum toties adfundatur, donec desinat dulcescere, dein defœcatus liquor in vitreo vase ad liquidioris mellis crassitudinem vaporet, et in frigido reponatur loco, ut surgant crystalli in umbra exsic-

candæ, liquor remanens iterum vaporet, ut in novas coëat crystallos, totiesque vaporatio repetenda, donec nullæ amplius crystalli concrecant.

Rarius a pharmacopœis conficitur, sæpius in commercio, leviorique pretio prostat.

Drachma in selibra, vel pro re nata, in libra aquæ destillatæ soluta, recte ad-movetur.

Addetur interdum acidi acetici diluti, vel impuri, drachma vel plus, ut solutio rite sustineatur, præsertim, si in aqua communi facta fuerit.

PRAEP. *Acetas plumbi liquid.* — *Cerat. acetat. plumbi.* — *Acid. aceticum* — *Sol. acetat. plumbi cryst. fortior.* — *Sol. acetat. Zinci.* — *Vapor. Acid. acet.*

NB. Ubi in quibusdam præparatis et compositis, ut heic, nulla virtutis, usus et dosis injecta est mentio; hæc in simplicibus parte prima comprehensis, quærenda.

## ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

*Extractum vel acetum saturni. Ph. R. Уксусъ  
свинцовый.*

R. Acetatis Plumbi crystallisati selibram,  
Aquae destillatae bilibram Commiscendo solve.

Hæc formula, licet majoris dispendii, meretur præferri; tutius enim faciliusque proportio ingredientium determinari potest; ubi tamen parsimoniae ratio habenda, tum oxyda quoque Plumbi non sunt inepta.

V. Ut et præcedentis, sedativa, adstringens, frigerans, exsiccans.

Us. *Externus* tantum, phlegmone, ecchymomati, varici ani dolenti, cnesmo, blennorrhœæ, herpetibus, adustis, ophthalmiæ, idque in connubio, vel aquæ, vel olei extrinsecus admovetur, per modum collyrii, injectionis, lotionis, cataplasmatidis, unguenti, linimenti etc.

PRÆP. *Cerat. acetat. plumbi. — Solut. acetat. plumbi.*

## ACETUM CAMPHORATUM.

## Камфорный уксусъ.

R. Camphorae drachmam,  
 Alcoholis, scrupulum. Tritis sensim admisce:  
 Gummi Mimosae niloticae pulverati,  
 Sacchari albi, utriusque unciam,  
 Acidi acetici diluti vel impuri sesquilibram.

Servetur usui in vitro bene obturando.

Dos. A semuncia ad duas uncias, et amplius, sæpius de die, vitrum fortiter, ante singula præbia, conquassando.

A C E T U M  
 SCILLITES ALCOHOLISATUM.

## Уксусъ морскаго луку.

R. Radicis scillae maritimae siccatae et contusae  
~~drachmas~~ duas *uncias*.  
 Acidi acetici impuri bilibram cum semisse,  
 Alcoholis uncias tres.

Macera Scillam leni calore in vase vitreo cum acido acetico impuro per quadriduum, dein expresso acido, adde alcohol (conservationis causa) et quum subsederint faeces, liquorem effundito.

V. Stimulans, in primis pituitam, et lotium; majori vero dosi, nauseam, et vomitum movens.

Us. Morbi pulmonum asthenici, pituitosi, hydrops. *Externe*: gargarizationis cau-



sa, aqua dilutum in tonsillitide a perfrictione laudatur, imo et in graviore auditu ex eadem causa.

Dos. A drachma ad semunciam, si vomitiones provocare lubet, cum qualibet aromatica aqua.

Oxymel scillinum ad omnia idem, quod Acetum scillites, potest; sed hoc valentius est.

ПРАЕР. *Oxymel et syrupus scillinus.*

### ACIDUM ACETICUM.

*Acidum acetosum forte Ph. Edinb. Acidum acetosum Ph. Lond.* Усиленная уксусная кислота.

R. Sulphatis Ferri exsiccati libram,  
Acetatis Plumbi crystallisati uncias decem.

Contrita et indita retortæ, ex arena, igne modico, destilla, quamdiu acidum prodit, in vase bene clauso, servandum.

V. Admodum stimulans, rubefaciens, antiseptica.

Us. Præcipue in syncope, asphyxia, affectionibus hystericis, cephalæa, per modum odoramenti naribus admovetur; cuti vero adplicatum rubefacit eam; haud secus ac clavos emollit et eradicat.

ПРАЕР. *Acetas cupri.*

## ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

*Acidum acetosum destillatum Ph. Edinb. Acetum destillatum Ph. Dublin. et Borus. Acetum vini destillatum Ph. Ross. Винный дъвоеный уксусъ.*

R. Acidi acetici diluti impuri placidam quantitatem vitreae retortae cum parte pulveratorum carbonum circiter decima committito. atque arenae balneo pars sexta calore gradatim auctiori eliciatur, phlegmate aethereo primum prodente rejecto, quo seorsim servato, labor probatur quo usque clarus nec empyreumaticus liquor prodierit, qui ante empyreumatis notam obtentus, usui servetur.

Us. Pro laboribus pharmaceuticis et chemicis. Phlegma æthereum superstes parando aceto dulcificato *Ph. Ross.* aptum.

ПРАЕП. *Acetas ammon. liquid.*

## A C I D U M

## CITRICUM CONCRETUM.

Succus Citri medicæ 24 horis, ut separetur mucus, reponitur, dein filtretur et Carbonate Calcis saturetur. Citras Calcis qui hinc surget, est insolubilis et præcipitatur. Fluido supernatanti effuso, præcipitatum eousque lavetur tepida aqua, donec nullius aqua saporis fuerit, mas-

saque albescat. — Dein hæc, dimidio ponderis illius Acidi sulphurici sex partibus aquæ diluti, decomponitur vel potius Acidi sulphurici plus adhibeatur, ut mucus perfecte destruat, quem acidum cum Calce conjunctum, retinet, atque crystallisationi obicem ponit. Acidum sulphuricum Calci unitur, et ut Sulphas Calcis, præcipitatur; Acidum vero citricum liberatum, fluida forma comparet. Tum ad crassitudinem syrupi evaporat, et refrigeratum crystallos effingit. Ut prorsus depuretur, iterum solvatur, et in crystallos cogatur, quæ rhomboidalia prismata referunt, quorum latera fere se in 60, ad 120 inclinant; extremitates vero habent quatuor superficies, angulos laterum complectentes.

V. Antiseptica, eximia; vide succum Citri medicæ. Apud Britannos sub nomine: COXWELL'S CONCRETE SALT OF LEMONS, venit.

Dos. Scrupulum, ad duos et amplius. NB. Superoxalas Potassæ, e succo foliorum Oxalis Acetosellæ, in magna quantitate extractus, venditur sub nomine: ESSENTIAL SALT OF LEMONS, perperam di-

cto. Virtutis pene ejusdem, cujus præcedens.

ПРАЕР. *Pulvis carbon. acidulus.*

## A C I D U M MURIATICUM CONCENTRATUM.

Усиленная соляная кислота.

R. Muriatis Sodæ libras duas,  
Acidi Sulphurici uncias sedecim,  
Aquæ libram.

Murias sodæ in olla primum igne rube-  
scat paulum, tum frigefactus retortæ, com-  
mittatur, dein acidum cum aqua per-  
mistum, et refrigeratum sodæ muriati ad-  
fundatur. Tandem ex arena, leniori calo-  
re, quamdiu prodit acidum distillet.

ПРАЕР. *Acid. mur. oxygen. — Lin. acid. —*  
*Mur. calc. oxygen. — Sol. mur. calc. — Mur.*  
*Magnes. — Sol. Mur. hydr. oxydat. corrodat. —*  
*Tinctura Mur. ferri alcohol.*

# A C I D U M M U R I A T I C U M O X Y G E N A T U M.

*Acidum Sâlis dephlogisticatum.* Пресыщеная  
соляная кислота.

R. Oxydi mangesii nigri selibram ,  
Acidi muriatici concentrati libras tres.

Retortam tubulatam balneo arenæ committito, atque cum minore excipulo, idque cum destillatorio adparatu Woulfiano junge, commissuris luto pingui ex Argilla et Oleo Lini usitatissimi cocti, facto, obductis, dein linteis miscela ex Cálce in pulverem dilapsa ovique albumine parata madidis, rite firmatis. Ubi omnia fuerint siccata, Oxydum mangesii per aperturam tubulatæ retortæ imponitur, adjectis eidem acidi muriatici unciis tribus, destillatio leni calore fiat. Quum nil in excipulum stillare observatur, tum tantundem ejusdem acidi adfunditur, et destillatio, ut prius continuatur, eousque, donèc libræ tres acidi hac ratione sensim adfusæ fuerint.

V. Antiseptica, miasmata valetudinariorum, aliaque narcotica venena enervans, tollens.

Us. *Internus*: psora, herpes, lues venerea, scorbutus, et in plerisque morbis, quibus acidum sulphuricum, et nitricum, opem fert. *Externus*: ulcera faucium, cutisque putida, aphthæ, vulnus a cane rabido recenter inflictum.

*Forma vaporis*: celebratissima antidotus, qua adversus contagionis pericula tutum corpus reddi ur, ad corrigendum proinde, aërem effluviis coinquinatum in valetudinariis, navibus, aliisque arctis habitaculis, pestilentia, aut urgente febre americana flava, utilitas ejusdem in primis emicat.

Item ad præparata quædam pharmaceutica adhibetur, ut *Muriatem Potassae oxygenatam*.

## ACIDUM NITRICO-MURIATICUM.

### *Aqua regia.*

R. Acidi nitrico-nitrosi gravitatis specificæ 1,4.  
Acidi muriatici concentrati gravitatis specificæ 1,134, pares portiones. Misce.

Solutiones, liquoresque corrigendo aëri destinatos, ingreditur.

PRAEP. *Vapores Oxymuriatici acidi.*

## ACIDUM NITRICO-NITROSUM.

*Acidum nitrosum* Ph. Edinb. *Acidum nitri concentratum*. *Spiritus nitri fumans*. *Acidum nitricum*. Ph. Ross. Усиленная селипренная кислота.

R. Nitratis Potassae purissimi contusi bilibram,  
Acidi sulphurici uncias sedecim.

Nitrate potassæ immisso vitreæ retortæ acidum affundatur, fiatque ex arena destillatio, calore gradatim auctiori, quoadusque ferrea olla obscure cæperit rubere.

Hujus pondus specificum est ad destillatæ aquæ pondus, ut 1550, ad 1000.

V. et Us. Videsis: Acidum nitrico-nitrosum dilutum.

Dos. Pro ratione dilutionis administranda.

PRÆP. *Acid. nitrico-muriatic.* — *Acid. nitrico-nitros. dilutum.* — *Acidum. nitric.* — *Aether nitric. alcoholis.* — *Ung. nitrat. hydr.* — *Ung. nitricatum mitius.*

A C I D U M  
NITRICO - NITROSUM DILUTUM.

*Aqua fortis. Ph. Ross.* Слабая селитряная  
кислота.

R. Acidi nitrico - nitrosi,  
Aquae destillatae, utriusque pares portiones.

Caute, gradatimque vapores vitando commisce.

V. Antiseptica, caustica, corrodens.

Us. Potiones, acido nitrico acidulatae, febribus sthenicis conveniunt, vi in primis antiphlogistica, conspicuae, in typho, (REICH, HOFFMANN, EBERHARD) non contemnendum praebent eadem antisepticum, uti nec hepatitidi, et in primis indurationi jecinoris, SCOTT, alienae. — Psorae, herpetibus, aliisque cutaneis morbis, opponitur acidum; syphilidi vero, (PEARSON), ubi Hydrargyrum ob debilitatem aegri alienum est, convenit quidem; verum morbo radicitus tollendo impar est. Verrucas et excrescentias alias exest.

Admoto ejusdem vapore, contagiosa putridaque effluvia valetudinariorum etc. (CARMICHAEL SMYTH) delentur.

Dos. A decem ad sexaginta guttas dilutas aquae congrua quantitate, tubuli



vitrei ope, dentium conservandorum ergo sumendas, vel vide *Aquam acidi nitrici*.

## ACIDUM NITRICUM.

R. Acidi nitrico - nitrosi quantum lubet,

Retortæ immittito, atque excipulo adaptato ignem lenissimum subde, donec ruberrima pars transiverit, ac acidum in retorta superstes, nitricum fuerit factum.

Us. Ad varia paranda pharmaca.

ПРАЕП. *Nitras argenti fusus*. — *Nitras hydrarg. liquidus*. — *Oxynitr. Hydr. et Ammon.* — *Ung. nitricat. fort.*

## ACIDUM SULPHURICUM.

*Acidum vitriolicum. Ph. Ross.* Купоросная кислота крѣпкая. Чистая купоросная кислота.

R. Acidi sulphurici impuri, quod in commercio est, quantum placet.

Retortæ vitreæ immittatur, atque igne successive auctiori destilletur eousque, donec non amplius in vaporum forma; sed in striis cohærentibus in recipiens vas defluere cœperit. Tum recipiente mutato continuetur destillatio, ac denique is gradus ignis; caute tamen augeatur, ut reliquum acidi ascendere queat, quod in

vitro sicco aëris accessu probe intercluso ope epistomii vitrei, usui servetur; chemicis præparatis ob summam, qua pollet acrimoniam, idoneum.

#### V. Corrodens.

Quandoque plumbo, damnosissimo aditamento infectum est, ut id cl. MEYER et GÜNTHER, evicerunt, quod detegitur, si conjuncto hoc acido partibus aquæ, vel æqualibus, vel majoribus, album præcipitatum conspiciatur emitti, quo non adparente, indicium est plumbum in sulphurico acido neutiquam contineri. Interdum, illud præcipitatum esse, etiam sulphatem calcis cum portione silicæ terræ aliqua, WITHERING, testatur.

Hujus acidi pondus specificum in calore  $26\frac{1}{9}$  REAUMUR: esse debet ad pondus aquæ destillatæ ut 18,50 ad 10,00.

PRÆP. *Acid. muriat. conc.* — *Acid. nitrico-nitrosus.* — *Acid. sulph. aromat.* — *Acid. tartaric.* — *Aether sulphuricus.* — *Fom. vulnerar.* — *Garg. aluminos.* — *Lin. sulph. terebinthinatum.* — *Mur. hydr. oxydat.* — *Sol. acid. mur. oxygen. vaporifera.* — *Sol. acid. nitric. vaporifera.* — *Sol. alexiter. oxyg.* — *Sulph. potassae.* — *Ung. acid. sulphur.* — *Sulphas ferri* — *Vapor. acidi acetici.*

## A C I D U M SULPHURICUM AROMATICUM.

Loco *Elixir acidi* HALLERI.

R. Acidi sulphurici selibram,  
Alcoholis bilibram.

Alcoholi paulatim acidum instilla, et misturam calore lenissimo in vase clauso per biduum digere; dein adde:

Corticis Lauri Cassiae semunciam,  
Radiciſ A. Zingiberis sescunciam.

Digere iterum in vase clauso per sex dies, et per chartam bibulam, super infundibulum vitreum positam, cola.

V. Roborans, adstringens, antiseptica.

Dos. A decem ad guttas triginta, in aquæ convenienti quantitate.

PRAEP. *Dec. Cinchonae off.*

## A C I D U M SULPHURICUM DILUTUM.

*Spiritus vitrioli tenuis. Spiritus vitrioli. Ph.*

*Ross. Разведенная купоросная кислота.*

R. Acidi sulphurici unciam,  
Aquae destillatae uncias septem.

Cautim commisceto acidum sensim sensimque instillando aquam.

V. Stimulans, frigerans, adstringens, roborans, potenter antiseptica, antizymica, fermentationem inhibens.

Us. Synochus, febres petechiales, hæmorrhagiæ, exanthemata atonica, scorbutus, dyspepsia, psora, herpes alii que cuticulares morbi; imo pestis, scarlatina anginosa, et alii contagiosi morbi; tabes purulenta, ulcera, aphthæ, pyrosis, gastrodynia, etc. idque pro ratione morbi, modo *interne* propinatur, modo *extrinsecus* per modum liquoris, unguenti, gargarismatis etc.

Dos. Guttæ decem, viginti, triginta, in aqua, vel quolibet alio vehiculo congruo.

PRÆP. *Aq. acid. carbon.* — *Aq. acid. sulph. diluti.* — *Dec. antiscorbut.* — *Mist. Cinchon. off.* — *Pot. acid. miner.* — *Sol. sulph. Zinci.* — *Sulph. Zinci.*

## ACIDUM TARTARICUM.

*Sal. essentielle tartari. Acidum tartari crystallisatum. Ph. Ross. Кислота виннокаменная.*

R. Supertartratis potassae libras septem,  
Aq. fervidae libras viginti quatuor. Solutis adde:  
Calcis pulveratae libras duas.

Filtra liquorem, et tartratem calcis in filtro remanentem aqua frigida ablue, eique adde :

Acidi sulphurici (aquæ libris viginti diluti) libras duas.

Digere per viginti quatuor horas sæpius agitando, dein effunde liquorem acidum, calcisque sulphatem residuum aqua ablue, donec insipidus fuerit. Commistos liquores acidos coquito cum carbonum pulvere, dein filtrato, et evapora ad siccitatem, adsiduo movens, tandem leni calore in crystallos redigito, siccandas, usuque servandas.

V. Acida, antiseptica, diuretica, frigerans.

Us. Febres sthenicæ; (in quibus gratissimum præbet antiphlogisticum, temperans, siti restinguendæ aptissimum) biliosæ; scorbutus.

Dos. Semidrachma, drachma, ad bilibram aquæ, pro potu ordinario.

PRAEP. *Dec. antiscorbut.* — *Dec. Malti. H. d. acidula.*

## ADEPS SUIS SCROFÆ PURIFI- CATA.

*Axungia Porci purificata.* Сало свиное очи-  
щенное. Pinguedo abdominalis recens,  
odoris expers.

R. Adipis Suis Scrofae quantum vis.

Membranis, venulis, fibrisque demtis, tam-  
diu calda abluatur aqua, donec nil am-  
plius cruenti effluxerit, demum concisa  
in frustula liquefiat, et coletur per lin-  
teum.

V. Emolliens.

Us. Præcipuus: pro parandis variis un-  
guentis, linimentis, emplastris etc.

Eodem modo purificantur: sebum ovil-  
lum, vel hujus defectu bovillum. In cu-  
ratione militum utrumque ad omnes pe-  
ne usus loco olei expressi Theobromæ  
Cacao concreti, utiliter adcommodatur.

*Cerata, emplastra, unguenta, cataplasma e-  
molliens quoque, et linimentum camphorato-am-  
moniatum ingreditur.*

## Æ T H E R

## NITRICUS ALCOHOLISATUS.

*Spiritus aetheris nitrosi Ph. Edinb. Liquor aetheris nitrosus Ph. Dubl. Spiritus Nitri dulcis.*

Услажденная селищренная кислота.

R. Alcoholis partes tres,  
Acidi nitrico - nitrosi partem.

Alcohol capaci phialæ in vase, frigida repleto aqua, positæ, infundito, atque sensim acidum sub jugi motu adde. Phiala levius obturata in frigidulo per septimanam reponatur loco. Denique liquor, aquæ bullientis calore, in excipulo, nive, vel aqua refrigerato, quamdiu prodibit spiritus, destillet.

V. Diaphoretica, diuretica, antispasmodica; addito Subcarbonatis ammoniæ liquidæ tantillo vis ejusdem medica intenditur.

Dos. Semidrachma ad drachmam.

ПРАЕР. *Vin. rhenanum artefactum.*

## Æ T H E R S U L P H U R I C U S.

*Naphtha vitrioli.* Нефть купоросная.

R. Alcoholis bilibram, adfunde paulatim, et caute in cucurbita:  
Acidi sulphurici tantundem.

Alembico cum excipulo satis capaci adaptato, et juncturis bene clausis destil-

latio ex cinerum balneo remissiori calore instituatur. Simulac liquor stillans acidum sulphuricum re'dolet, ab ulteriori destillatione illico desistendum est. Liquori in cucurbita remanenti adfunde Alcoholis libram. Continuetur, ut antea destillatio, cum simili alcoholis quantitate, pro re nata, bis iteranda. Liquoris ætherei destillationibus his obtenti partibus duodecim adde:

Aquae communis partes tres,  
Potassae liquidæ partem.

Aether supernatans a reliquo separetur fluido, lenissimoque rectificetur calore quamdiu purissimus, et fragrantissimus transit.

V. Excitans, volatilis, anodyna, sudorem et in primis lotium movens, antispasmodica.

Us. *Internus*: spasmodicæ adfectiones, convulsiones, morbus caducus, hyperæsthesia, cardialgia, rheumatalgia, phrenitis hydrocephalica, narcotismus, asthenia, podagra atonica, paralysis, vomitus, singultus, pertussis, typhus, morbi ventriculi et intestinorum ab inflatione, vel spasmodici etc. *Externus*: odontalgia, cephalalgia, et alii dolores rheumatici, ac spas-



modici admoto parti linteo Æthere midenti, magnitudine palmæ manus, quo pars tegitur, illico fortiter premendo, sic, ut evaporatio ejus impediatur, et sic paulisper sustinendo, WARD, et tum effectum stimulantem, et rubefacientem prodat; ubi vero amota palma, evaporationi subitæ locus fit, frigerantem eximium, duos nempe discrepantes inter se effectus; unde calorico subducto herniæ etiam incarceratæ proficius exstitit, externo usu.

Dos. Guttæ quinque, decem, viginti ad drachmam, cum saccharo, vino aut alcohole impuro, aut in haustu misturæ aut aceti camphorati.

PRÆP. *Æth. sulphur. alcoholisatus.*

## E T H E R

## SULPHURICUS ALCOHOLISATUS.

*Spiritus Aetheris vitriolici Ph. Lond. Spiritus sulphurico aethereus Ph. Bor. Spiritus vitrioli dulcis Ph. Ross. Aether sulphuricus cum Alcohole Ph. Edinb. Liquor aetherius oleosus Dublin. Liquor Hofmanni anodyn. Гофманновы капли. Услажденная купоросная кислота.*

R. Aetheris sulphurici,  
Alcoholis, pares portiones. Misce.

hisdem gaudet virtutibus, ut præcedens;  
minus tamen valentibus.

Dos. Semidrachma, ad duas drachmas,  
in vehiculo quolibet congruo.

ПРАЕП. *Aether sulph. alcohol. camphoratus*—  
*Infus. Valerianae off.*—*Pot. aether. sulph. alcohol.*

## ETHER SULPHURICUS ALCOHOLISATO-CAMPHORATUS.

R. Aetheris sulphurici, vel  
..... alcoholisati unciam,  
Camphorae drachmam. Misce fiat solutio.

V. Eximia: stimulans, antispasmodica,  
antiseptica, sudifica.

Us. Febres typhodes, chorea, hysteria, singultus, cardialgia spasmodica, præcipue ex podagra atonica, et asthma ex eadem causa.

Dos. Guttæ duodecim (quæ sesquigranum Camphoræ continent) ad drachmam (grana septem cum semisse continentem) ex saccharo vel Alcohole diluto, aut quovis vehiculo proprio bis terve de die.

*Externe*: Aëre excluso, calefaciens, rubefaciens; admisso autem, abstrahens caloricum; cephalæa, odontalgia, hernia incarcerata.

ALCOHOL quoque, ætheri sulphurico alcoholisato, utpote majoris dispendii, rite substituitur; quod etiam *Dec. Cinchonæ*.—*Embroc. sapon. rubefac. et Lin. album. ovi* ingreditur.

## A L C O H O L.

*Alcohol vini. Spiritus vini rectificatissimus Ph.*  
*Ross. Алкоголь.*

R. Alcoholis diluti quantum velis.

Destillationi iterum subjiciatur, atque tertia exinde solum pars ejus eliciatur.

Us. Ad varia præparata, ut *Alcohol ammoniatum*.

PRAEP. *Acet. camphor.* — *Acet. scillites.* — *Acid. sulph. arom.* — *Aeth. nitric. alcohol.* — *Aeth. sulph.* — *Aeth. sulph. alcoholis.* — *Lin. albuminis ovi.*

## ALCOHOL AMMONIATUM.

*Spiritus ammoniae Ph. Lond. Spiritus alkali volatililis Ph. Dublin. Liqueur ammonii vinctus Ph. Bor. Spiritus salis ammoniaci volatililis vinctus Ph. Ross.* Спиртъ нашатырный летучій  
съ виномъ.

R. Ammoniae liquidae partem,  
Alcoholis partes duas. Misce.

Obturata probe lagena servetur.

V. Excitans, antispasmodica, sudifica, interdum pituitam et lotium movens.

Us. Morbi asthenici, paralysis, lethargus, asthma pituitosum, hysteria, deficiente vis vitæ reactione. Item pro parandis pharmacis variis.

Dos. A decem guttis ad drachmam in quovis vehiculo aquoso, vel vinoso.

PRAEP. Garg. ammoniat. — Tinct. Guajaci ammoniata. — Tinct. Opii ammoniata. — Tinct. Valerianae ammoniata.

## ALCOHOL DILUTUM.

*Spiritus vinosus tenuior Ph. Lond. Spiritus vini tenuior Ph. Dublin. Spiritus frumenti depuratus Ph. Ross.* Спиртъ хлѣбный очищенный.

Alcohol dilutius, sub nomine spiritus vini communis vulgo, ut venale prostat;

bonæ tamen notæ, fermentatione vinosa subsequenteque destillatione, e vino, fæcibus ejusdem, vino pomaceo, aliorumque fructuum, aut e seminibus tritici, secalis, hordei, avenæ sativæ, oryzæ s. aliisque vegetabilibus, vel ex succo Sacchari off. expresso, super carbones recenter ustos obtentum destillando, vel

R. Alcoholis,  
Aquæ destillatæ, utriusque pares portiones.

Misce, et in vitro probe clauso, serva.

Persæpe, loco alcoholis diluti sumitur idem, sed impurum Ruthenice водка, vel hoc deficiente dilutius adhuc, vulgo Чубыxa dictum.

PRAEP. *Alcoh. dilut. amar* — *Alcoh. dilut. antiscorbuticum.* — *Aq. cardiac.* — *Cat. discut.* — *Dec. Cinchonae.* — *Fomenta pleraque.* — *Inf. Gentianae comp.* — *Sol. Mur. hydr. corrodens.* — *Sol. saponis.* — *Tinct. pleraeque.* — *Vin. lusitanic. artefactum.*

## ALCOHOL DILUTUM AMARUM.

R. Extracti amari unciam,  
Alcoholis diluti sesquilibram.

V. Incitans, roborans, imbecillo ventriculo aptum.

Dos. Unciæ duæ, tres bis de die.

Si cuivis hujus Alcoholis dosi, balsamum Pini sylvestris additur, et quidem a guttis decem ad tringinta, et amplius, tum cachectis, scorbuticis, iisque, quibus post febres intermittentes, præpostero consilio, curatas, abdomen tumet, vel hydropysis, et leucophlegmatia infausti ominis sequelæ superveniunt, aptius fit, ut id haud æquivoca docet experientia.

## A L C O H O L

### DILUTUM ANTISCORBUTICUM.

R. Extracti amari,  
 ..... urion. Pini sylv. utriusque semunciam,  
 Alcoholis diluti selibram.

Dos. Ut, et præcedentis; scorbuticis tamen hoc adcommodatius.

### ALCOHOL PURISSIMUM.

*Alcohol vini alcoholisatum Ph. Ross. Spiritus vini rectificatissimus. Alcohol absolutum.*

Алкоголь совершенно безводный.

R. Alcoholis vini quantum velis,  
 sub adsidua succussione, tamdiu siccum,  
 Subcarbonatem potassæ admisce, atque hinc proveniente aqueam salis solutionem separatorii ope sæpius aufer, donec

ultimæ Subcarbonatis potassæ particulæ, nec amplius deliquescent, neque inter se congruescent. Retorta demum Subcarbonate potassæ probe siccato superinpletur, per cribrum trajecto, depurato, cui alcoholis aqua privati, supra memorati, adfunditur tantum, quam illo resorberi perfecte potest. Retorta arenæ balneo committitur, adaptato cum vesica recipiente, et post viginti quatuor horas, lenissimo semper æquali continuato igne destilletur. Simulac guttulæ lentius stillarint, tum destillatum, atque perfecte aqua privatum alcohol recipitur, usui servandum. Lo-  
co Subcarbonatis Potassæ, Murias Calcis siccatus, ad parandum alcohol purissimum, non male adhibetur.

Quod alcohol hac ratione elicited, sit perfectissime aqua privatum indicat specifica ejus gravitas in temperatura graduum  $\pm 15$  REAUMUR, non plus quam  $= 791$  ad 1000 aquæ.

Deficiente Æthere sulphurico alcoholisato, pares portiones Acidi sulphurici diluti, et Alcoholis simul nuptæ, non inepte eidem substituntur, duplici quantitate pro dosi.

## AMMONIA LIQUIDA.

*Aqua ammoniae purae Ph. Lond. Liquor ammonii causticus Ph. Bor. Spiritus salis ammoniaci causticus Ph. Ross.* Спиртъ нашатырно-известный ѳдкій.

R. Muriatis ammoniae uncias sedecim,  
Calcis recens paratae bilibram,  
Aquae libras sex.

Librae aquae in figulinum, vel ferreum vas infusae calcem contritam adjice, et vas operito per horas viginti quatuor, dum calx in pollen dilabatur, quod retortae immitte. Huic Muriatem ammoniae in aquae libris quinque solutum addito. Tunc occluso retortae ore agitando permisce; tandem fiat destillatio calore lenissimo adeo, ut adstantis manus admota retortae, calorem ejus facile ferre queat, in excipulum refrigeratum donec destillaverint unciae viginti. In hac destillatione vasa sic conglutinanda sunt, ut vapores subtilissimi prorsus cohibeantur.

V. Admodum irritans, caustica, antacida, adstringens, et discutiens.

Us. Perraro *interne* exhibetur a guttis decem ad viginti in asphyxia, cum multa aqua. Præcipue *externus*: pro odore forma



gasis, cephalalgia, asphyxia, comata, hysteria, ophthalmia athenica; forma lini-menti: in torpore, rheumatalgia, paralyti, et id genus aliis, et triplici aquæ quantitate ad sistendum sanguifluxum minorum vasorum; tumores frigidi, duri, ex lacte, coagulato, vel lymphâ inspissata; adusta; perniones.

PRÆP. *Alcoh. ammoniatum* — *Embroc. sapon. rubefaciens.* — *Fom. sapon. ammon.* — *Fom. sapon. comp.* — *Garg. ammoniatum.* — *Haust. saponac.* — *Linim. ammon.* — *Lin. ammoniato* — *terebinth.* — *Lin. ammoniato* — *camph.* — *Mist. subcarbon. Magnes.* — *Oxynitras hydr. et ammon.* — *Solut. subacetat. cupri et ammoniae.*

## AQUA ACIDI CARBONICI.

*Aqua aëris fixi.* Углекислая вода.

Aqua fontana, acido carbonico e carbonate calcis duro, vulgo marmore, ope acidi sulphurici expulso, in vase idoneo saturatur.

Acidum e carbonatis calcis uncia, pari pondere acidi sulphurici adhibito, et aquæ circiter libra diluto, erumpens, sufficit ad aquæ libras quatuor saturandas.

V. Lotium movet, sitim restinguit, calorem minuit, irritabilitatem stomachi, nauseam, vomitumque, aut sedat, aut tollit.

Dos. Bilibra partitis vicibus quotidie.

Eodem modo præparatur AQUA FERRI AËRATA, suspendendo semunciam ferrei fili in aqua acidi carbonici. Ceteris aquis ferratis substitui potest.

Virtus harum aquarum excitans valide nervosum systema, motum systematis arteriosi augens, vires labantes refocillans; deobstruens, in primis astheniæ musculari, et nervosæ, physconiae abdominali, aurigini, rheumatalgiæ, amenorrhœæ, chlorosi, blennorrhœæ, etc. adcommoda; persæpe in iis quoque casibus, ubi vulneribus sauciis, post sulphuratas aquas, has etiam propinari e re est.

## A Q U A

## ACIDI NITRICI DILUTI.

Per se, vel in connubio aliorum.

R. Acidi nitrici diluti drachmas duas,  
 Aquae fontis, vel  
 Decocturae Hordei d. vel  
 . . . . . Furfuris, vel  
 Infusi rad: A: Calami, vel  
 . . . flor. M. Chamomillae libras duas,  
 Syrupi simplicis, vel  
 Mellis puri, uncias duas. Misce.

V. Stimulans, antiseptica, oxygenans, peptica, interdum diuretica, roborans, sialagoga.

Us. Cachexia, hepatitis chronica, febres typhodes, exanthemata asthenica, ulcera herpetica, syphilitica, psora, hydrops, morbi contagiosi.

Dos. Libra, duæ in dies, per vices.

Potui per tubum vitreum detur.

## A Q U A

## ACIDI SULPHURICI DILUTI.

Per se, vel in connubio aliorum.

R. Acidi sulphurici diluti unciam,  
 Aquæ fontanalis, vel  
 Decocturæ Hordei d. vel  
 Infusi A Calami libras duas,  
 Mellis vel syrupi uncias duas.

Dos. Drachmæ duæ ad semunciam.

Si aquæ Acidum sulphuricum in præstituta proportionem nuptum administretur, tum per modum lotionis eodem uti licet.

## A Q U A C A L C I S.

R. Calcis recens ustæ selibram.

Vasi figulino commissæ, uncias quatuor aquæ per vices adspergito, vase dein clauso, incalescenti calci, et in pulverem fatiscienti libras duodecim aquæ adfundito, et calcem cum aqua agitando permisce. — Ubi calx subsederit, iterum agitetur idque decies circiter iteretur, vase, ut aëris accessus arceatur, clauso. Denique solutio per chartam in infundibulo positam coletur in lagenis rite repletis obturandisque servanda.

V. Alcalina, antacida, leniter adstringens, anthelminthica.

U*s. Internus*: morbis ex acido primarum viarum, quibusdam cutaneis, vermibus, diarrhœæ, diabeti, etc. medetur. *Extrinsecus*: tineæ, psoræ, crustæ lacteæ, ulceribus crurum herpeticis, scorbuticis, injecta, laborantibus blennorrhœa, cystirrhœa, et vesica urinaria exulcerata, prodest.

Dos. *Interne*: a duabus unciiis, ad selibram, libram, variis vicibus sumenda, vel ipsa sola; melle tamen, vel syrupo edulcorata, vel sæpius cum lacte aliisque præsertim mucilaginosi commista, propinatur. Cavendum tamen, ne longiori usu ejusdem, ventriculus debilitetur.

PRAEP. *Linim. calcarum.* — *Sol. acetat. cupr. et Mur. ammon.*

## AQUA CARDIACA.

R. Alcoholis diluti, vel impuri (spiritus vini gallici dicti) libram,  
Aquæ bullientis libras quatuor,  
Sacchari uncias duas ad quatuor. Misc.

Interdum ad gratiam additur Succus V. Oxycocci, vel Citri m., vel alterius convenientis, ratione semper parsimoniæ habita.

V. Stimulans, exhilarans.

Dos. Pro re nata, a medente, indicanda.

## AQUA CARI CARVI.

Ex tempore paranda.

R. Elaeosacchari C. Carvi semunciam,  
Aquae fontanae libram. Misce terendo.

Eodem modo parantur

AQUA MENTHAE CRISPAE.

..... ANETHI FOENICULI.

..... PIMPINELLAE ANISI, aliæque  
extemporales.

Omnes hæ aquæ aliis pharmacis pro vehiculo plerumque inserviunt.

## AQUA DESTILLATA.

Перегнанная вода.

R. Aquae rivalis, putealis, vel fontanae quantum  
libet.

Ex vasis stanno probe obductis, vel stanneis, vel vitreis, examussim mundatis, moderato igne fiat destillatio, quoadusque duæ tertiæ circiter partes destillaverint. Aqua tali modo obtenta exponatur per aliquot dies aëri, aut in proprio apparatu probe cum aëre agitata, servetur usui.

Prima portiuncula stillantis aquæ rejiciatur.

Us. Pro solvendo Muriate hydrargyri oxydato, Tartrate stibii et potassæ. etc.

AQUA MARINA ARTEFACTA.

R. Aquae libras quinquaginta,  
Muriatis sodae uncias decem,  
    . . . . . magnesia drachmas decem,  
    . . . . . calcis uncias duas,  
Sulphatis sodae,  
    . . . . . magnesia utriusque drachmas sex.  
Misce.

Us. Pro balneis frigidis, vel calidis: scrofulæ, rachitis, aliive morbi systematis lymphatici, debilitas systematis arteriosi, musculorum, ligamentorum. *Interne*: libra propinata, alvum egregie ducit.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

R. Herbae Menthae piperitae florentis libras duas,  
vel siccatae, libram.

His affunditur aquæ tantum, ut destillatione, cum elicitæ fuerint, libræ decem, supersit quantum sufficit ad evitandum empyreuma. — Post macerationem debitam, destillentur libræ decem.

Hoc modo parantur aquæ stillatitiæ libraꝝ decem.

*Ex Corticis fructus Citri aurantii libris duabus.*  
*..... Citri medicae recentis libris*  
*duabus.*

..... Lauri Cassiae libra, per diem  
, macerata.

*Ex Fructus Myrthi Pimentae selibra, per diem  
macerata.*

... *Herbae Menthae crispae viridis libris duabus.*

..... *Pulegii florentis, libris duabus.*

... *Petalorum Rosae centifoliae recentis libris sex.*

... *Seminum Anethi Foeniculi contusorum libra.*

Singulis harum aquarum libris adde: Alcoholis diluti semunciam, conservationis causa.

## AQUA MINERALIS ACIDULA,

SELTERRANAM æmulans.

R. Aquae purae libras quinquaginta,  
Carbonatis calcis diachmas duas,  
Subcarbonatis magnesiaë unciam,  
Subcarbonatis sodae diachmas sex,  
Muriatis sodae sescunciam.

Trajice per solutionem in adparatu proprio gazis acidi carbonici pollices cubicos 909 ad 1000. Lagena hermetice clausa, conservetur.

V. Diuretica, sedans, antacida, antiseptica.

Us. Tabidis, splanchemphraxi, lithiasi, dysuria, malisque ex metastasi lactea oriundis, laborantibus, prodest.

Dos. Per cyathos detur.



## A Q U A

## MINERALIS SULPHURATA.

R. Aquæ puræ libras quadraginta,  
 Carbonatis calcis drachmas quinque,  
 Subcarbonatis sodæ . . . . . decem,  
 Miniatæ ejusdem . . . . . septem,  
 Gazis acidæ carbonicæ  
 . . . . . hydrogenii sulphurati, utriusque pollices  
 cubicos 900 ad 1,000

Aquæ in stanneo vase calefactæ, ingredientia addantur, dein refrigerata, gaze acido carbonico haud secus, ac gaze hydrogenio sulphurato, apto adparatu, saturetur.

V. Sudifica, antacida.

Us. Morbi cutanei, rheumatalgia, paralysis, rigiditas musculorum, tendinum, juncturarum, a vulneribus sclopetariis.

Gaz hydrogenium sulphuratum decompositione hydrosulphureti Potassæ, vel calcis, per acidum sulphuricum obtinetur.

## AQUA PURIFICATA.

Aqua communis filtrata simpliciter, vel prævie cocta, ac dein per saccum densum cannabinum carbonibus pulveratis repletum, filtrata, purificata usui servetur.

In plerisque omnibus febribus (exceptis adfectionibus topicis) adfusio frigidaë aquæ ad superficiem corporis totam, urgente in primis calore, primis diebus denis, peraccommoda esse censetur, magnamque promittit utilitatem. Egro acidulis potionibus, munditie, aëre puro, perflatumque habente, refecto, rarius incidit necessitas stimulantium volatiliū, quibus fatiscentiæ virium succurri solet. A sexto die adpersio ejusdem aptior, somnum placidum, adinstar narcoticorum, accersens. *Extrinsecus*, quoque adplicatur aptissime in adustis, contusuris, luxationibus etc. ubique pene, ubi calorigi partem demi e re est, suasu in primis CL. CURRIE.

## A Q U A

### SUPERCARBONATIS POTASSÆ.

AQUAE CAROLINAE, BORSETANÆ, et aliis alcalescentibus aquis æquiparabilis.

R. Aquae libras decem.

Subcarbonatis potassae purissimi unciam.

Solve, et subijce rivo gazis acidi carbonici, qui oriatur ex pulvere Carbonatis Calcis, Acidi sulphurici, utriusque unciis

tribus, aquæ libris totidem, gradatim, et caute commistis.

Huic præparationi conveniunt adparatus chemici a D. D. NOOTH et WOULFE inventi.

V. Antacida, diuretica, solvens, antizootica.

Us. *In. et externus*: lithiasis, arthritis, scrofula, morbus regius, obstructio abdominalis, obesitas etc.

Dos. A selibra ad libram, spatio viginti quatuor horarum.

## A Q U A

### SUPERCARBONATIS SODÆ

Paratur ex aquæ libris decem, et Supercarbonatis sodæ unciis duabus, eodem modo, ac aqua supercarbonatis Potassæ.

V. Inter lithontriptica, primum locum habet; diuretica, antacida.

Us. Lithiasis, podagra, morbi ex metastasi lactea, morbi ex acido primarum viarum orti, leucophlegmatia, hydrothorax.

Aqua hæc in lagena hermetice claudenda, servetur.

Dos. Ut, et præcedentis.

CARBONAS CALCIS PRÆPARATUS,  
*Creta præparata, et cancrorum lapilli, vulgo  
 Oculi cancrorum præparati.*

Carbonas calcis, sen mollior, Creta dictus sen durior, sub nomine lapillorum et oculorum cancrorum uerus in ferreo mortario pulveratus, atque super Porphyritem cum pauxillo aquae laevigatus, yasi committatur capaci, tum aqua affundatur quae saepius agitato vase onusta polline elutrietur. Aqua quiescente pulvis subtilis subsidet, illico exsiccandus Crassus pulvis cui aqua non est, sustinendo, laevigetur iterum, eodemque, ut prius, modo, tractetur.

V. Exsiccans, antacida.

Us. Idem, ac aquæ calcis; pyrosis; cardialgia, aliive morbi ex acido primarum viarum, et cum primis diarrhœa infantum, crusta lactea, rachitis.

Pro antidoto quoque habetur Acidi arsenicosi in ventriculo hærentis.

Dos. Grana decem, triginta, et amplius, sæpius de die.

PRAEP. *Mist. carbon. calc. comp.*

CARBONAS FERRI PRÆCIPITATUS.

R. Sulphatis ferri uncias quatuor  
 Subcarbonatis sodæ uncias quinque,  
 Aquae fontanae libras decem.

Solve Sulphatem Ferri in aqua, dein adde:

Subcarbonatem sodæ, prius ex aquæ quantum satis sit, solutum, et misce probe.

Lavetur Carbonas Ferri, qui fundum petit, aqua tepida, et postea siccetur.

V. et U. s. ut Ferri limati; præferri tamen huic meretur.

Dos. A granis tribus, decem ad viginti, et amplius.

PRAEP. *Mist. g. Myrrhae ferrata. — Pulv. Junip. Sabinae comp.*

## C A R B O N A S F E R R I P R A E P A R A T U S.

*Rubigo ferri praeparata.*

Ferri limatura purificata saepius aqua humectetur, ut fatiscat in rubiginem, quae siccata in mortario ferreo tenetur in pollen.

V. U. s. et. Dos. eadem, ut Ferri limati.

PRAEP. *Tinctur. muriat. Ferri alcoholisat.*

## C A T A P L A S M A A C E T A T I S P L U M B I.

R. Micarum panis, vel  
Farinae quantum vis,  
Solutionis Acetatis plumbi fortioris  
quantum satis, ut in cataplasma madescant.

U. s. Ecchymosin, illata extrinsecus vi, productam, discutit. — Excoriationibus, adustis, contusuris, luxationibus, tumoribus ossium scrofulosis, distorsioni, convenit.

## CATAPLASMA ACETATUM.

R. Farinae cujuslibet, vel  
 Micarum panis, quantum vis,  
 Acidi acetici impuri, quantum satis, ut fiat cata-  
 plasma, saepius frigide superdandum, et ubi  
 siccescet, calefietque, renovandum.

V. et Us. ut, et præcedentis.

## CATAPLASMA ALUMINOSUM.

R. Supersulphatis Aluminae et Potassae drachmam,  
 Albumina duorum ovorum,  
 Fortiter simul agitentur, ut in coagulum coëant.

Us. In ophthalmia asthenica, pernione.

PRÆP. *Collyrium supersulph. Alum. et Po-  
 tassae.*

## CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

R. Camphorae (in uncia, aut Alcoholis, aut olei  
 destillati Pini laricis solutae) sesquidrachmam,  
 Farinae cujuslibet selibram,  
 Cervisiae fervefactae quantum satis, ut fiat cata-  
 plasma, vel  
 Adde cataplasmati domestico, carbonis ligni pul-  
 verati uncias duas.

Us. In ulceribus putidulis, gangræna,  
 sphacelo.

Postrema duo mala, carbonum pulvere  
 respersa, oleo Pini laricis, vel sylvestris  
 destillato, humefiant interdum; dein cata-  
 plasma domesticum superdetur. Id quod e  
 camphora conficitur, utpote carioris pre-

tii utrique oleo, sic, ut supra dictum, adhibito, postponi in curatione militum debet, eâdem facultate pollenti.

## C A T A P L A S M A

### CONII MACULATI AMMONIATUM.

#### *Cataplasma Cicutae compositum.*

R. Farinae seminum Lini usitatissimi, vel  
 . . . . Avenae sat. selibram  
 Foliorum recentium Conii maculati rite contusorum uncias duas,  
 Acidi acetici impuri quantum sufficit,  
 Coque parumper, et adde:  
 Muriatis Ammoniae semunciam.

Us. Tumoribus articulorum scrofulosis, ulceribus cancrrosis, scirrhomatibus præternaturali irritabilitate stipatis, et gangrænæ adcommodum.

### CATAPLASMA DAUCI CAROTÆ.

R. Radicum Danci Carotæ recentium, rasarum, quantum opus, ut parti admoveatur. Vel Earundem quantum vis, coque ex aquae sufficienti quantitate, donec mollescant, tum in pulpam contundito.

Us. Parti corporis nudæ admovendo, in curatione ulcerum putrescentium, quæve cacoëthe vocant, canceraticorum, herpetum, perutile; psoriasis scroti, et genitalium, eidem cedit.

## CATAPLASMA DISCUTIENS.

Speciebus post infusum aromaticum residuis addito unguenti simplicis duas uncias, et habebis cataplasma discutiens anthraci adcommodum.

vel

Cataplasmati emollienti adde :

Gummi-resinae F. Ammon, sufficienti quantitate  
aceti solutae semunciam,  
Muriatis Ammoniae diachmas duas,  
Alcoholis diluti cum, vel potius, sine Camphora  
unciam ut fiat cataplasma.

Us. Tumores articulorum asthenici, arthropuosis.

vel

R. Farinae secalitiae partes sex,  
Fermenti panis veteris partes duas,  
Muriatis sodae partem, Misce

Us. Rheumatalgia, arthrodynia etc.

## C A T A P L A S M A EMOLLIENS VEL DOMESTICUM.

R. Farinae hordeaceae, vel  
..... Lini usitatissimi, vel  
Micarum panis veteris, quantum vis  
Coque ex aquae fontis, vel lactis sufficienti  
quantitate ad aptam crassitudinem.

Quum admoventum est, vel parti, cui cataplasma superdandum est, vel hujus superficiei Adeps Suis Scrofae, vel oleum prius illinatur, idque furunculis et aliis tumoribus inflammatoriis, vel vulneribus, ubi suppurationis movendæ necessitas incidit, idoneum.



## CATAPLASMA FERMENTANS.

- R. Farinae triticeae sescunciam,  
 Faecum Cerevisiae unciam,  
 Mellis semunciam. Misce, ut fiat cataplasma.

vel

- R. Farinae avenaceae quantum vis,  
 Faecum Cerevisiae quantum satis.

vel

- R. Farinae secalitiae libram,  
 Faecum Cerevisiae uncias novem,  
 Muriatis sodae uncias duas. Misce.

Us. In ulceribus putrescentibus, gangraena, sphacelo, etc.

## CATAPLASMA

## NICOTIANÆ TABACI.

- R. Foliorum Nicotianae Tabaci unciam,  
 Acidi acetici impuri, vel  
 Aquae ferventis quantum satis,  
 Simul in cataplasma contundito.

Us. In herpete. — Quum emetica interne neutiquam exhiberi possunt, tum ad motum cordis scrobiculo, vices eorundem supplet.

## CATAPLASMA PUS MATURANS.

- R. Farinae secalitiae partes duas,  
 Saponis piceae,  
 Allii Cepae tostae,  
 Mellis, singulorum partem. Fiat cataplasma.

vel

- R. Farinae avenaceae,  
 Mellis, utriusque pares portiones. Fiat cataplasma.

vel

Adde Cataplasmatidis emollientis communis librae,  
 Allii Cepae crudi contusi, sescunciam,  
 Unguenti resinosi unciam.

vel

R. Radicis Allii Cepae quantum vis,  
 Coque ex aquae fontis sufficienti quantitate ad  
 aptam mollitiem, ut fiat cataplasma.

## CATAPLASMA SINAPINUM ACRE.

### Sinapismus.

R. Farinae avenaceae, vel  
 Micae panis  
 Seminum sinapeos nigrae contusorum, utrius-  
 que uncias duas,  
 Radicum Cochleariae Armoraciae rasarum  
 sescunciam,  
 Muriatis Ammoniae semunciam  
 Acidi acetici impuri quantum satis sit, ut fiat  
 cataplasma.

V. et Us. Idem, ut cataplasmatidis sinapi-  
 pini mitis; fortius tamen illo.

## CATAPLASMA SINAPINUM MITE.

### Sinapismus mitior.

R. Seminum Sinapis nigrae contusorum,  
 Farinae avenaceae, vel  
 . . . . . triticeae, vel  
 Micarum panis, vel  
 Fermenti ejusdem, utriusque pares portiones.  
 Acidi acetici impuri quantum satis, ut fiat cata-  
 plasma.

Us. Vitia e reactione vis vitae deficienti,  
 te, ex sudore consueto locali suppresso,  
 aut exanthematibus chronicis, vel acutis

retropulsis; paralysis, cephalalgia, stupor, coma cum, vel sine febre, delirium febrile; interioribus cruribus, femoribus, brachiis, nuchæque imponendum.

C E R A T A,  
E M P L A S T R A, L I N I M E N T A, U N -  
G U E N T A Q U E.

In parandis componendisque his, resinosa atque pingua leniori igne liquéfiant, aridis, si quæ præsto sint, sub jugi motu, simul inspersis, in pertenuem tenuatis pulverem, quoadusque frigescens riguerit miscela.

C E R A T U M A C E T A T I S P L U M B I.

*Ceratum Saturni.* Мазь свинцовая.

R. Olivi partes tres,  
Cerae albae, vel flavae partem.

Simul leni igne liquefactis, et paulum refrigeratis probe movendo, paratis vicibus, adde:

Acetatis Plumbi liquidi partem, vel  
..... crystallisati decimam partem. *ad quin*

Us. Cnesmus, excoriationes, adusta.

## CERATUM OXY-CARBONATIS ZINCI PRÆPARATI.

*Ceratum lapidis calaminaris.*

- R. Adipis Suis Scrofae selibram,  
Cerae flavae,  
Oxycarbonatis Zinci præparati, utriusque un-  
ciam,  
Olei B. Napi semunciam. Fiat ceratum.

V. Desiccans.

Us. Ulcusculis, et pustulis, cutis ex-  
coriationibus superficialibus, ad cicatri-  
sationem promovendam aptum.

## CERATUM SIMPLEX.

- R. Olei B. Napi, vel alius congrui partes duas,  
Cerae albae, vel flavae partem cum semisse,  
Fiat ceratum.

## CEREVISIA ANTISCORBUTICA.

- R. Radicis Cochleariae Armoraciae,  
Seminum Sinapis nigrae contusorum,  
Extracti turionum Pini singulorum bilibram,  
Syrupi Molasses libras quatuor,  
Cervisiae tenuis, vel  
Infusi Malti H. vel  
Decocti ejusdem libras centum et viginti.

Stent leni digestionem per dies quatuor, vel  
sex, ut fiat fermentatio, et cola.

Us. Scorbutus, paralysis. Interdum ad-  
dita Subcarbonatis potassæ libra, fiat ma-  
ceratio sine calore, et aptum hydropisi  
fit remedium, diuretica vi enitens.

Dos. A selibra ad libram per diem.

## C E R O M E L.

R. Ceræ albae, vel flavae partem,  
Mellis partes quatuor.

Leni igne liquefacta, misce.

Us. Ad tegenda, et consolidanda ulcera, præcipue atonica.

Aliis plurimis emplastris, unguentis substitui potest.

## C L Y S T E R A C E T A T U S.

R. Clysteris communis selibram,  
Acidi acetici impuri, uncias duas — tres.  
Misce.

Us. Alvus adstricta, ileus rebellis, narcotismus, id est apoplexia a venenis narcoticis, et phrenitis hydrocephalica etc. Infesta auctiori irritabilitate recti, quantitas aceti imminuitur.

## C L Y S T E R

## A D S T R I N G E N S c u m O P I O.

R. Decocturæ gallarum Quercus Cerris, vel  
..... corticis Quercus R. cum, vel sine  
Supersulphate Aluminæ et Potassæ selibram,  
Tincturæ Opii guttas quinquaginta. Misce.

Us. Alvi fluxus rebellis, procidentia ani, hæmorrhoides mucosæ, sanguifluxus recti.

## CLYSTER ALOETICUS.

- R. Gummi - resinae Aloës perfoliatae (Socotorinae)  
 in sufficienti quantitate vitelli ovi solutae  
 draclunam,  
 Decoctinae seminum Hordei d: vel  
 ..... Avenae sativae, vel  
 Lactis vaccini libram. Fiat clyster omni, vel  
 alterna quaque nocte. injiciendus.  
 Interdum, Muriatis Hydrargyri oxydati  
 sesquigranum additur.

Us. Ascarides.

Eisdem virtutibus gaudent sēquentia:

Injectio unciarum octo, linimenti calcarei.  
 vel

- R. Succii Allii sativi unciam,  
 Lactis recentis uncias octo. Misce.  
 vel

- R. Aquae, vel vini rubri selibram,  
 Muriatis Sodae quantum solvi potest. Misce.  
 vel

- R. Seminum V. Sabadillae pulv: semidrachmam,  
 Aquae uncias decem.  
 Coque ad colaturam selibrae, adde: lactis re-  
 centis tantumdem.

## CLYSTER AMYLI.

- R. Amyli semunciam,  
 Aquae ferventis selibram,  
 Olei Lini nsitatissimi, vel  
 Olivi, vel  
 Butyri semunciam, misceantur.

Us: Tenesmus, dolor intestinorum, di-  
 arrhoea, dysenteria, stranguria, haemor-  
 rhois, etc.

## CLYSTER CATHARTICUS.

- R. Infusi foliorum Cassiae Sennae uncias quatuor,  
 Sulphatis magnesiae unciam,  
 Aquae tepidae uncias septem,  
 Olei lini usitatissimi, vel  
 Olivi unciam. Misce.

## CLYSTER COMMUNIS.

- R. Muriatiss sodae, vel  
 Sulphatis ejusdem semunciam, vel  
 Saponis sebacei drachmas duas,  
 Decocturae seminum Hordei d. vel  
 ..... Avenae sativae, vel  
 ..... Radicis Althaeae off. vel  
 Infusi seminum Lini usitatissimi sine Glycyrrhi-  
 za, vel infusi florum M. Chamomillae, vel  
 Aquae tepidae libram.  
 Olei Lini usitatissimi unciam. Misce.

## C L Y S T E R

## GUMMI-RESINÆ F. ASÆ FOETIDÆ.

- R. Gummi-resinae F. Asae foetidae in vitello ovi  
 solutae drachmas duas,  
 Aquae ferventis uncias decem.  
 Cui subinde addito: Tincturae Opii guttas quin-  
 quaginta.

Us. Spasmi, hysteria, ataxia, convulsio-  
 nes, singultus, colica spasmodica, vermi-  
 nosa, flatulenta etc.

## CLYSTER NUTRIENS.

- R. Decocturae carnis bubulae fortioris uncias octo,  
 Amyli semunciam. Misce.

Tertia, vel quarta quaque hora injiciendus.

Huic, si citius rejiciatur, adde:

Tincturae Opii drachmam.

Us. Dysphagia, omnibusque in casibus, ubi ex deglutitione suspensa, nutritio corporis requiritur.

### CLYSTER OPIATUS.

R. Clysteris Amyli, vel  
 Infusi seminum Lini usitatissimi sine Glycyrrhiza, uncias quatuor,  
 Tincturae Opii guttas quinquaginta. Commisce.

Us. Convulsio, trismus, cholera, diarrhoea, dysenteria, tenesmus, stranguria, colica spasmodica etc.

### CLYSTER TABACINUS.

R. Foliorum Nicotianae Tabaci semunciam,  
 Infunde Aquae ferventis uncias decem, per quadrantem horae; colatura injiciatur.

Us. Ileus, alvus pertinaciter compressa, hernia incarcerata, asphyxia, phrenitis hydrocephalica, ascarides.

Clyster hic vomitionibus quoque provocandis, urgente in primis dysphagia, ap-  
 lus.

### CLYSTER TEREBINTHINATUS.

R. Balsami Pini Laricis semunciam,  
 Decocti seminum Hordei di. vel  
 Infusi seminum Lini usitatissimi per se, uncias  
 decem,  
 Olei Lini usitatissimi unciam.



Interdum tincturæ Opii guttæ quinquaginta adduntur.

Us. Ischuria, dysuria, cystirrhœa.

## C O L L Y R I U M

### ACETATIS AMMONIÆ LIQUIDI.

R. Acetatis Ammoniae liquidi,  
Aquae Rosae centifoliae, vel  
..... fontanae utriusque selibram. Misce

Interdum additur:

Tincturae Opii drachma, vel  
..... Humuli Lupuli, vel  
..... Hyosciami nigri sesquidrachma.

V. Egregie sedans.

Us. Ophthalmia, abnormi irritabilitate stipata etc.

### COLLYRIUM SUPERSULPHATIS

#### ALUMINÆ ET POTASSÆ.

R. Supersulphatis Aluminae et Potassae scrupulum,  
Aquae selibram. Solve.

vel

Cataplasmati aluminoso addatur,  
Aquae destillatae libra.

V. Adstringens.

Us. Ophthalmia sthenica. Nyctalopia;  
interne roborantia, antiscorbutica eodem  
tempore propinando.

## DECOCTURA

## ALTHÆÆ OFFICINALIS.

R. Radicis Althææ off. siccatae, et incisæ uncias  
quatuor.

Fructus sicc. Vitis viniferae, vel

..... Fici Caricæ demptis acinis  
uncias duas, vel

Radicis Glycyrrhizæ glabrae unciam,

Aquæ libras septem.

Decoque aquam cum Althææ leni igne ad  
libras quinque, ubi Glycyrrhiza substi-  
tuitur, sub finem coctionis addenda. —  
Liquorem colatum sepone, donec fæces  
subsederint, et effunde.

Dos. Libræ duæ in dies partitis vicibus.

## DECOCTURA ANTISCORBUTICA.

R. Specierum turionum Pini sylvestris sescunciam,  
Aquæ puræ sesquilibram,

Decoque ad colaturam libræ, cui si lubet,  
adde:

Acidi Tartarici semidrachmam, vel

..... sulphurici diluti drachmam, vel

Roob baccarum V. Oxycocci, vel

Syrupi Molasses, vel

Oxymellis simplicis, vel

Succi Citri medicæ unciam.

Dos. Libra, et amplius quotidie.

## DECOCTURA ARCTII LAPPÆ.

R. Radicis Arctii Lappae, concisae uncias duas,  
Aquae fontanae libras tres, coque ad colaturae  
libras duas.

In colata decoctura interdum solvitur Sulphatis potassæ drachma, quo cuticularibus vitiis aptior fit.

Dos. Libræ duæ partitis vicibus in dies.

DECOCTURA  
CINCHONÆ OFFICINALIS.

R. Corticis Cinchonae off. contusi, vel in pulverem  
triti unciam,  
Aquae ferventis sesquilibram.

Decoque ad remanentem libram, et liquorem adhuc calentem per vetustum linteam, et rarum exprimendo cola.

Dos. Unciæ binæ, bis, ter, quater, vel sæpius de die.

Interdum sub finem coctionis adduntur:

Corticis Lauri Cassiae drachmae duae, vel  
Extracti Glycyrrhizae gl. semuncia, vel  
Radicis Angelicae A. drachmae duae, vel  
..... A. Serpentariae tantundem, vel  
..... Valerianae sylvestris tantundem.

Subinde singulis decocturae dosibus vel, ante, vel statim post ejusdem exhibitionem, in vehiculo idoneo propinare licet:

Acetatis ammoniac liquidi semunciam, vel  
 Acidi sulphurici aromatici gutt quindecim ad tri-  
 ginta, vel  
 Aetheris sulph. alcoholisati guttas viginti vel  
 Aetheris sulphurici alcoholisato camphorati gut-  
 tas decem, vel  
 Alcoholis camphorati guttas decem, vel  
 ..... diluti drachmam ad duas, vel  
 Pulveris aromatici scrupulum, vel  
 ..... radicis Colombae grana decem, vel  
 ..... Rhei p. grana quatuor vel  
 ..... Serpentariae grana decem, vel  
 ..... Valerianae off. scrupulum vel  
 Subcarbonatis ammoniae liquidi guttas quadra-  
 ginta vel  
 Tincturae A. Serpentariae diachmas duas vel  
 ..... Cinchonae diachmas duas ad semun-  
 ciam, vel  
 ..... Gummi resinae Guajaci guttas quadra-  
 ginta, vel  
 Tincturae Opii guttas quinque, vel  
 ..... Valerianae aethereae semidrachmam.

## DECOCTURA DAPHNES MEZEREI.

R. Corticis Daphnes Mezerei, drachmas duas,  
 Radicis Glycyrrhizae glabrae semunciam,  
 Aquae fontanae libras tres. Decoque leni igne  
 sub finem addendo radicem Glycyrrhizae gl.  
 ad bilibras, et cola.

Dos. Libra in dies, partitis vicibus.

## DECOCTURA FURFURIS.

R. Furfuris uncias quatuor,  
 Aquae fontanalis libras duodecim.

Coque ad libras novem, cum subsederit  
 furfur elutriandas.

Vices decocturae Hordei d. supplet.

Interdum singulis ejusdem libris additur:

Syrupi simplicis,  
 vel Mellis uncia,  
 Succi V. Oxycocci quantum satis sit ad gratiam.

## DECOCTURA HÆMATOXYLI CAMPECHIANI.

R. Ligni Hæmatoxyli Campechiani rasi sescunciam,  
 Corticis Lauri Cassiae drachmam,  
 Aquae fontis bilibrain.

Lignum ex aqua decoque ad libram, sub finem coctionis addens corticem, et cola.

Dos. Uncia ad duas, ter, vel sæpius in diem.

## DECOCTURA HORDEI D. PER SE, ET NITRATA.

R. Seminum decorticatorum Hordei d. uncias duas,  
 Aquae communis libras quinque,  
 Decoque ad dimidium, et colaturae, si lubet,  
 adde:  
 Mellis puri, vel  
 Oxymellis simplicis, uncias duas.

Us. Pro potu ordinario.

Si vero huic addas Nitratis potassæ drachmas duas, habebis DECOCTURAM HORDEI D. NITRATAM, cujus dosis erit unciæ tres, quatuor, sæpius de die.

## D E C O C T U R A LICHENIS ISLANDICI.

R. Lichenis Islandici semunciam,  
Aquæ fontanalis sesquilibram,  
Coque ad libram, et adde sub finem coctionis :  
Radiciis Glycyrrhizæ glabrae rasae drachmam, vel  
Mellis pini semunciam.

Us. Cum, vel sine lacte: morbi pulmo-  
num atonici, pertussis, phthisis pituitosa,  
tabes, leucorrhœa, ect.

Dos. Unciæ quatuor, ter quaterve in  
diem.

## D E C O C T U R A MALTI HORDEI D. COMPOSITA.

R. Malti Hordei d. uncias quatuor,  
Specierum turionum Pini sylv. compositarum  
uncias duas.

Decoque ex aquæ fontanalis libris qua-  
tuor ad tres colaturæ.

vel

R. Decoturæ Malti li. per se,  
..... antiscorbuticæ acidulæ, pares por-  
tiones.

Dos. Unciæ quatuor, ter quaterve de  
die.

D E C O C T U R A  
MALTI HORDEI D. PER SE,  
VEL ACIDULA.

R. Malti (i. e. semina Hordei d. aqua humectata, dein accumulata ut tepescant, et germinent, et tunc demum subito siccata, inque molendina fracta) selibram,  
Aquae fontanae libras sex.

Decoque ad colaturam librarum quatuor;  
cui interdum recte adduntur:

Acidi tartarici drachmae duae, vel  
.... sulphurici diluti semuncia, vel  
Roob baccarum V. Oxycocci, vel  
Molasses, vel  
Oxymellis simplicis, vel  
Succi Citri medicae unciae tres.

Us. Per se, pro potu ordinario propinatur ad libitum in scorbuto. In conu-  
bio autem aliorum, libra ad bilibram par-  
titis vicibus quotidie in eundem finem da-  
tur; indeque Cerevisia antiscorbutica pa-  
ratur.

NB. Persæpe loco decocturae, infusum ejus-  
dem propinatur.

DECOCTURA MUCILAGINEA.

R. Gummi Mimosae niloticae unciam,  
Solve in decocturae Hordei d. libra, et adde:  
Oxymellis simplicis semunciam.  
vel

R. Aquae purae libram,  
Cornu Cervi Elaphi rasi,

Gummi Mimosae niloticae, utriusque unciam.  
 Coque, ut solvantur, et cola.  
 Adde: si vis, Sacchari puri semunciam.

Us. Dysuria, dysenteria, diarrhœa, nephritis, cystitis, etc.

Dos. Ut, et præcedentis.

## DECOCTURA ORCHIDIS MORIONIS PER SE, VEL AROMATICA.

R. Pulveris radicis Orchidis Morionis drachmam,  
 Aquae fontanalis sesquilibram,  
 Decoque ad libram colaturae, si lubet, addendo:  
 Sub finem coctionis, corticis Lauri Cassiae contusi drachmam vel  
 Liquori colato admiscendo:  
 Tincturae aromaticae unciam,  
 Sacchari albi tantundem.

Us. Diarrhœa, dysenteria etc.

Dos. Ut, et præcedentis.

## DECOCTURA POLYGALÆ AMARÆ.

R. Rad. Polygalæ amarae semunciam,  
 Aquae sesquilibram.  
 Coque ad libram, et colaturae interdum, si placet adde:  
 Radicis scillae maritimae præp: scrupulum,  
 Mellis semunciam.

Dos. Unciæ binæ, ter, quaterve de die.

## DECOCTURA QUERCUS ALUMINOSA.

R. Corticis Quercus R: drachmam,  
 Aquae fontis libram, coque ad uncias octo;  
 et adde:



Supersulphatis Aluminæ et Potassæ drachmam,  
Syrupi simplicis semunciam.

Us. Sanguinis profluvia, etc.

Dos. Uncia, ter quaterve de die, plus,  
vel minus, rarius, vel sæpius, ne alvus  
plus æquo compressa esset. Omisso syru-  
po persæpe *externe* pro lotionē fomento-  
que adhibetur, et gargarisma antisepti-  
cum ingreditur.

## DECOCTURA

### RHODODENDRI CRYSANTHI.

R. Herbae Rhododendri c: siccatae drachmas duas,  
Aquae fervidae libram,  
Committe vasi fictili luto oblito et digere leni  
calore per horas duodecim liquoremque cola.

Dos. Unciæ duæ, alterna quaque hora  
ad quartam vicem, nisi vertigo, nausea,  
vomitus, vel alia mali ominis ulteriorem  
administrationem vetent.

## DECOCTURA

### SALICIS COMPOSITA.

R. Corticis salicis drachmas novem,  
Gentianæ l: radicis drachmam,  
Aquae sesquilibram, decoque ad libram.

Interdum corticis Quercus R: drachmæ  
duæ addi possunt.

Succedanea decoctui Cinchonæ off.

Eadem citra additamentum Quercus facta, cum aliis, quorum, penes decoctum Cinchonæ off. mentio injecta est, apposite consociari potest.

## DECOCTUM SPECIERUM GUAJACI COMPOSITARUM.

*Decoctum lignorum.*

R. Specierum Guajaci compositarum uncias tres,  
Aquæ ferventis libras tres,  
Decoque ad remanentem bilibram, sub finem  
coctionis addendo: radicis Glycyrrhizæ gl.  
diachnias duas, cola.

Subinde loco Glycyrrhizæ gl: liquori  
colato mellis puri semuncia recte additur.

Dos. Bilibra de die partitis vicibus.

## D E C O C T U R A SPECIERUM GUAJACI COMPOSITA- RUM CUM DAPHNE MEZEREIO.

Fit eodem modo, ut decoctura specierum  
Guajaci compositarum, addita singulis  
decoctus libris, Daphnes Mezerei drach-  
ma.

vel

R. Decocturæ specierum Guajaci compositarum,  
..... D: Mezerei utriusque pares portio-  
nes, Misce.

Dos. Libra ad sesquilibram de die datur.

## DECOCTURA ULMI CAMPESTRIS.

R. Corticis interioris Ulmi campestris unciam,  
decoque ex aquae fontinalis libra ad selibram.

Dos. Selibra bis terve per diem.

## ELÆOSACCHARUM C. CARVI.

R. Sacchari puri pulverati semunciam,  
Olei destillati C. Carvi guttas duodecim, Misce.

Eodem modo parantur:

ELÆOSACCHARUM MENTHAE CRISPAE.

PIMPINELLAE ANISI.

ANETHI FOENICULI. etc.

Us. Pulveribus variis junguntur elæo-  
sacchara in genere, ad parandas ejus-  
dem nominis aquas extemporales.

EMBROCATIO, VEL LINIMENTUM  
SAPONIS RUBEFACIENS.

R. Saponis terebinthinati uncias duas,  
Olei destillati Pini laricis unciam, solve in  
Alcoholis diluti camphorati unciis octo, adde:  
Ammoniae liquidæ sescunciam,  
Tincturae Lyttæ vesicatoriae semunciam.

V. Præstans, stimulans, solvens etc.

Us. Arthrodynia, myodynia rheumati-  
ca, paralysis.

## EMPLASTRUM GUMMI-RESINOSUM.

R. Emplastri oxydi Plumbi semivitrei  
    partes duodecim,  
     Gummi-resinae F. Ammon depuratae,  
     ..... B. Galbani depuratae,  
     Balsami Pini Laricis, aut sylvestris,  
     Cerae flavae, singulorum, partem.  
     Liquefacta, probe movendo commisceto.

Us. Tumores atonici, vel sthenici ægre abscedentes, verruca, clavus, et similia.

Oleum Bras. Napi, Lini usitat. Oleæ Europeæ, Sesami orientalis, virtutibus consimilibus gaudent, alterum proinde pro altero, pro circumstantium rerum ratione adhiberi potest; præferendo tamen id, quod pro fertilitate provinciæ, pretii est levioris; postrema autem duo id privum habent, quod etiam vicario olei Ricini communis munere, ubique pene, fungi queant.

EMPLASTRUM  
 LYTTÆ VESICATORIÆ.

R. Emplastri simplicis partes quatuor,  
     Adipis Suis Scrofae præparatae  
    partem dimidiam,  
     Fuscis simul pedeternum sub jugi motu inspergi-  
     to, Lyttæ vesicatoriæ pulveratae  
    partes duas cum dimidia.

Loco hujus emplastri, emplastro T. Meliloti super alutam, vel pulmento panis se-

calini, linteo extenso, pulveris Lyttæ vesicatoriæ inspersio vices supplet, atque eundem exserit effectum citius.

Pars, cui admovendum est emplastrum pulvere Lyttæ vesicatoriæ respersum, primo, aceto perfricetur, quo facilius actionem suam producat.

## EMPLASTRUM

### • OXYDI PLUMBI SEMIVITREI.

*Emplastrum Lythargyri. Commune. Diachylon simplex.*

R. Oxvdi plumbi semivitrei pulverati partem,  
Olei Oleae Europaeae, vel alterius congrui partes duas.

Coque leni igne, addens subinde aquæ tepidæ pauxillum, præcavendæ combustionis ergo, et assidue agita, donec oleum, et oxydum in emplastrum coëant. Dum liquescunt, enitendum, ne mistura plus æquo calefiat.

Si ad quinque partes emplastri supra dicti, balsami Pini sylvestris exsiccati additur pars, EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI SEMIVITREI RESINOSUM, habebis olim EMPLASTRUM ADHAESIVUM dictum.

PRAEP. *Empl. gummi-resinosum. — Empl. oxydi plumbi semivitrei compositum.*

# EMPLASTRUM OXYDI PLUMBI SEMIVITREI COMPOSITUM.

## *Saponatum.*

R. Emplastri Oxydi plumbi semivitrei partes quatuor,  
Saponis sebacci partes duas,  
Muriatis ammoniac partem.

Sapone, et emplastro simul liquefactis, et semi-refrigeratis Murias ammoniac subtilissime tritus addatur.

Hoc emplastrum illico, simulac factum est, parti affectæ superdetur.

Us. Fungus articulorum, aliive tumores asthenici, vulgo frigidi, sic dicti.

# EMPLASTRUM OXYNITRATIS HYDRARGYRI ET AMMONIÆ.

## *Emplastrum mercuriale.*

R. Emplastri simplicis libram,  
Oxynitratis hydrargyri et ammoniac  
drachmas duas ad tres.

Fiat emplastrum.

Us. Indurationes.

Si singulis hujusce emplastri unciis additur Tartratis stibii et potassæ semidrachma, vis ejusdem intenditur.

V. Irritans, calefaciens, sæpe pustulas movens.

Us. Rheumatalgia, struma, hydrarthrus, etc.

## EMPLASTRUM SIMPLEX.

*Emplastrum cereum.*

- R. Ceræ flavae partes tres,  
 Adipis Suis Scrofae præparatae partes duas,  
 Balsami Pini sylvestris exsiccati partem.  
 Colliquēfacta, misce.

PRAEP. *Empl. Lyttæ vesicator.* — *Empl. Oxypit. hydr. et ammon.*

## EMPLASTRUM T. MELILOTI.

- R. Balsami Pini sylv. exsiccati libras duas,  
 Adipis Suis Scrofae præparati uncias sedecim,  
 Ceræ flavae libram,  
 Olei olivarum, vel alijs congrui uncias quatuor.  
 Herbae cum floribus T. Meliloti libram.  
 Colliquescentibus ceteris in finem pulvis addatur.

## EXTRACTUM AMARUM.

- R. Herbae Artemisiae Absynthii,  
 . . . . . Menyanthes trifoliatae,  
 Radicis Gentianae luteae, singulorum  
 quantum velis.

Concisa, coque ad perfectam extractionem in aquæ communis sufficiente quantitate, post colaturam, expressionemque residui, decoctura evaporet, lenique igne inspissetur, ut fiat extractum ex una, vel omnibus simul.

V. Roborans, peptica.

Dos. A granis decem ad triginta.

## EXTRACTUM GENTIANÆ LUTEÆ.

R. Radicis Gentianae luteae quantum libet.

Concisæ huic, et contusæ, octuplum destillatæ aquæ adfundito, et ex hac ad dimidium decoquito ad perfectam videlicet virium ejusdem extractionem. Decoc-turâ dein valide expressa, filtretur, et illico per vaporationem ad mellis spissioris crassitudinem redigatur in balneo fer-vefactæ aquæ, sodæ Muriate, lege artis, saturatæ.

V. Us. et Dos. ut præcedentis.

Sic parantur.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ GL. *dosis dra-  
chma ad tres.*

..... LIGNI H. CAMPECHIANI, *do-  
sis scrupulum ad duo.*

..... RADICIS TORMENTILLÆ E-  
RECTÆ, *dosis ut Kino.*

..... CORT. SALICIS, *dos. grana de-  
cem ad quadraginta.*

..... TURIONUM PINI SYLV. *dos.  
grana decem ad semidrachmam.*

NB. Piora tria ad siccitatem evaporent,



## FOMENTUM ALUMINOSUM.

R. Supersulphatis Aluminae et Potassae semunciam,  
Solve, in acidi acetici impuri selibra,  
Dein adde: Alcoholis diluti tantundem,

Us. Pernio, genu aliarumque articulationum dolores, et tumores; linteam hoc liquore constanter madefactum, applicando.

## FOMENTUM AROMATICUM.

Frigide, aut tepide superdandum, prout opus erit, vide *Infusum Specierum aromaticarum*.

Us. Vitia localia reactione vis vitæ, æquo minori, stipata.

FOMENTUM COMMUNE PER SE, VEL  
CUM MURIATE AMMONIÆ.

R. Alcoholis diluti selibram,  
Acidi acetici diluti libram. Misce.

Interdum adduntur:

Muriatis ammoniae drachmae duae.

vel

R. Aquae bilibram,  
Acidi acetici impuri,  
Alcoholis diluti, utriusque libram,  
Muriatis ammoniae, semunciam,  
Tepide, vel frigide admovendum.

Us. In ecchymosi, contusione etc. linteis humefactis superdandum.

## FOMENTUM COMMUNE TEPIDUM.

Vesica bovilla, vel suilla repleatur ad dimidium aqua tepida, et parti affectæ admoveatur.

vel

Pannus laneus porosus, aquæ fervidæ immersus, dein expressus applicetur, renovando simulac frigescet.

F O M E N T U M  
S A P O N I S A M M O N I A T U M.

R. Solutionis Saponis,  
Acetatis ammoniac liquidæ, uniusque unciam,  
Ammoniac liquidæ semunciam.

V. Stimulans, solvens.

F O M E N T U M  
S A P O N I S C O M P O S I T U M.

R. Acetatis Ammoniac liquidæ uncias quatuor,  
Solutionis Saponis uncias duas. Misce.

V. et Us. Ut, et præcedentis; debilior tamen.

F O M E N T U M  
V U L N E R A R I U M A C I D U M.

*Aqua vulneraria.*

R. Acidi acetici partes sex,  
Alcoholis diluti partes tres,  
Acidi sulphurici diluti partem,  
Mellis despumati partes duas.  
Misce, et cola, si opus.

Us. Vulneribus recentibus, ulceribusque asthenicis multum puris fundentibus, aptum.

### GARGARISMA ALUMINOSUM.

R. Supersulphatis Aluminae et Potassae drachmam  
ad sesquidrachmam,  
Decocturæ Hordei d: vel  
Infusi florum Sambuci nig. vel  
..... foliorum Salviae bilibram,  
Acidi sulphurici diluti guttas triginta,  
Mellis flavi unciam, vel  
Sacchari puri semunciam.

Us. Ulcera atonica faucium, et gurgulionis; angina ulcerosa, aut gangrænosa, maligna dicta, præcipue cum scarlatina juncta; item et gingivarum, et uvulæ laxitate etc.

### GARGARISMA AMMONIATUM.

R. Decocti Hordei d. vel  
..... radicis Althæae off. libram,  
Subcarbonatis Ammoniae, vel  
Ammoniae liquidæ drachmam ad duas, vel  
Alcoholis ammoniati semunciam.

Us. Tonsillitis (initio morbi), odontalgia, otalgia rheumatica, paralysis linguæ.

NB. Si majus stimulans requiritur, loco decocti Hordei adhibetur quidem Aqua aromatica, vel infusum Synapis nigræ.

## GARGARISMA ANTISEPTICUM.

Alcohol dilutum hacce intentione utiliter adhibetur.

vel

R. Decocturæ Quercus R. aluminosæ libram,  
Acidi acetici impuri,  
Tincturæ Gummi-resinæ Myrrhæ,  
utriusque unciam. Misce.

Interdum loco Acidi acetici impuri adduntur guttæ quindecim acidi sulphurici, vel muriatici.

GARGARISMA COMMUNE PER SE,  
VEL CUM SYNAPI.

R. Decocti Hordei d. vel  
..... Althææ off: vel  
Aquæ fontanæ libram,  
Acidi acetici impuri uncias duas,  
Mellis flavi unciam.

Cui interdum additur seminum Synapeos nigræ pulveratorum semuncia.

GARGARISMA  
MURIATIS AMMONIÆ.

R. Muriatis Ammoniacæ drachmam ad duas,  
Infusi specierum aromaticarum, vel  
..... florum Arnicæ m. vel  
..... M. Chamomillæ, vel  
Decocturæ Hordei d. libram,  
Oxymellis simplicis unciam. Misce.

U s. Salivam movendo, brevī tonsillitidem propulsat.

## GARGARISMA MURIATIS HYDRARGYRI OXYDATI.

R. Muriatis Hydrargyri oxydati grana quatuor ,  
 Muriatis Ammoniae drachmam ,  
 Decocti Hordei d. vel  
 . . . . . radicis Althaeae off. libram ,  
 Mellis flavi unciam Misce.

Us. Ulcera faucium internarum syphilitica, phagedænica.

## GARGARISMA SUB-BORATIS SODÆ.

R. Subboratis Sodae semunciam ,  
 Solve in aquae fontanae libra, et adde :  
 Mellis flavi semunciam.

Interdum huicce gargarismati additur alcoholis impuri uncia, vel sescuncia,

Us. Ptyalismus, aphthæ, etc.

## G A Z A.

FLUIDA, ELASTICA, AEREA.

GAZ ACIDUM CARBONICUM. *Aër fixus; mephiticus*; Mofetta quorundam.

Acidum carbonicum calore junctum.

Us. Ad aquas minerales acidulas, acidulo alcalinas, et acidulo-ferrugineas parandas; item ad alcalia, hoc acido saturanda.

Videsis : *Aquam mineralem acidulam.*

GAZ AZOTICUM. *Nitrogenium.*

Azotum principio calorico junctum.

GAZ AZOTICUM OXYGENATUM.

Igni, in vase vitreo, Nitratem ammoniæ (ex Ammonia acido Nitrico saturata constantem) exponendo, obtinetur.

V. Exhilarans, systematis muscularis actionem incitans.

Us. Inspirando: asthenia muscularis, paralysis.

GAZ HYDROGENIUM. *Äër inflammabilis; Gaz inflammabile.* Hydrogenium principio calorico junctum.

GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM.

Gaz hydrogenium portionem Carbonici continens. Instillando aquam in arduentes carbones vase clauso in apto adparatu, WATTII.

Us. Cautus inspiratione; hæmoptysis, tabes pulmonalis ulcerosa, catarrhus, tussis, etc. Incaute, et diutius inspiratum, apoplexiam, et præcox fatum inducit.

GAZ HYDROGENIUM SULPHURATUM. *Äër hepaticus.*

Videsis: *aquam mineralem sulphuratam.*

GAZ OXYGENIUM.

Oxygenium principio calorico nuptum.

R. Oxydi Manganesii nigri quantum lubet.

Igni in vitrea retorta, exponito, ut quidquid humoris aërisque atmospherici eidem inest, abigatur; dein collum retortæ cum capaci excipulo, vel camera plumbo obducta, luto junge, atque ignem, ut incandescat massa, gradatim auge. Aër atmosphericus e camera ope antliæ pneumaticæ subtrahatur, vel initio operationis, per aliquod tempus, aëri exitus concilietur.

Us. Gaz pulmonibus inflatum asphyxiæ suspensorum, submersorum, atque vapore carbonum, etc. vita adparenter privatorum opitulatur. In asthmate quoque, et morbis atonicis, præconia tulit.

Athmosphera, hujus gazis partibus 27, et gazis azotici 73 constat.

## H A U S T U S

### ACIDUM CARBONICUM EVOLVENS.

Vulgo, *Haustus salinus effervescens*.

- R. Subcarbonatis potassae scrupulos duos, vel  
Subcarbonatis ammoniæ scrupulum,  
Aquæ fontanae uncias duas. Misce.
- R. Succi Citri medicæ recentis unciam, vel  
Acidi acetici impuri tantundem,  
Syrupi simplicis,  
Aquæ fontanae utriusque semunciam. Misce.





HAUSTUS GUAJACINUS.

R. Gummi-resinac Guajaci off grana quindecim  
ad drachnam dimidiam,  
Gummi Mimosae niloticae drachnam,  
Sacchari puri scrupulum  
Tere simul. et paulatim affunde:  
Aquae Menthae piperitae sescunciam.

Interdum adduntur:

Subcarbonatis Ammoniac grana quinque ad quindccim,  
vel

Camphorae grana quinque, vel

Tincturae Opii guttae viginti, separatim, vel con-  
iunctim.

## HAUSTUS OPIATO-STIBIATUS

R. Haustum opiatum,  
Vini Tartratis Stibii et Potassae, guttas trigiuta,  
Misce.

V. Sudifica.

HAUSTUS OPIATUS.

R. Tincturae Opii guttas viginti quinque,  
Aquae fontanae unciam,  
Syrupi simplicis drachmas duas. Misc.

## HAUSTUS SAPONACEUS.

R. Olei Oleae Europae, vel  
 . . . . Sesami orientalis sescunciam,  
 Aquae Menthae piperitae unciam,  
 Tincturae aromaticae drachmam,  
 Ammoniac liquidae guttas viginti. Misce.

Us. Catarrhus alvus adstricta; vermes, lithiasis; trismus neonatorum.

## HAUSTUS TEREBINTHINATUS.

R. Balsami Pini Laricis in vitello ovi soluti, scrupulum ad semidrachmam  
 Aquae Menthae piperitae, vel  
 Mucilaginis gummi Mimosae niloticæ unciam,  
 Tinctinae aromaticæ.  
 Syrupi simplicis, utriusque sesquidrachmam.  
 Misce.

Us. Blennorrhœa; morbi hydropici, pituitosi.

## HYDRARGYRUM PURIFICATUM.

Hydrargyrum vulgo venale, usibus medicis minus idoneum; medicamentarii enim negociatores turpilucricupidi, depravant illud, augendique ponderis gratia, sæpe plumbo, quandoque etiam Stanno, et Bismutho inquinant, quæ, utpote viliora metalla hydrargyrus solvit, et in se, immutata fluiditate sua, recipit. Ut ab hacce incongruorum additamentorum labe liberetur, destillatio opus est, quæ sic instituitur:

R. Hydrargyri quantum velis.

E ferrea cucurbita ad medietatem hocce metallo repleta, tuboque ferreo verticaliter erecto, dein recurvato prædita, atque cum vitreo recipiente capaciore, ad dimidium frigida aqua repleto, sic junc-

tum, ut orificium colli superficiei aquæ immersum sit, fiat destillatio ex arenæ balneo.

Us. Pro compositionibus variis, atque præparatis, videsis: *Mur. hydr. oxydat.* — *Mur. hydr. oxydulatum.* — *Nitrat. hydr. liquid.* — *Oxynitr. hydr. et ammon.* — *Pil. suboxydi hydrarg.* — *Ung. nitrat. hydrarg.* — *Ung. suboxydi hydrargyri.*

## HYDRO-SULPHURETUM POTASSÆ.

*Kali sulphuratum Ph. Bor. Hepar Sulphuris.*

Сѣрная печенка.

R. Subcarbonatis Potassae,

Sulphuris sublimati, utriusque pares portiones.

Contrita simul, amplo loricato crucibulo immittantur, atque adaptato operculo, et prunis cautim subditis, denique liquefiant. Crucibulo, simulac refrixerit, fracto, hydrosulphuretum ablatum, in phiala probe obturanda, reponito.

Us. Ptyalismus, et alii morbi ex Hydrargyro; rheumatalgia; psora; herpes; tineæ; phthisis, etc. per se, vel in aqua solutum, item ad aquas minerales sulphureas arte parandas, et ad parandum sulphur præcipitatum.

Dos. Grana decem, viginti, triginta, sæpius de die.

## INFUSUM DIGITALIS PURPUREÆ.

R. Foliorum siccatorum Digitalis purpureae semunciam,  
Aquae fervidae uncias viginti.

Infunde vase clauso, refrigeratum cola; cui non alienum erit adjicere:

Tincturae aromaticae unciam.

Colaturæ cochlear majus æqualem vim pulveris foliorum grano, prodit, bis, vel ter per diem adultis dando.

## INFUSUM EXTRACTI MIMOSÆ CATECHU.

R. Extracti M. Catechu, drachmas duas cum semisse,  
Pulveris corticis Lauri Cassiae semidrachmam,  
Aquae bullientis uncias septem.

Infundantur extractum, et cortex cum aqua in vase clauso, per horas duas, et liquori colato, adde: syrupi simplicis unciam.

Dos. Uncia, tertia quaque hora.

## INFUSUM EXTRACTI M. CATECHU CUM OPIO.

R. Infusi extracti M. Catechu uncias octo,  
Tincturae Opii drachmas duas. Misce.

Cui interdum additur:

Tincturae aromaticae uncia, vel  
Mucilaginis gummi Mimosae niloticæ  
unciae duæ.

V. Adstringens, sedans.

Us. Diarrhœa; lenteria; dysenteria;  
sanguifluxus intestinorum.

Dos. Semuncia, tertia quaque hora, illico, ut factum est, ne præcipitetur opium, præbeatur, vel ante singula præbia conquassetur phiala.

## I N F U S U M FLORUM ARNICÆ MONTANÆ.

R. Florum Arnicae m. sesquidrachmam,  
Aquæ ferventis libram.

Infunde per horam, et c. la.

Dos. Unciæ duæ ad quatuor, ter in die.—  
Inservit etiam GARGARISMATI MURIATIS  
AMMONIÆ.

## I N F U S U M FLORUM M. CHAMOMILLÆ CUM SUBCARBONATE POTASSÆ.

R. Infusi florum M. Chamomillæ  
sesquilibram,  
Subcarbonatis Potassæ depurati drachmam.  
Misce.

V. Peptica, antacida, leniter diuretica.  
Dos. Selibra ad libram.

## I N F U S U M FOLIORUM CASSIÆ SENNÆ.

R. Foliorum C. Sennæ sesquunciam,  
Seminum A. Foeniculi, vel  
..... P. Anisi contusorum semunciam,  
Supertartratis Potassæ drachmas duas,  
Aquæ fontalis libram.

Supertartratem Potassæ in aqua coquendo, liquorem adhuc ferventem Sennæ, et seminibus affunde.

V. Cathartica.

Dos. Unciæ duæ, tres, pro prima dosi; dein vero, quavis hora unciatim, donec alvus semel, bis, terve ducta fuerit.

## INFUSUM LINI USITATISSIMI.

R. Seminum Lini usitatissimi uncias duas,  
Radice Glycyrrhizæ glabræ semunciam,  
Aquæ ferventis libras quatuor.

Infunde ad focum per horas tres, et cola.

Cui interdum additur:

*Succus citri medicæ, vel Roob-baccarum V. Oxycocci, vel Oxymel simplex, vel Saccharum purum, ad gratam aciditatem, dulcedinemque.*

Us. Dysuria, catarrhus, pneumonia, blennorrhœa, ischuria incipiens. Nephritidi, splenitidi, hysteritidi, auxillio est; ceteris vero phlegmasiis, ut cystitidi etc. liquida talis modi, tantum abest, ut mol-

limentum præsent, ut potius onere suo, et malum irritent, et conflictanti periculum facessant.

## INFUSUM NICOTIANÆ TABACI.

R. Foliorum Nicotianæ. T. drachmas duas,  
Aquæ ferventis uncias quatuor.

Infunde in vase clauso in balneo aquoso per horas sex, infuso expresso adde:

Alcoholis unciam.

V. et Us. Videsis: Nicotiana T.

Dos. Guttæ viginti ad drachmam, dosin sensim sensimque augendo.

Nicotiana T., protracto usu, ventriculo insidias struit, succum gastricum vitiat, orexim minuit etc.

vel

R. Foliorum siccatorum Nicotianæ T. unciam,  
Vini albi hispani libram.

Macera per septimanam, et per chartam cola.

V. Eadem, ut præcedentis; præstantior tamen.

Dos. Semidrachma ad sesquidrachmam e quovis potu conveniente.

## INFUSUM QUASSIÆ EXCELSÆ.

R. Ligni Quassiae excelsae rasi drachmas duas,  
Aquae fontanae ebullientis libram.

Infunde per horas duas, et cola.

Dos. Unciæ duæ vacuo stomacho.

## I N F U S U M

## RADICIS A. SERPENTARIÆ.

R. Radicis A: Serpentariae semunciam,  
Infunde aquae bullientis libram.

Stent per semihoram in vase clauso, et cola.

INFUSUM RADICIS GENTIANÆ  
LUTEÆ COMPOSITUM.

R. Radicis Gentianae luteae semunciam,  
Fructus Citri aurantii immaturi,  
Radicis A: Zingiberis, utriusque drachmam,  
Alcoholis diluti uncias quatuor,  
Aquae libram.

Affunde primum Alcohol, dein post tres horas aquam, tum digere leni calore per horas duodecim, et cola.

Dos. Unciæ duæ, bis terve de die.



## INFUSUM RADICIS RHEI PALMATI ALCOHOLISATUM.

R. Radicis Rhei palmati pulveratae sescunciam  
Subcarbonatis Potassae sesquidrachmam,  
Aquae communis fervidae libram.

Maceratis in vase clauso per duodecim  
horas admisceto colaturæ unciam de-  
cem expressæ :

Alcoholis diluti unciam.

Serva usui.

Dos. A drachma ad semunciam, et ul-  
tra bis de die.

## INFUSUM RADICIS VALERIANÆ SYLVESTRIS.

R. Radicis Valerianae sylv. incisæ unciam,  
Infunde aquae bullientis libram.

Stent per horam in vase clauso, et cola.

Interdum adduntur :

*Aetheris sulphurici alcoholisati drachmae duae,*  
*vel Tincturae aromaticae, vel*  
*Tincturae A. Calami semuncia.*

Dos. Unciæ duæ, plus vel minus, pro  
re nata.

Eodem modo parantur:

INFUSUM A. ABSYNTII. INFUSUM BACCA-  
RUM JUNIPERI COMMUNIS. INFUSUM C:  
ARMORACIAE. INFUSUM FLORUM M. CHA-

MOMILLAE. INFUSUM FLORUM SAMBUCI  
 NIGRAE. INFUSUM HERBAE SALVIAE OFF.  
 INFUSUM HERBAE MENTHAE CRISPAE. IN-  
 FUSUM RADICIS ANGELICAE A. INFUSUM  
 RADICIS A. CALAMI. INFUSUM SUMMITA-  
 TUM JUNIPERI SABINAE. INFUSUM SEMI-  
 NUM SINAPEOS.

### INFUSUM SPECIERUM AROMATI- CARUM PRO FOMENTO.

R. Specierum aromaticarum uncias quatuor,  
 Aquae ferventis libras quatuor.

Macera per horam, dein vase clauso per  
 aliquot minuta coque, et cola.

Interdum recte addes singulis aquæ  
 libris,

*Muriatis Ammoniae drachmam,*  
*Acidi acetici impuri uncias duas, vel*  
*Alcoholis diluti selibram.*

Coctæ herbæ Usus, vide sub *cataplas-  
 mate discutiente.*

### LIMATURA FERRI PURIFICATA.

Очищенные железные опилки.

Imposito limaturæ cribro, adinoveatur  
 Magnes, ut trans cribrum limatura sur-  
 sum adtrahatur.

V. Us. et Dos. videsis: Ferrum selectum.

PRAEP. *Rubigo ferri praep.* — *Tinct. Mur. ferri alcohol.* — *Sulphas ferri.*

## LINIMENTUM ACETATIS CUPRI.

*Mel cupratum. Acetas Cupri mellitus. Oxy-mel aeruginis. Unguentum aegyptiacum.*

R. Acetatis Cupri unciam,  
Mellis despumati, libram.

In mortario vitreo terendo misceantur.

Us. Vel adhibetur per se, aut dilutum aqua, vel etiam, si ita visum fuerit, excipitur unguento resinoso, et tum ulceribus scrofulosis, aliisve refractariolis, imo etiam syphiliticis, palati, fauciumque admovetur, magna cura cavendo, ne devoretur.

## LINIMENTUM ACIDUM, VEL MURIATICUM.

R. Mellis despumati unciam,  
Acidi muriatici concentrati guttulas viginti.  
Misce.

Us. Ulceribus faucium putrescentibus, scarlatinæ anginosæ, vel atonicæ, penicillo admotum, et id genus aliis, prodest.

## LINIMENTUM ALBUMINIS OVI.

R. Albuminis ovi recentis,  
 Alcoholis, vel  
 ..... diluti camphorati, vel  
 Balsami Myroxili Peruiferi pares portiones.

Conquassando misce.

Us. Excoriationibus a decubitu, et id genus aliis, adminiculatur.

## LINIMENTUM AMMONIATUM.

*Linimentum volatile.*

R. Olei Oleae Europaeae, vel alijs congrui partes  
 tres,  
 Ammoniae liquidae partem. Misce.

V. Excitans.

Us. Rheumatalgiae, doloribus spasticis, vel aliis, (ab inflammatione internarum partium) stipatae, anginae, etc. conducit.

LINIMENTUM AMMONIATO-TERE-  
BINTHINATUM.

R. Olei Oleae Europaeae partes quatuor,  
 .... destillati Pini Laricis,  
 Aquae fontanae,  
 Ammoniae liquidae, singulorum partem. Misce.

V. Egregie stimulans.

Us. Paralysi, rheumatalgiae, myodyniae, arthrodyniae, doloribus spasmodicis, idoneum.

Interdum additur praecedenti miscelae:

*Solutionis Saponis aequa portio, et  
Tincturae Lyttæ vesicatoriae, partes duae.—*

## LINIMENTUM CALCAREUM.

*Linimentum aquae calcis.*

R. Olei Lini usitatissimi recentis,  
Aquae Calcis, utriusque pares portiones.  
Misce conquassando.

Us. Excoriationibus, adustis etc. conducibile.

## LINIMENTUM CAMPHORATO-AMMONIATUM.

R. Camphorae, (ope Alcoholis in pulverem redactae) partes sex,  
Adipis Suis Scrofae praeparatae, partes duodecim,  
Ammoniae liquidæ partem. Misce.

V. Excitans; antiseptica.

Us. In nevroblacia, ut in paralysi, impotentia virili, ulceribus atonicis, scorbuticis, phagedænicis, pernione, et id genus aliis, debilitatem indicantibus, in eo auxilium est.

## LINIMENTUM RESINOSO-TEREBINTHINATUM.

R. Unguenti resinosi,  
Olei destillati Pini Laricis,  
utriusque partes aequales.

Oleum paulatim misce cum unguento liquefacto.

V. Excitans, antiseptica.

Us. Ulceribus putrescentibus, gangræno-  
sis, et quæ cacoëthe vocant, auxiliatur.

## LINIMENTUM SIMPLEX.

### *Ceratum.*

R. Olei Oleae europeae, vel alterius congrui, par-  
tes quatuor,  
Cerae flavae partem,  
Colliquefiant in linimentum.

## LINIMENTUM SULPHURICO TEREBINTHINATUM.

R. Olei destillati Pini Laricis uncias duas,  
.... Oleae europeae uncias quinque,  
Acidi sulphurici sesquidrachmam. Misceantur.

Us. Contusura, distorsio, adusta, ery-  
thema ex morsiunculis insectorum, ecchy-  
moma, præcipue perniones.

Rejecto Acido sulphurico, ad ventrem  
fricandum, bis die, hydropisis; ischuria.

## LINIMENTUM SUPER ACETATIS PLUMBI COMPOSITUM.

R. Unguenti Acetatis Plumbi,  
Solutionis Muriatis Hydrargyri oxydati et Am-  
moniae, utriusque pares portiones.

Probe misceantur.

Us. Herpes, ichtyotosis, psoriasis, tinea  
et id genus alia.

## M A G N E S I A.

*Magnesia pura Ph. Ross.*

Магнезія пересажена.

R. Subcarbonatis Magnesiae quantum lubet.

In crucibulo tecto igne fortiori per horam urito, quod superest, vasis vitreis, probe obturatis, usui servetur.

V. Antacida, absorbens.

Us. Pyrosis, et morbi ex acido primarium viarum, alvus coacta ex eadem causa.

Dos. A granis decem, ad drachmam.

## M E L D E S P U M A T U M.

Mel in balneo aquoso liqua, et spuma ablata, serva.

## M E L

## D E S P U M A T U M I N S P I S S A T U M.

R. Mellis crudi quantum vis,  
Aquae communis quantum satis.

Coquatur, et despumetur, ut colatura facta fiat massa homogenea ad extracti consistentiam.

Misturis, decocturis, infusionibus additur.

PRÆP. *Lin. acetat. Cupri cryst.* — *Lin. acidum.* — *Oxymel simplex.* — *Oxymel scillinum.*

## MISTURA CAMPHORE.

Fit eodem modo, quo acetum ejusdem; hac tamen sub distinctione, quod loco Acidi acetici diluti impuri adhibeatur aqua quælibet aromatica, vel mucilago gummi Mimosæ niloticæ; non est tamen ita conservabilis mistura, ut acetum camphoratum.

## MISTURA CARBONATIS CALCIS COMPOSITA.

R. Carbonatis Calcis præparati,  
 Gummi mimosæ niloticæ pulverati,  
 Sacchari puri, singulorum drachmas duas.

Tere simul, dein sensim adde:

Vini C. Ipecacuanhæ sesquidrachmam,  
 Tincturæ Opii drachmam,  
 ..... aromaticæ sescunciam,  
 Aquæ fontanæ, vel  
 Menthae crispæ, uncias octo. Misce.

V. Antacida, peptica, adstringens.

Us. Cardialgia, diarrhœa, dysenteria.

Dos. Uncia ad duas, ter de die pro re nata.





*Subcarbonatis Ammoniae*, vel *Subcarbonatis Potassae grana duodecim*, vel *Tincturae Opii camphoratae semidrachma ad duas drachmas*.

Si gummi-resinae F. Ammon drachmæ duæ in aquæ fontanæ, vel aquæ Menthæ crispæ, vel aquæ A. Foeniculi, unciis septem sunt solutæ, Lac ejusdem, sic dictum, habebis.

# MISTURA VEL SOLUTIO GUMMI-RESINÆ F. ASÆ FOETIDÆ.

R. Gummi resinae F. Asæ foetidae drachmas duas,  
Solve in Aquæ fontanæ vel  
..... Menthæ crispæ, vel  
..... A Foeniculi unciis octo.

V. Stimulans, antispasmodica, pituitam, et catamenia sollicitans, anthelminthica.

Us. Pertussis, dyspepsia, amenorrhœa, chlorosis, dyspnœa, hysteria, tympanitis, vermes.

Dos. Uncia, vel duæ, bis, terve de die.

Si misturæ supra dictæ addas:

*Acetatis ammoniae liquidi uncias quatuor*,  
*Tincturae Digitalis purpureae*,

..... *Aromaticae utriusque semunciam*,  
egregiam miscelam, asthmati, hydropisi, phthisi pituitosæ, hæmoptysi adcommo-  
dam obtinebis; attestante Excellentissimo  
ROGERS, magni nominis clinico.

# MISTURA GUMMI-RESINÆ MYRRHÆ FERRATA.

R. Pulveris gummi resinae Myrrhae drachmam,  
Carbonatis Ferri praecipitati semidrachmam,  
Syrupi A. Zingiberis semunciam:

simul tere, et adde:

Aquae Menthae piperitae selibram,  
Tincturae Ciuchonae compositae semunciam.  
Misce.

V. Stimulans, tonica, peptica.

U. Cachexia, phthisis, cacochymia.

Dos. Sescuncia, bis terve de die.

Vices superioris supplet.

R. Tincturae Muriatis ferri uncias duas,  
..... aromaticae semunciam. Misce.

Dos. Drachma ter de die, ex vasculo  
infusi M. Chamomillae.

# MISTURA NITRATIS POTASSÆ.

*Mistura nitrosa.*

R. Nitratis Potassae drachmam,  
Aquae Menthae piperitae, vel  
..... fontinalis uncias tres,  
solve, et adde:  
Acidi acetici impuri sescunciam.

Dos. Uncia, tertia, vel quarta quavis hora.

Interdum singulis dosibus adduntur:

*Tincturae Opii guttae quinque*, ad quintam,  
vel sextam vicem, intercapedine nychthe-  
meri.

## MISTURA SCILLINÆ.

R. Aquæ Menthae piperitæ uncias quatuor,  
 Syrupi scillae maritimæ, vel  
 Oxymellis ejusdem, uncias duas. Misce.

Cui interdum additur:

Tincturae Opii camphoratae uncia.

Dos. Semuncia ad unciam quater de die.

MISTURA  
SUB-CARBONATIS MAGNESIÆ.

R. Subcarbonatis Magnesiae drachmam,  
 Aquæ fontanae vel  
 . . . . . Menthae crispæ selibram,  
 Tincturae aromaticæ drachmas duas,  
 Ammoniae liquidæ drachmam.

Us. Cardialgia.

Dos. Uncia ad duas, pro re nata, vel  
 sumto cibo, si cardialgia urget.

MISTURA  
SUB CARBONATIS POTASSÆ.

*Olum Mistura Riverii.*

R. Subcarbonatis Potassae drachmam,  
 Succus fructus Cîri medicæ, vel  
 Acidi acetici impuri sescunciam.

Peracta effervescentia adde:

Âquæ Menthae piperitæ uncias quatuor.

Dos. Cochlear, secunda quaque hora.

## MURIAS BARYTÆ.

*Baryta muriatica* Ph. Edinb. *Terra ponderosa*  
*muriatica* Bergmanni.

Земля тяжелопыпная.

R. Sulphatis Barytae bilibram,  
Carbonis ligni in pulverem triti uncias quatuor.

Sulphas torreatur igne, quo facilius in pulverem tenuissimum teri queat, cui pulvis carbonis admiscendus. Materia dein crucibulo immittatur, atque operculo adaptato, fortiori igne, per sex horas, urgeatur. Materia probe trita, immittatur aquæ bullientis libris sex in vitreo vase, vel figulino, et permisceatur agitatione, aëris aditu, quantum fieri potest, occluso.

Vas in balneo vaporis stet, donec pars non soluta subsederit; dein liquor effundatur. Adfundantur illi denuo aquæ bullientis libræ quatuor, quæ post agitationem, ac subsidentiam, liquori priori addantur. Liquori adhuc calido, vel si frigerit iterum calefacto, instilletur acidum muriaticum donec moverit effervescentiam; dein coletur, ac vaporet, ut crystalli formentur.

V. Valde, citra calorem stimulans, sudorem, lotium movens, anthelminthica.

Us. Scrofula, malaque e scrufuloso habitu orta HURLAND. Iis tamen qui mobili nervorum systemate præditi sunt, alienus. In scirrho quoque, glandularum mesarai-  
carum infarctu, et atrophia ex eadem causa, uti etiam adversus tubercula pulmonum, asthma, herpetem, tineam, vermes, laudatur.

Dos. Videsis: Solutionem Muriatis barytæ.

## MURIAS CALCIS OXYGENATUS.

*Calcaria muriatica* Ph. Bor. *Calx muriatica*  
*Bergmanni. Sal ammoniacus fixus.*

R. Calcis quantum lubet,  
Acidi muriatici concentrati, quantum sufficit ad  
perfectam solutionem. Filtra si vis, et ad siccitatem evapora.

V. Deobstruens, lotium ciens.

Us. Scrofula, aliive lymphæ morbi.

Dos. Semidrachma ad drachmam in libra aquæ quotidie — vel videsis: Solutionem Muriatis calcis.

PRAEP. *Aq. marin. artefact.* — *Vapor. Muriat. Calc. Oxygenati.*

M U R I A S  
HYDRARGYRI OXYDATUS.

*Murias Hydrargyri Ph. Edin. Mercurius corrosivus sublimatus. Сyлеma.*

R. Hydrargyri purificati bilibram,  
Acidi sulphurici tantundem cum semisse,  
Muriatis Sodæ exsiccati libras quatuor.

Hydrargyrum cum sulphurico acido in vitreo vase super arenam coquatur, donec materia fuerit sicca. Hanc frigefactam, vitreo vase cum Muriate Sodæ commisce-to, dein sublimato in vitræa cucurbita, igne gradatim auctiori; tandem sublimata materia a scoriis separanda est.

Q U A L. Venenata, corrosiva.

V. Caustica, validissime resolvens, antizymica, sialagoga, antisiphilitica.

U s. In lue venerea inveterata, morbisque cutaneis, mercurialibus ceteris merito præfertur. Abortis interdum sub usu ejusdem doloribus colicis, alvi profluviis, ardore, spasmiisque ventriculi, commode succurritur adjecto volatili stimulo, aromaticis aquis, si præsto sunt, cortice Lauri Cassiæ, Citri Aurantii, Opio, et Camphora.

Quum hoc remedium vi nimis corrosiva polleat, magna cura cavendum est,

ne, loco quæsitæ salutis æger præcipitur. Noxa præpostero tali consilio illata, celebratissimum, aptissimumque huic veneno antidotum est subcarbonas Potassæ in aqua solutus, adjecto clivi pauxillo, Hydro-sulphuretum Potassæ, vel Sodæ, cortex Cinchonæ off., et Quercus R. aquæ incoctus, sapo, et generatim demulcentes potiones, decocta demulcentia, emulsiones, lac etc. juvant. Scire quoque licet hujus remedii usum imbecillis hominibus, sensibilibus, phthisiscentibus, hæmoptoicis, aut hæmorrhagiis, scorbuto, rachitidi, atrophix, marasmo senili obnoxiiis, alienum esse.

Dos. Sub forma pulveris nunquam præscribitur; aptissime vero per pilularum modum cum mica panis, vel melius cum radice Althææ off., Amylo, gummi Mimosæ niloticæ, vel Syrupo, aut extracto quovislibet. Melle quoque pro conficiendis pilulis apte excipitur, addito quovis ad easdem involvendas pulvere; solvitur etiam in aqua destillata, aut alcohole diluto servata hac proportione, ut quodlibet granum ad minimum duas vehiculi uncias habeat, solutioque, vel saccharo, vel



Melleedulcoretur, vel mucilaginem gummi Mimosæ niloticæ temperetur. Hujus solutionis cochlear, vel duo, bis in diem propinantur. *Extrinsecus*: Solutio per modum lotionis, vel injectionis, vel gargarizationis adhibetur, quo in casu in primis sub initium apta est solutio facta grano Muriatis Hydrargyri oxydati pro aquæ, vel alterius vehiculi selibra, cui uncia mucilaginis gummi Mimosæ niloticæ, recte additur.

In curatione scabiei refractariolæ, fortiori, pro re nata solutioni Murias Ammoniacæ utiliter adjungitur. Frictiones, sub unguenti forma esse admovendas, CYRILLUS, magni nominis vir, est auctor. Unguentum quod ad eum refertur, habet drachmam Muriatis Hydrargyri oxydati, cum adipis Suis Scrofæ uncia per duodecim horas jugiter contritam; admovetur frictio sub planta pedum ejusdem suasu, dimidio drachmæ, qualibet vice insumto; ast melius erit idem præstari in interiori femorum, crurum, brachiorumque parte.

PRAEP. *Murias hydrargyri oxydulatus prae-  
paratus.* — *Clyst. aloëticus.* — *Garg. mur. hydr.  
oxydati.* — *Sol. mur. hydr. oxydati.* — *Sol. mur.*

*hydr. oxydati corrodens.* — *Sol mur. hydr. oxyd.*  
*et ammon.* — *Ung. Tartr. Stibii et Potassae.*

## MURIAS HYDRARGYRI OXYDULATUS PRÆPARATUS.

*Sub-Murias Hydrargyri Ph. Edin. Calomelas,*  
*Hydrargyrus muriatus mitis. Ph. Lond. Hy-*  
*drargyrum muriaticum mite Ph. B. Mercurius*  
*dulcis Ph. R. Ртуть сладкая.*

R. Muriatis Hydrargyri oxydati partes quatuor.

In mortario vitreo, aut lapideo cautim  
 tere, alcoholis aliquot guttulas interdum  
 adspergendo; dein adde:

Hydrargyri depurati partes tres.

Misce terendo, donec globuli hydrargy-  
 ri perfecte disparuerint, dein pulvis in  
 cucurbitam vitream oblongam, cujus ter-  
 tiam duntaxat partem impleat, inditus,  
 ex arena sublimetur calida.

Massa sublimata teratur, et denuo sub-  
 limetur, tandem in pulverem tenuissimum  
 redigenda, aqua destillata fervente lavan-  
 dum, et pro usu medico siccandum.

V. Resolvens, sialagoga, anthelminthi-  
 ca, antisyphilitica, cathartica.

Us. Febres intermittentes refractariolæ,  
 in primis quartanæ in connubio oxydi

stibii hydrosulphurati, SELLE, vel oxydi stibii præparati, LENTIN, aut Valerianæ, Cinchonæ officinalis. Typhus auctiori irritabilitate; sed impotentia reagendi REIL, vel diathesi inflammatoria STOLL, VOGEL, stipatus. Febres inflammatoriæ malignæ, HAMILTON, MURRAY, LIND CLARKE, aliique Britanni, quorum vestigiis HILDEBRANDT, REIL, SCHRAUD etc. non dubitarunt insistere. Encephalitis idiopathica, VOGEL. Haud neglectis detractationibus sanguinis, fomentis etc. Ophthalmia rheumatica, scrofulosa, syphilitica, WARNER, RICHTER. Angina, et in primis membranacea, auctoritate præsertim Britannorum, et Americanorum medicorum. RUYSCH eandem pro specifico habet refragantibus aliis; Scarlatina, MICHAËLIS, RUYSCH, BAILEY, Pneumonia, HAMILTON. Hepatitis, CLARKE, MURRAY, LIND, CHISHOLM, CRAWFORD, SAUNDERS, MACLEAN. Metritis, HAMILTON. Variolæ, LETTSOM, INGENHOUS, HUF-LAND, REIL, DIMSDALE. Rheumatalgia chronica, SIMS, FOTHERGILL, CULLEN. Dysenteria, PAISLY, WILSON, PRINGLE, BOAG, CLEGHORN. Helminthiasis, RUSH,

ANDRY etc. Icterus a hepatemphraxi, febris americana flava, RUSH, CLARKE etc. in primis CHISHOLM; syphilis, scrofulæ LETTSOM, HUFLAND, ROWLEY, FOTHERGILL etc. chronica exanthemata, carcinoma, præsertim scrofulosæ indolis, BIERCHER, GATACKER; hydropsis et in primis hydrocephalus, DOBSON, PERCIVAL, WITHERING. Hydrophobia, WERLHOFF. Trismus, MONRO. Ischuria spasmodica, PERCIVAL, GILCHRIST; pro antidoto plumbi habetur a CLUTTERBUCK.

*Extrinsecus* quoque, forma pulveris, ulceribus syphiliticis apte admovetur. — Admota gingivis leni frictione etc., et internæ superficiei oris in syphilitide, aut ulceribus scrofulosis, vel venereis labrorum nasique, adjecto quantum opus, melle. — Oculo inflatus pulvis, corneæ maculas tollere fertur. Denique ad suffimenta, linimenta, unguenta, præsertim in psora, herpetibus, lue venerea, tinea. In cretinismo (morbo inter juga montium helveticorum endemio) cum primis in con nubio Oxydi stibii hydrosulphurati, non ineptus.

Dos. Sub diversis *interne* præscribitur formis, opportunior ceteris est pilularum, aut bolorum, cum extracto, aut conserva. Quum in pulvere datur, recte conjungitur cum saccharo, pulvere Glycyrrhiæ glabræ, Magnesia, vel pro re nata Opio, Camphora, salivationis averruncandæ causa, vel Cinchona, oxydo stibii hydrosulphurato, vel ubi alvum medicamento sollicitare expedit, catharticis aut radice C. Jalapæ etc.

Pueris, ut catharticum, et anthelminthicum a grano ad sex, habita ætatis ratione; adultis, a quinque ad quindecimi pro una vice, communius aliis conjungitur, at, præsertim catharticis; ut anti-venereum ab  $\frac{1}{4}$  ad tria grana, debilibus vero, et pueris ab  $\frac{1}{8}$  incipiendo, dosin pro re nata augendo.

PRÆP. *Pil. cathartico-diureticae.* — *Pil. mur. hydr. oxydul. et camph.* — *Pil. mur. hydr. oxydul. et oxyd. stib. hydrosulphurati.* — *Pil. Scillin. et mur. hydr. oxydulat.* — *Pulv. C. Jalap. et mur. hydr. oxydul.* — *Pulv. Rhei et mur. hydr. oxydul.*

## MURIAS MAGNESIÆ.

R. Subcarbonatis Magnesiae quantum vis,  
Acidi muriatici concentrati quantum satis ad  
plenam saturationem.

Filtra, et ad siccitatem evaporet, vasis-  
que bene clausis, ne deliquescat, ser-  
vetur.

PRÆP. *Aqua marina artefacta.*

## MURIAS POTASSÆ OXYGENATUS.

R. Subcarbonatis Potassae quantum vis,  
Acidi muriatici oxygenati quantum satis ad per-  
fectam saturationem.

Solutio filtretur, et ad punctum crystal-  
lisationis, lenissimo calore vaporet, in  
loco frigido, ut in crystallos coëat se-  
ponenda, quæ dein vasis rite obturandis  
servandæ sunt.

V. Oxygenans, systema arteriosum in-  
citans.

Us. Morbi asthenici, malus corporis ha-  
bitus, scorbutus, morbi cutis: ut psora,  
herpes etc. syphilis, hepatemphraxis etc.

Dos. A granis quindecim ad semidrach-  
mam de die.

PRÆP. *Solutio ejusdem.—Potio oxygenata.*

## NITRAS ARGENTI FUSUS.

*Lapis infernalis* Ph. Ross. Сереброселитря-  
ный прижигательный камень.

R. Argenti purissimi in laminas extensi. et con-  
scissi uncias quatuor,  
Acidi nitrici uncias octo,  
Aquae destillatae uncias quatuor.

Argentum solvatur in phiala leni calore, solutio vaporet ad siccitatem. Dein massa capaciore crucibulo commissa, super ignem ponatur, quo sensim sensimque auctiori, ad instar olei fluat, in ferreas calentesque fistulas, sebo inunctas effundenda, atque vasis probe clausis condenda.

V. Acris, corrodens, antiepileptica.

Us. Per se: hypersarcosis, ulcera callosa, fungosa, indolentes atonicique tumores; naevi materni. Si aqua diluatur, forma gargarizationis, vel injectionis recte admovetur, praesertim ulceribus oris, et faucium ex hydrargyro, cynanché putrescenti ulcerosæ, caute adhibitus fistulis; imo in blennorrhœa quoque asthenica valens. — *Interne* etiam adhibetur in epilepsia, helminthiasi; angina pectoris i. e. syncope anginosa, in qua postrema, nec fonticuli internis femoribus aptandi, neglectui habeantur.

Dos. Drachma in aquæ destillatæ libra, soluta, in lacrymali fistula, aliisque ulceribus fistulosis, forma injectionis, adhiberi potest; — dosis in genere grani unius ad quinquaginta aquæ grana. Dum interné datur, nonnisi ab octava grani parte initium fiat, gradatim, cauteque ad granum ascendendo, idque in forma pilularum cum mica panis, ter de die.

CL. WILSON grana duo cum semisse, non dubitavit administrare. Citra ullum incommodum, si levem excipias nauseam, medicina ab ægris sumta est.

PRÆP. *Pil. Nitr. Arg. fusi* — *Solutio Nitr. Arg. fusi.*

## N I T R A S

### HYDRARGYRI LIQUIDUS.

R. Hydrargyri purificati quantum vis,  
Acidi nitrici quantum satis, ut Hydrargyrus solvatur.

Us. Præparata, ut *Oxyd. hydrarg. rubrum per acid. nitricum.*



## N I T R A S P O T A S S Æ.

*Kali nitratum* Ph. Lond. *Kali nitricum* Ph. B.

*Nitrum depuratum* Ph. Ross. — Очищен-  
ная селитра.

R. Nitri vulgo venalis quantum velis, dissolve in sextuplo aquae, filtra, et evapora, donec guttae frigido lapidi inspersae, coagulentur. Dein vero, loco temperato, ut crystalli formentur reponito. Residuus liquor paulisper evaporet, itidem in crystallos cogendus. Haec operatio repetatur eoque, donec purae, prismaticaeque nitratis potassae crystalli deponantur.

V. Debilitans, sedativo-refrigerans, lotium, alvumque subinde movens.

Us. Febres sthenicae, in primis inflammatoriae, pleuritis, cum sero lactis, positionibus mucilaginosi, emulsione amygdalina. Gastritidi, nephritidi, enteritidi, hepatitidi, vomitionibus stipatis, ob sensibilitatem affectarum partium, vix, ac ne vix quidem convenit.

Exanthematicis inflammatoriis, caute adhibitus, est opportunum remedium. Adversus rheumatalgiam (SELLE, BROCKLESBY) utilis esse creditur. — Febribus catarrhalibus, sthenicis, in congruorum conubio non est alienus, MONETA. Activis hæmorrhagiis, sanguinis orgasmum inhibendo, occurrit, DICKSON; adversus eas-

dem pro specifico habuit DICKINSON. Scorbuto utilem esse BEDDOËS, PATTERSON, opinatur.

*Extrinsecus*: per modum fomenti, gargarizationis, clysteris, admovetur; præsertim in aptis solutus vehiculis: Fomento, acetum cum muriate sodæ, vel murias ammoniæ in vulneribus capitis; clysteri murias sodæ, acetum, oxymel, etc. gargarismo, mel rosaceum, murias ammoniæ etc. recte adjicitur.

Dos. *Interne*: grana decem ad scrupulum. Sæpius in aqua solutus, decoctione, aut aliqua mistura, et aliquando in pulvere, et haud raro cum aliis remediorum adminiculis. — Haud dubitarunt quidam semunciam, imo unciam ejusdem pro dosi præscribere; ast hæc exempla non sunt digna imitatione; experiundo enim didicimus, dosi nimia digestionis opus turbari, cardialgiam, oppressionem pectoris, vomitiones, alvi profluvia, convulsiones, suboriri. Eadem incommoda ex nitrate potassæ, aut longiori tempore suscepto, aut debilibus administrato oriri posse quidam scite observarunt.

PRÆP. *Acid. nitrico-nitros.* — *Mist. Ni-*

*trat. potass.*—*Pulv. ejusd. comp.*—*Sol. acid. nitr. vaporif.* — *Sol. acid. arsenicos. et nitrat. potass.*—*Succus V. Oxycocc. c. nitr. potass.*

## OLEA DESTILLATA.

Olim. *Olea volatilia, vel Stillatitia, vel Essentialia.*

HERBAE MENTHAE PIPERITAE FLORENTIS, HERBAE JUNIPERI SABINAE, SEMINUM P. ANISI, BACCARUM JUNIPERI COMMUNIS, FRUCTUS MYRTI PIMENTAE.

Eadem fiunt ratione, ut stillatitiæ aquæ; hic tamen aqua parcius adjecta.

Semina atque lignosa, in primis contundi, radique oportebit. Oleum elicetur cum aqua, ac pro ratione levitatis, vel gravitatis suæ, aut prout superficiei hujus innatarit, aut fundum petierit, dein separandum.

PRAEP. *Elaeosacchara.*

# O L E U M

## DESTILLATUM SUCCINI RECTIFICATUM, ET ACIDUM SUCCINICUM.

Янтарное масло.

R. Succini rudius contusi quantum lubet, fiat e vitrea retorta, ad quartam tantum partem repleta, destillatio calore primum leniori; dein vero successive auctiori. Cum oleo primum flavo, dein rubro prodibunt liquor acidulus, et acidum concretum, quibus aquae calidae, sufficiens quantitas ad acidum solvendum addatur. Liquor acidus ab oleo separandus evaporet leniter, dein filtretur, et ad crystallisandum reponatur. Crystalli depurentur solutione in calida aqua, solutione, et crystallisatione repetita. Oleum a liquore acidulo separatum, e vitrea retorta sextuplo addito aquae, distillet, donec duo trices aquae in excipulum transiverint. Tandem oleum hocce volatile ab aqua separatur, vasis probe clausis usui servandum.

V. Olei: stimulans, antispasmodica, menagoga.

Us. Malum hystericum, amenorrhœa, dysmenorrhœa, chlorosis; interdum extrinsecus in connubio linimentorum adversus paralyisin, rheumatalgiam commendatur.

PRAEP. *Resina Succini balsamica — Pil. Asae foetidae.*

OXY-CARBONAS  
ZINCI IMPURI PRÆPARATUS.

*Lapis calaminaris præparatus.*

Oxycarbonas Zinci impurus ab illis, qui Orychalco conficiendo operam navant, torrefactus, ut Carbonas Calcis præparatur.

PRÆP. *Ceratum Oxycarb. Zinci impuri præparati.*

OXYDUM  
FERRI NIGRUM PURIFICATUM.

*Ferri Squamæ purificatae.*

Ferri Oxydi nigri Squamæ, ad fabrorum incudes reperiundæ, Magnete admotopurificantur; Magnes enim squamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis crassioribus, minus puris.

V. Us. et Dos. eadem, ut Ferri.

PRÆP. *Tinct. mur. ferri alcoholisata.*

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM  
PER ACIDUM NITRICUM.

*Oxydum hydrargyri rubrum; Hydrargyrum oxydatum rubrum Ph. B. Mercurius præcipitatus ruber Ph. Ross. Ршуть красная осадочная.*

R. Nitratiss hydrargyri liquidi, quantum velis.

Coque in vitreo vase ad siccitatem.

Massam in pulverem tenuatam, calori moderato expone, continuo vitrea movendo spatula, usque dum fugato acido, colorem lacte rubrum, et splendentem, præ se tulerit.

Usibus tantum externis inservit, nec communius adhibetur, nisi sub unguenti forma. — Aptissimum est, quod ad TITTMANNUM refertur, ex drachma ejusdem, et insulsi butyri semuncia, adjecto, consistentiæ ergo, ceræ tantillo. Cum sufficienti quantitate adipis commistum, ulcera venerea efficaciter curat; escharoticum quoque in ulceribus supercrescentibus, callosis, aut fungosis non spernendum præbet in pulvere.

PRAEP. *Pulv. Supersulphat. Alum. et Potassae.*

## OXYDUM STIBII CUM SUB-PHOSPHATE CALCIS.

*Phosphas calcis stibiatus SWEDIAUR. Pulvis antimonialis Ph. Lond.*

R. Sulphureti stibii nigri præparati, in grossiusculum pulverem redacti,  
Cornu Cervi E. rasi, utriusque pares portiones.

Misce, atque ollæ ferreæ latæ injicito, ad rubedinem calefactæ, ac assiduo agita,

donec colore cinereo fuerint. Ubi materia refrigeraverit in pulverem teratur, ac lorricato immittatur crucibulo. Huic crucibulum aliud inversum, cui parvum sit foramen in fundo, conjunge luto, ignemque subministra, ad rubedinem sensim auctiorem, et ita auctum serva per duas horas; tandem frigefactam massam in subtilissimum pulverem tere.

#### V. Stimulans, sudifica.

Us. Febres ex perfrictione, asthenicæ (ad crisin in primis promovendam) typhus mitior, remittens, dysenteria subductis prius sordibus.

Dos. Grana quinque ad octo, semel, vel pro re nata etiam bis in die; major vero dosis, vel emesin, vel alvum ciet; persæpe in connubio Muriatis Hydrargyri oxydulati, et Camphoræ datur. Si paulum supertartratis potassæ adjectum fuerit, tum vis ejusdem, et cathartica, et vomica efficacius emicat; sudifica autem additione Subcarbonatis Ammoniae, Camphoræ, Opii. etc.

# OXYDUM STIBII HYDRO-SULPHU- RATUM PRÆCIPITATUM.

*Sulphur stibiatum aurantiacum Ph. Bor. Sulphur stibiatum rufum Ph. Dublin. Hydrosulphuretum oxydi Stibii aurantiacum. Sulphur auratum antimonii Ph. Ross. Сѣра желтосюрюмяная.*

R. Sulphureti stibii nigri præparati partes duas,  
Sulphuris sublimati partes tres,  
Solutionis potassae, quantum ad solvendum requiritur.

Mista in lebetе ferreo coque, continuo spathula movendo, ut fiat solutio perfecta; dein liquori aqua fervida diluto, et colato per chartam, instilla paulatim:

Acidi sulphurici diluti quantum ad præcipitandum sufficit;

caute tamen, ne nimia copia acidi admisceatur. Præcipitatum aqua tepefacta perfecte abluatur, calore lenissimo siccetur, atque in clauso vase usui servetur.

V. Resolvens, sudifica, diuretica, majori dosi, emetica.

Us. In chronicis cutaneis morbis, ut psora, herpetibus, tinea, plica polonica, scrofulosis tumoribus, (corpore nondum debilitato) in rheumaticis, arthriticis, itidem chronicis commendabatur. — In morbis pectoris chronicis, in asthmate pituitoso,



catarrho, in pneumonia notha, tussi catarrhali etc. præmissis antiphlogisticis, præsertim in connubio radicis Polygalæ Sene-gæ, Camphoræ, Opii, Sacchari, vel Glycyrrhizæ.

Dos. A  $\frac{1}{4}$  parte grani, ad integrum, duo, datur. Præsertim, cum Camphora, gummi Mimosæ niloticæ, oxymelle scillino, sapone, muriate ammoniæ, mercurialibus, gummi-resina Guajaci off. etc. In pilulis aptissime datur. In pulvere cum Magnesia, et saccharo. — Misturis vero solutionibusque non convenit.

PRÆP. *Pil. Guajac. comp.* — *Pil. Mur. hydr. oxydul. et Oxyd. stib. hydrosulph.*

## OXYDUM STIBII SULPHURATUM.

Сюрянное стекло. *Vitrum antimonii.*

Sulphuretum stibii nigrum præparatum, grosso modo, adinstar arenæ, pulveratum, super fictile vas non vitreatum, parum profundum, insterne, atque leni calore, ut sulphuretum Stibii gradatim calefieret, subdito; pulvis interea jugi motu, ne in grumos coëat, agitetur. Vapores albi, sulphur olentes, ex eo orti, ne deficient, igne auctiori sustinendi sunt, eousque, do-

nec pulvis, igne tandem rubescens, nil amplius exhalet. Pulvis denique hicce, commissus crucibulo, calore intensiori liquefiat, donec adinstar liquefacti vitri, fluxerit, super æneam calentem laminam effundendus.

Us. Ad præparata. Videsis: *Tartratem Stibii et Potassae*.

### OXYDUM ZINCI.

Цвѣтны шпіаушерныя. *Flores Zinci. Zincum calcinatum. Calx Zinci.*

Capacius crucibulum in furno prunis calefacto, ponatur sic, ut hujus ostium versus, parum inclinet, et quum fundus illius candefieri coeperit, portiuncula Zinci drachmam circiter pendens, injiciatur. Simulac Zincum, quod brevi fit, accensum fuerit, atque in albos floccos, mutatum, subinde a metalli superficie, ut combustio ejus absolvatur perfectius, ferrea spatula retrahendos; Oxydum Zinci cessante flamma, e crucibulo auferatur. Dein alia Zinci portio projiciatur, et operatio repetatur toties, quoties opus fuerit, tandem Oxydum Zinci, ut Subcarbonas Calcis, præparatur.

V. Tonica, antispasmodica.

Us. Epilepsia, morbique consimiles.

Dos. A grano ad octo; extus cum duplo Adipis Suis Scrofæ præparatæ commistum, trichiasi, et excoriationibus papillarum mammæ non ineptum.

PRÆP. *Ung. ophthalm. cuprat* — *Ung. oxynitr. hydr. et ammon.*

### OXYMEL SCILLINUM.

R. Aceti scillitis partem,  
Mellis optimi, partes duas. Misce, et serva.

Dos. A drachmis duabus, ad semunciam.

PRÆP. *Mist. F. ammon. comp.* — *Mist. scillina.*

### OXYMEL SIMPLEX.

R. Acidi acetici impuri,  
Mellis optimi, utriusque pares portiones.

Misce, et in vase figulino, vel vitreo, leni igne ad syrupi crassitudinem decoque.

Interne perraro solum præscribitur, sæpius misturis additum, vel potionibus a semuncia ad duas uncias. Aqua dilutum, gargarizationi, et antiphlogisticis collutoriis servit; imo cum congrua acetatis cupri portione commistum, loco unguenti vulgo ægyptiaci dicti, adhibetur utiliter.

plumaceolis exceptum, videsis: Mel cupratum.

# OXY-NITRAS HYDRARGYRI ET AMMONIÆ.

*Hydrargyrum oxydulatum nigrum Ph. Bor.*

*Oxydum hydrargyri nigrum. Mercurius solubilis Hahnemanni Ph. Ross. Ртуть черноосадочная.*

R. Hydrargyri depurati, quantum volueris.

Solve in sufficiente quantitate acidi nitrici (Aquæ fort. Ph. Ross.) lente, et successive. Phiala, in qua solutio perficitur, vasi amplo, aqua fluviali frigida, repleto, imponatur, et processus frigidiori semper loco, peragatur.

Hydrargyro soluto, crystallisque destillata aqua ablutis, iisque deinde solutis, et filtratis adde guttatin sæpius agitando:

Ammoniae liquidæ quantitatem sufficientem ad hydrargyrum penitus ex acido præcipitandum.

Pulvis dein, fervefacta aqua, repetitis lavetur vicibus, atque sine omni calore exsiccetur.

V. Antisymphilitica, muriati oxydulato hydrargyri subpar; tardius tamen, ut quidam observant, salivam movens.

Us. Morbi syphilitici, cutaneique contagiosi, aliique adversus quos murias hydrargyri oxydulatus adhibetur. Sub usu remedii hujus, ea quæ esui potuique dantur, insulsa esse oportere, HAHNEMANNUS, ad quem hoc remedium refertur, contendit. — Poma ante usum remedii esse, ejusdem auctoris suasu, alienum est; infirmando enim ventriculum, vomitiones cient, alvumque resolvunt. Simulac æger utens hoc remedio, febrit, inalgescentibus extremis membrorum partibus, quatiente spinam frigido horrore, tumentibus gingivis, indicium est, salivatione instante usu medicinæ supersedendum esse, vel pauxillum Hydro-sulphureti potassæ, vel sodæ, in dilutioribus acidis propinandum.

Dos.  $\frac{1}{4}$  vel  $\frac{1}{2}$  grani, singulis viginti quatuor horis, repetenda, augendo sensim sensimque ad duo, vel tria grana, si nullus salivationis metus subest. Opium aromaticaque recte adjiciuntur.

*Extrinsecus*: per modum unguenti, frictionis, herpetibus, psoræ, etc. admoveatur, imo adversus varia oculorum vale-

tudinis genera idoneum esse perhibetur medicamen.

PRAEP. *Empl. ejusdem.* — *Oxynitr. hydr. et ammon. mellitus.* — *Pil. oxynitr. hydr. et ammon.* — *Unguent. ejusdem.* — *Idem comp.* — *Ung. Tartrat. stibii et potassae.*

### OXY-NITRAS HYDRARGYRI ET AMMONIÆ MELLITUS.

R. Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae drachmas  
duas,  
Mellis flavi unciam, terendo misce.

Ulceribus syphiliticis faucium internarum,  
penicilli ope admotus, utilis.

### PILULÆ ALLII SATIVI.

R. Radicis Allii sativi,  
Saponis oleosi, utriusque semunciam,  
Pulveris Glycyrrhizae gl. quantum satis sit,

ut fiat massa, e cujus singulis drachmis  
formentur catapotia duodecim.

Dos. Scrupulum ad duo massæ.

### PILULÆ ALOES ET ASÆ FOETIDÆ.

R. Gummi-resinae Aloës perfoliatae,  
..... F. Asae foetidae,  
Saponis oleosi, singulorum paria pondera.

Cum mucilagine gummi Mimosæ niloticæ  
subigantur in massam.

Us. imbecillo ventriculo, dyspepsiæ, inflationi, compressæ alvo etc. adcommodæ.

Dos. Grana decem ad scrupulum bis de die.

### PILULÆ ALOES ET STALAGMITIDIS CAMBOGIOIDIS.

R. Massae pilularum aloëticarum debitæ spissitudinis partes tres,  
Gummi-resinae Stalagmitidis Cambogioidis partem. Misce.

Dos. Grana quinque.

### PILULÆ ALOETICÆ.

R. Gummi-resinae Aloës perfoliatae in pulverem subtilissimum tritæ,  
Saponis oleosi, utriusque partes portiones.  
Subige cum syrupo simplici, vel Mucilagine gummi Mimosæ niloticæ, ut fiat massa ad catapotia formanda apta.

Dos. Grana quinque ad scrupulum hora decubitus.

Interdum additur Myrrhæ tertia pars, et in alvo suppressa cum dolore, sesquigranum ad tria succi Hyosciami nigri inspissati, singulis dosibus, egregie prodest.

# P I L U L Æ

## A S E F O E T I D Æ C O M P O S I T Æ.

### *Pilulae gummi-resinosae.*

R. Gummi-resinae F. Asae foetidae ,  
 ..... Myrrhae , vel  
 ..... B. Galbani singulorum  
 partes octo ,  
 Olei empyreumatici succini partem.  
 Subige in massam cum syrupo simplici.

V. Antispasmodica , emmenagoga.

Dos. Grana decem ad scrupulos duos ,  
 hora decubitus, vel sæpius.

## P I L U L Æ S U B - C A R B O N A T I S S O D Æ.

R. Subcarbonatis sodae exsiccatae semunciam ,  
 Saponis oleosi drachmas tres ,  
 Syrupi Zingiberis , vel  
 ..... simplicis q. s. ut fiat massa in pi-  
 lulas pond. granorum quinque dividenda.

Us. Lithiasis.

Dos. Duæ - tres - quatuor, ter de die.

## P I L U L Æ C A T H A R T I C O - D I U R E T I C Æ.

R. Pulveris scillae maritimae grana sex ,  
 ..... C. Jalapae grana decem ,  
 Muriatis Hydrargyri oxydulati grana quatuor ,  
 Pulveris aromatici grana sex.

Cum syrupo Zingiberis fiant pilulae qua-  
 tuor granorum , una vice noctibus alter-  
 nis, propinandæ, et pulvis supertartratis  
 Potassæ et Stalagmitidis Cambogioidis  
 quovis solutus idoneo liquido, mane inse-  
 quenti exhibendus.



Granum Opii subinde additum, non erit alienum.

### PILULÆ DIGITALIS PURPUREÆ.

R. Pulveris foliorum Digitalis purpureae  
scrupulum

Gummi-resinae F Asae foetidae, (Alcoholis  
diluti ope ad aptam crassitudinem redactae,   
vel

Roob baccarum Juniperi communis, vel  
Extracti amari quantum satis ut fiat massa in  
pilulas viginti aequales dividenda.

Dos. Pilula, bis terve in die.

### PILULÆ GUAJACINÆ COMPOSITÆ.

R. Gummi-resinae Guajaci partes quatuor,  
Camphorae partes duas,  
Succi inspissati Aconiti neomont.  
Oxydi Stibii hydrosulphurati praecipitati,  
utriusque partem.

Alcoholis, si opus, quantum satis, ut fiant  
pilulae granorum quatuor pondere.

Dos. Pilulae duae.

### PILULÆ HUMULI LUPULI.

R. Pulveris conorum Humuli L. scrupulos duos,  
Micae panis et syrupi, vel  
Mucilaginis gummi Mimosae niloticae quantum  
satis, ut fiat massa in pilulas triginta aequa-  
les dividenda.

V. Opii vices explet.

Dos. Pilulae binæ, vel ternæ, noctu,  
dormituro propinentur.

PILULÆ MURIATIS HYDRARGYRI OXYDATI.

R. Muriatis Hydrargyri oxydati,  
 ..... Ammoniae utriusque grana decem,  
 Aquae destillatae drachmam,  
 Pulveris radices Glycyrrhizae gl., vel  
 Amyli scrupulos octo,  
 Mellis drachmam.

Cogantur in massam, in octaginta pilulas  
æquales dividendam.

Dos. Duæ ad quatuor bis terve de die. Sumto singulo pilularum præbio, mucilaginoso potui danda, vis Muriatis Hydrargyri oxydati, corrosivæ, obtundendæ ergo. Interdum adde massæ superius indicatæ. Opii scrupulum, et Tartratis Stibii et Potassæ grana octo, et tum doloribus osteocopis lenimen impertitur, in cutim vim medicamentosam exserendo.

PILULÆ MURIATIS HYDRARGYRI  
OXYDULATI ET CAMPHORÆ.

R. Muriatis Hydrargyri oxydulati praeparati  
grana sex,  
Camphorae grana viginti quatuor,  
Mucilaginis gummi Mimosae niloticae, quan-  
tum satis, ut fiat massa in pilulas duodecim  
aequales dividenda.

Dos. Pilula, duæ.

Quandoque duodecim Opii grana, aut

succi spissati Aconiti neom. tantumdem, aut extracti Conii m. grana octodecim, vel extracti Hyosciami nig. tantumdem praecedenti massae, pro rei necessitate addi possunt, et tunc duae, tresve pilulae sumuntur.

Præter effectus Camphoræ, Hydrargyri etc: privos, eosque multis modis, inque variis morbis, salutare, in trismo etiam dolorifico, attestantibus luculentis scriptoribus, laude sua non fraudantur.

PILULÆ MURIATIS HYDRARGYRI  
OXYDULATI ET OXYDI STIBII  
HYDRO-SULPHURATI.

*Pilulae Plumeri.*

R. Muriatis Hydrargyri oxydulati præparati,  
Oxydi stibii Hydrosulphurati præcipitati,  
utriusque partes tres,  
Extracti Gentianae lut., vel  
..... amari,  
Saponis oleosi, utriusque partem.

Duobus primis ingredientibus, simul tritis, adde extractum, saponem, et syrupi simplicis sufficientem quantitatem, si opus, ut fiat massa.

Dos. Grana quinque, ad decem.

## PILULÆ MURIATIS HYDRARGYRI OXYDULATI STIBIATÆ.

R. Tartratis Stibii et Potassae grana quindecim,  
Miniatæ Hydrargyri oxydulati præparati,  
Camphoræ (ope aliquot guttarum Alcoholis in  
pulverem redactæ) utriusque drachmam,  
Opium puri semidrachmam  
Mucilaginis gummi Mimosaæ niloticæ, quan-  
tum sufficit ut fiat massa, in pilulas sexa-  
ginta æquales, dividenda.

Us. Rheumatalgia, dolores ossium sy-  
philitici.

Dos. Pilulæ duæ, bis die.

## P I L U L Æ NITRATIS ARGENTI FUSI.

R. Nitratis argenti fusi grana quinque,  
Extracti Glycyrrhizæ gl. scrupulum,  
Misce, fiant pilulæ viginti æquales.

Pilularum dosis ab una incipiendo, sen-  
sim sensimque quotidie augetur ad sex  
usque, vel donec nausea fuerit mota.

Us. Epilepsia, etc.

## PILULÆ OXY-NITRATIS HYDRAR- GYRI ET AMMONIÆ.

R. Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniaæ  
drachmam,  
Extracti Glycyrrhizæ gl., vel  
Mellis quantum sufficit ut rite conterendo  
fiant pilulæ centum viginti conspergendæ,  
Lauri Cassiæ corticis pulvere.

Interdum recte additur, Opii eadem quantitas, quæ Oxynitratis est.

Subinde loco Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniaë, recte sumitur Acetas, Muri-  
as Hydrargyri oxydulatus, Phosphas, aut  
Tartras Hydrargyri, et tunc dosis diminu-  
enda est.

Us. Syphilis.

Dos. Pilulæ duæ, bis die.

### PILULÆ PICEÆ.

R. Olei empyreumatici Pini sylvestris quantum vis,  
Pulveris radicis Glycyrrhizæ gl. quantum suf-  
ficit, ut fiat massa in pilulas granorum quin-  
que dividenda.

V. Sudifica, diuretica, antiseptica.

Us. Scorbutus, morbi cutanei, tinea,  
herpes, psora, etc.

Dos. Pilulæ quatuor, sex, bis terve de  
die, superbibendo decocturam specierum  
Guajaci compositarum.

### PILULÆ RHEI PALMATI.

R. Pulveris radicis Rhei palmati semunciam,  
Gummi-resinae Aloës p. drachmas tres,  
..... Myrrhae drachmas duas,  
Olei destillati Menthae C. guttas quindecim.  
Cum Syrupo Zingiberis subige in massam.

Us. Dyspepsia, inflatio, alvus contracta.

Dos. Massæ grana quindecim ad viginti quinque, et amplius, bis de die, superbibendo aquam tepidam, vel infusum M. Chamomillæ.

### PILULÆ SCILLINÆ.

R. Radicis Scillae maritimæ siccatae, et in pulverein subtilem tenuatae,  
 Gummi-resinae F. Ammon depuratae, vel  
 ..... F. Asae foetidæ,  
 Pulveris aromatici, vel  
 ..... radicis A. Zingiberis, vel  
 ..... seminum A. Cardamomi,  
 Saponis olcosi, singulorum, pares portiones,  
 Excipe Tincturae aromaticæ, vel  
 ..... Gummi resinae Guajaci volatilis, vel  
 Syrupi simplicis, sufficiente quantitate, et in  
 massam justæ crassitudinis subigito.

### V. Diuretica.

Us. Morbi pulmonum asthenici, pituita stipati, hydrops.

Dos. A granis massæ decem, ad scrupulum bis, terve de die.

### PILULÆ SCILLINÆ ET MURIATIS HYDRARGYRI OXYDULATI.

R. Muriatis Hydrargyri oxydulati præparati partem,  
 Pulveris Scillae m. partes duas,  
 ..... aromatici partes tres,  
 Syrupi simplicis quantum satis.  
 Subige in massam.

Us. Ut, et præcedentis. Insuper hypochondriasis, præsertim addito Aloës et Saponis pauxillo.

Dos. Grana sex ter de die, vel a decem granis ad quindecim noctu dormituris, et pulverem Supertartratis Potassæ, et Stalagmitidis Cambogioidis mane insequenti, addito interdum Opii grano, præberi expedit.

## P I L U L Æ SUB-OXYDI HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri unciam,  
Balsami Pini Laricis semidrachmam.

Conterito donec globuli Hydrargyri disparuerint, addendo gradatim mucilaginem gummi Mimosæ niloticæ, si opus fuerit. Tandem cum sufficiente quantitate pulveris radice Glycyrrhizæ gl., vel Amyli, formentur pilulæ octaginta æquales.

Dos. Pilula, vel duæ, mane, et vesperi.

## P I L U L Æ S U B - S U L P H A T I S C U - P R I E T A M M O N I Æ.

R. Subsulphatis Cupri et Ammoniaë  
grana sedecim,  
Micæ panis scrupulos quatuor,  
Subcarbonatis Ammoniaë liquidi, quantum satissit, ut fiat massa in pilulas triginta duas æquales dividenda.

vel

R. Subsulphatis Cupri et Ammoniae  
grana sedecim,

Succi spissati Hyosciami, vel

..... Conii maculati, vel

..... Aconiti neom. drachmam,

Pulveris radice Valerianae off. quantum satis,  
ut fiat massa in pilulas triginta duas aequales  
dividenda.

Cujus, subinde, singulis dosibus addan-  
tur, Oxydi Zinci grana duo.

V. Tonica.

Us. Epilepsia.

Dos. Pilula, bis terve de die, sensim  
augendo dosin.

## P O T A S S A.

*Kali purum* Ph. Lond. *Kali causticum siccum*

Ph. Bor. *Alcali vegetabile causticum* Ph. Du-

blin. *Alcali causticum* Ph. Ross. Ыдкій по-

пашь.

R. Aquae, vel solutionis Potassae (Lixivii causti-  
ci Ph. Ross.) quantum velis.

Tamdiu in ferreo vase vaporet, donec in-  
stillata frigido lapidi guttula indurescat.  
Tum sal indatur crucibulo, eique calor  
admoveatur, usque dum forma olei flu-  
xerit, quod illico in canalem ferreum ca-  
lentem, olivo illitum effundatur, qui an-



serinae pennae magnitudinem habet. Denique in apta frustula secatur in vitro bene clauso servanda.

V. Corrodens, vesicans.

Us. Extus admota callosos supercre-scentium ulcerum margines exest; injecta autem, urinæ itineri, multa aqua diluta, confestim, illato stupro, blennorrhœam averruncat, FORDICE, non neglecta, glandis, ope ejusdem solutionis, ablutione. Vulnera a canibus rabidis inflicta, et ictum viperarum sanat.

Ad parandum Alcohol fortius inservit.

## POTASSA LIQUIDA.

Щелокъ Ѳдкопоташный. *Lixivium causticum Ph. Ross. Aqua Potassae. Solutio Potassae.*

R. Subcarbonatis Potassae libras duas,

Vasi ferreo inditis affunde:

Aquae communis fervidae decuplum, tum successive adde: Calcis pulveratae libras tres

Coque per quadrantem horae spathula movendo.

Si liquor cum acido quocunque commistus, nullam producit effervescentiam, calx addatur. Calo per linteum.

Liquor vitreis lagenis obturatis infusus, ubi subsederit, effundatur, atque evaporet, donec ejus unciae quatuor vas com-

pleverunt, quod capax foret unciarum trium aquæ simplicis. In lagenis vitreis probe clausis servetur.

V. Summe rodens.

Us. Ad parandas alias medicinas, et labores pharmaceuticos instituendos.

*Extus*: si paulum ejusdem aqua diluitur nodos podagricos, medicari, ut et morsui viperæ, et canis rabidi, opitulari fertur.

Ad parandum Ætherem sulphuricum, Saponem quoque sebaceum, inservit.

## POTUS ACIDUS MINERALIS.

R. Decocturæ Furfuris, vel  
 ..... Hordei d. vel  
 Aquæ panis biscocci bilibram,  
 Acidi sulphurici diluti drachmam,  
 Mellis despumati semunciam, vel  
 Syrupi simplicis, vel  
 Roob baccarum V. Oxycocci, unciam.

Us. Synocha, synochus miliaris, varicella, et alii sthenici morbi; sub initio pemphigus etc.

## POTUS ACIDUS VEGETABILIS.

R. Decocturæ Furfuris, vel  
 ..... Hordei d. vel  
 Aquæ panis biscocci, bilibram,  
 Supertartratis Potassæ scrupulos quatuor,  
 Syrupi simplicis, vel  
 Roob baccarum V. Oxycocci unciam, vel  
 Mellis despumati semunciam.

Us. Idem, ut, et præcedentis. Huic tamen recte substituitur posca, Ruthenice квасъ dicta.

POTUS ÆTHERIS SULPHURICI  
ALCOHOLISATI.

R. Aetheris sulphurici alcoholisati drachmam,  
 Aquæ fontanæ, vel  
 Decocturæ Furfuris, vel  
 ..... Hordei d. bilibram,  
 Sacchari puri semunciam, vel  
 Mellis flavi unciam,  
 Frigide misceantur.

Us. Typhus, alique consimiles morbi.  
 NB. Quum haud raro, vires vitæ deficiunt, potio gentilitia збитень dicta, herbis aromaticis, et melle ex aqua decoctis, vel ex melle adjecto piperis tantillo, subinde cum alcohole diluto facta, non est respuenda. Vices cardiacæ aquæ etc. supplet, præsertim militibus majora facientibus itinera, quum in morbum incidunt adcommoda.

## PULPA MELIMELORUM.

*(Pomorum dulcium.)*

R. Melimelorum quantum vis.

Coque ex aqua, et transprime per filtrum.  
Pro cataplasmate ophthalmico.

## PULPA PRUNORUM.

R. Fructuum Pruni domesticæ, exemptis nucleis,  
quantum lubet.

In sufficiente quantitate aquæ ebulliant  
ad perfectam solutionem, quæ per seta-  
ceum trajecta, ad mellis crassitudinem  
evaporet, et addendo singulis libris, duas  
sacchari uncias, leni igne ulterius inspis-  
sando, fiat pulpa.

Dos. *Interne*: a semuncia ad duas unci-  
as, modo sola, modo cum alio medica-  
mine, soluta in aqua, sero, aut simili  
vehiculo, jam sub forma electuarii cum  
aliis ingredientibus catharticis, ut Super-  
tartrate Potassæ, Sulphate Magnesicæ, fo-  
liis Cassiæ Sennæ, radice C. Jalapæ etc.

Vices pulparum Cassiæ, et fructus Am-  
lycæ indicæ (tamarindorum) haud medio-  
cri œconomici emolumento supplet addito  
in primis, ut posteriori sit analogæ, su-  
pertartrate Potassæ, vel Acido tartarico,  
absque mistione sacchari.

## PULVIS ABSORBENS.

- B. Subcarbonatis calcis pulverati,  
 Farinae avenaceae, utriusque pares portiones.  
 Misce.

U. s. Extus erysipelati admovetur.

Erysipelati, erythemati, sub initium, plerumque debilitantia, conveniunt; procedenti vero tempore, simulac-metus typhi gravioris, vel gangrænæ subest, vel oppressionis encephali indicia, puta apathia, stupor etc. urgent; scire licet mala hæc jam retrograda, vesicantibus nuchæ admovendis, stimulantibus, aliisque revocanda esse.

## PULVIS AROMATICUS:

- R. Seminum A Cardamomi,  
 Radicis A. Zingiberis,  
 ..... A. Calami,  
 Piperis longi, vel  
 ..... nigri, singulorum partes aequales.

Tere simul in pulverem tenuissimum, in vase vitreo bene obturato servandum.

vel

- R. Pulveris corticis Lauri Cassiae,  
 Seminum A Cardamomi,  
 Radicis A. Zingiberis, singulorum pares portiones.

In pulverem subtilissimum tenua, in vase vitreo probe obturato servandum.

V. Stimulans, calefaciens, peptica.

Us. Dyspepsia, inflationes. Supervenientem scarlatinæ anginosæ, aliisque febribus asthenicis, alvi resolutionem, ægro discrimen minitantem, vino nuptus, cohibet.

Dos. A granis decem ad scrupulum, et amplius per se, vel in connubio aliorum.

PRAEP. *Dec. Cinchonae.* — *Pil. cathartico-diureticae.* — *Pil. scillinac.* — *Pil. scillinae et Mur. hydr. oxydulati.* — *Pulv. Junip. s. comp.* — *Pulv. sulphur. subl. comp.* — *Pulv. Supertartr. potass. et stalagm. Cambog.* — *Tinctura aromat.* — *Tinctura Gentianae comp.*

## PULVIS C. IPECACUANHÆ ET OPII.

*Pulvis Doveri.*

R. Pulveris radices C. Ipecacuanhæ,  
Opium, utriusque partem,  
Sulphatis Potassae partes octo.

Tenua in subtilissimum pulverem.

V. Excitans, sedans, eximie sudifica.

Us. Rheumatalgia, aliive morbi a perfrictione oriundi, dysenteria, diarrhœa, hydropisis etc.

Dos. A granis decem ad scrupulum.

Sumto remedio nil illico bibendum, ne vomitiones provocentur.

PRAEP. *Pulv. gummi-resinae Guajaci. comp.*

## PULVIS CARBONIS ACIDULUS.

R. Carbonis ligni scrupulum,  
 Acidi citrici concreti grana quinque.  
 M f. pulvis tenuissimus, ter de die, propinandus.

Us. Alvi dejectionibus fetidis, dysenteria declinante quandoque idoneus.

PULVIS C. JALAPÆ ET MURIATIS  
HYDRARGYRI OXYDULATI.

R. Pulveris radices C. Jalapae scrupulum,  
 Muriatis Hydrargyry oxydulati præparati  
 grana quinque.

Misce, fiat pulvis tenuissimus pro dosi e Syrupo, vel Melle sumendus mane.

Cui interdum adduntur gunmi-resinæ Stalagmitidis Cambogioidis grana duo ad sex.

V. Cathartica, anthelminthica, diuretica interdum.

Us. Alvus adstricta, hydrops, mania, vermes intestina occupantes.

PULVIS C. JALAPÆ ET SUPERTAR-  
TRATIS POTASSÆ, VEL SULPHA-  
TIS EJUSDEM.

*Pulvis purgans.*

R. Pulveris radices C. Jalapae,  
 Supertartratis Potassae vel  
 Sulphatis ejusdem utriusque pares portiones.

Misce fiat pulvis subtilissimus.

V. Cathartica.

Us. Alvo compressa.

Dos. Scrupulum ad semidrachmam.

Loco radices Jalapæ, Rheum palmatum substitui potest, tunc detur compositionis semidrachma ad drachmam.

## PULVIS CORTICIS QUERCUS R. ET ANTHEMIDIS NOBILIS.

R. Pulveris corticis Quercus R.,  
..... florum Anthemidis nobilis,  
utriusque scrupulum.

Misce, fiat pulvis subtilissimus, cui adde, si vis, pulveris corticis Lauri Cassiæ grana quinque, vel pulveris aromatici grana decem.

V. Adstringens, peptica.

Us. In febribus intermittentibus, ut succedaneus Cinchonæ officinali.

Dos. Scrupuli duo ad drachmam, secunda, vel tertia quaque hora, tempore apyrexias.



P U L V I S  
CORTICIS SALICIS COMPOSITUS.

Cinchonæ succedaneus.

R. Corticis Salicis uncias novem ,  
 . . . . . Quercus R. uncias duas ,  
 Radicis Gentianae luteae unciam. Misce.

Us. Vir. et Dos. eadem, ac Cinchonæ officinalis.

PULVIS GUMMI-RESINÆ GUAJACI  
ET SUB-CARBONATIS AMMONIÆ.

R. Gummi-resinae Guajaci off. semidrachmam ,  
 Subcarbonatis Ammoniae grana quinque.

Contere , ut fiat pulvis ex melle , vel syrupo simplici, dormituro noctu, porrigendus.

Us. Rheumatalgia atonica, arthrodynia, exanthemata asthenica retropulsa, etc.

PULVIS GUMMI-RESINÆ GUAJACI,  
ET TARTRATIS STIBII ET POTASSÆ.

R. Gummi-resinae Guajaci off. drachmam ,  
 Tartratis Stibii et Potassae granum ,  
 Supertartratis Potassae drachmas duas.  
 Misce, fiat pulvis subtilissimus.

V. Excitans, sudorem, et alvum movens.

Us. In rheumatalgia egregius.

Dos. A scrupulo ad semidrachmam, e syrupo simplici.

P U L V I S  
GUMMI-RESINÆ GUAJACI-OPIATUS.

R. Gummi - resinae Guajaci off. grana decem,  
Pulveris radice C. Ipecacuanhae et Opii,  
grana quinque. Misce.

Pro dosi ad semel propinanda.

V. et Us. ut praecedentis; praestantior  
tamen.

Huic interdum adduntur :

Camphoræ (ope aliquot guttarum alco-  
holis pulveratæ) grana quatuor,  
Sacchari grana decem.

P U L V I S  
JUNIPERI SABINÆ COMPOSITUS.

R. Pulveris foliorum Juniperi Sabinae,  
Carbonatis ferri praecipitati,  
Radice A. Zingiberis, vel  
Pulveris aromatici, singulorum partem.  
Misce, ut fiat pulvis.

Us. Hypochondriasis, amenorrhœa, dys-  
pepsia.

Dos. Semidrachma ad scrupulos duos,  
bis de die.

Interdum adduntur singulis dosibus gum-  
mi-resinæ Myrrhæ grana sex ad decem,  
vel Aloës perfoliatæ grana quinque, se-  
paratim, vel conjunctim.

# PULVIS NITRATIS POTASSÆ COMPOSITUS.

R. Nitratis Potassae,  
Sacchari albi utriusque semunciam,  
Gummi Mimosae niloticae unciam.  
Misce, fiat pulvis.

Dos. Drachma ad sesquidrachmam.

# PULVIS PRO SUFFIMENTO.

R. Gummi-resinae Amyris Kataf,  
Succini, utriusque partes tres,  
Florum Lavandulae spicae partem. Miscé.

Baccæ Juniperi communis super prunas  
ustæ, odorifera virtute, præcedenti suffi-  
mini, æquiparabiles.

# PULVIS RHEI PALMATI ET MURIA- TIS HYDRARGYRI OXYDULATI.

R. Pulveris radiceis Rhei p. scrupulum,  
Muriatis Hydrargyri oxydulati præparati  
grana sex.

Misce, fiat pulvis.

Pro dosi e melle, vel syrupo dandus, al-  
vo coacta, vel tribus vicibus, intervallo  
duarum, trium, quatuor, quinque horarum.

# PULVIS SULPHATIS FERRI ET GUMMI KINO.

*Pulvis stypticus.*

R. Sulphatis Ferri,  
Gummi-resinae Kino, vel  
Succi spissati Mimosae Catechu, utriusque  
pares portiones.

vel

R. Supersulphatis Aluminae et Potassae,  
 Gummi - resinae Kino partem,  
 Redigantur in pulverem tenuissimum.

V. Prioris, adstringens, tonica, vermifuga.

Us. *Interne*: hæmorrhagia, dyspepsia, verines.

Dos. Grana decem ad quindecim.

Uterque pulvis, *externe*: ad sistendum sanguifluxum minorum vasorum, ad curanda ulcera scorbutica, atonica, etc. adspargendo, idoneus.

PULVIS SULPHURIS SUBLIMATI COMPOSITUS.

R. Sulphuris sublimati,  
Supertartratis Potassae, utriusque partes duas,  
Pulv. rad. A. Zingiberis, vel  
..... aromatici, vel  
Elaeosacchari C. Carvi, vel  
..... A. Foeniculi, partem.

V. Leniter alvum sollicitans.

Us. Psora, morbi cutanei ceteri, pulmonum pituitosi, hæmorrhoids.

Dos. Drachma ad duas, e syrupo hora decubitus.

Quandoque Supertartras Potassæ omit-  
titur.

# PULVIS SUPERSULPHATIS ALUMINÆ ET POTASSÆ COMPOSITUS.

*Pulvis escharoticus.*

- R. Supersulphatis Aluminae et Potassae fusi,  
 Oxydi hydrargyri rubri per acidum nitricum,  
 Acetatis cupri, singulorum partem,  
 Foliorum Juniperi Sabinae, vel  
 Rhei palmati, vel  
 A. Calami, vel  
 Pulv. rad. Colombae partes duas, vel  
 Carbonis ligni tantundem.  
 Fiat pulvis perquam subtilis.

V. Excitans, adstringens, rodens.

Us. Ulcera supercrescentia, phagedæna, rhagades, verruca, psoriaris, et alii similes morbi.

# PULVIS SUPERTARTRATIS POTASSÆ ET DIGITALIS PURPUREÆ.

- R. Supertartratis Potassae scrupulum,  
 Pulveris foliorum Digitalis purpureae granum,  
 ..... radicis A. Zingiberis grana decem,  
 Misce, fiat pulvis perquam tenuis.

V. Sedans, diuretica, aliquando emetica, cathartica.

Us. Hydropisis, anasarca, hydrothorax.

Dos. A semidrachma sensim sensimque dosin augendo ad sesquidrachmam bis de die.

PULVIS SUPERTARTRATIS POTAS-  
SÆ ET STALAGMITIDIS  
CAMBOGIOIDIS.

R. Supertartratis Potassae semunciam,  
Gummi-resinae Stalagmitidis Cambogioidis  
grana duo,  
Pulveris aromatici grana decem, vel  
..... radicis A. Zingiberis scrupulum.

V. Cathartica, diuretica.

Us. Hydrops anasarca, ascites.

Dos. Semuncia ad unciam summo mane ex aquæ vasculo.

PULVIS VOMICUS.

In hunc finem exhibeatur, pulveris radicis C. Ipecacuanhæ scrupulus.

vel

R. Pulv. rad. C. Ipecacuanhae scrupulum,  
Tartratis Stibii et Potassae granum.

Misce, ut fiat pulvis, subtilissimus, pro dosi sumendus, superbibendo affatim tepidam aquam, vel infusum fl. M. Chamomillæ, simulac vomitiones fuerint provocatae.

## RESINA SUCCINI BALSAMICA.

Moscho succedanea.

R. Olei destillati Succini rectificati drachmam,  
Acidi nitrico-nitrosi drachmas tres cum semisse.

Acidum sensim sensimque oleo cautim instillando, oritur resina, odore Moschum; colore vero corticem fructus Citri aurantii æmulans, aqua dein ferventi eluenda.

Dos. Eadem, quæ Moschi, eademque fere pollet virtute.

## R O O B

## BACCARUM JUNIPERI COMMUNIS.

Кисель можжевельный.

R. Baccarum Juniperi com. recentium maturarum,  
et conquassatarum partes octo.

Ex sufficienti quantitate fontanalis aquæ, donec mollescant, decoque, tum paulum exprimantur per setaceum, succus hinc obtentus, cum parte una sacchari, leniori calore ad crassitudinem mellis redigendus.

V. Ut et baccarum Juniperi.

Dos. Ad uncias duas.

ПРЕП. *Pilulae Digitalis purpureae.*

## ROOB BACCARUM V. OXYCOCCI.

Кисель клюквенный.

R. Succī baccarum V. Охусосси  
 maturarum partes sex,  
 Sacchari albi partem.

Calore leni, sub jugi motu, ad aptam crassitudinem redige.

Dos. Ad unciam.

ПРАЕП. *Dec. antiscorbut.* — *Inf. Lini usitatiss.* — *Pot. acid. vegetab.* — *Pot. acid. mineral.*

## SAPO STIBIATUS.

*Sapo antimonialis.*

R. Oxydi Stibii hydrosulphurati unciam,  
 Digerendo in Potassae liquidæ sufficienti  
 quantitate, solvito:

In liquido, triplici aquæ destillatæ quantitate diluto, dissolve:

Saponis oleosi rasi selibram.

Leni calore ad crassitudinem massæ pilularis evaporent, addendo, si massa rubet, tantum Potassæ liquidæ, quantum satis est, ut colorem ex albido cinereum præ se ferat.





quum Nicotianam Tabacum subterdedisse  
juvat.

Scillæ, ejusque præparatis, nauseolæ,  
quam interne sumta movet, interdum aver-  
tendæ causa, congruum est additamen-  
tum, aroma quodpiam.

PRÆP. *Acet. scillit.* — *Dec. Polyg. amar.* —  
*Pil. scillin.* — *Pil. cathart. diureticae* — *Pil.*  
*scill. et Mur. hydrarg. oxydulati.* — *Tinct.*  
*scillae.* — *Vinum scillit.*

## SERUM LACTIS ACETOSUM.

R. Lactis vaccini recentis,  
Aquæ fontanae, utriusque libram,  
Mistis, et ebullientibus adde:  
Acidi acetici impuri unciam.  
Aufer coagulum.

Subinde aceto substitui possunt:

*Supertartratis Potassae drachmae duae, vel vi-*  
*ni albi aciduli selibra, vel*

pro re nata inter coquendum:

*Fructus Amlycae Indicae*, si præsto est sesc-  
uncia, vel succi antiscorbutici unciae duæ.

V. Acidula accepta, frigerans, alvum  
liquans.

Dos. A quatuor unciiis ad libram.

## SERUM LACTIS ALUMINOSUM.

R. Lactis vaccini recentis libram,  
Supersulphatis Aluminae et Potassae drachmam.

Coquito paulisper, et aufer coagulum.

Dos. Sescuncia, unciae duæ, bis terve  
de die.

## SERUM LACTIS SINAPINUM.

R. Semen Sinapis nigrae pulve-  
ratorum unciam.

Terendo successive affundito:

Lactis vaccini recentis libram.

Tandem addito: acidi acetici impuri, vel  
Vini Rhenani, si præsto est, quantum  
sufficit, ut fiat coquendo coagulum; dein  
cola.

Us. Rheumatalgia asthenica, nevrobla-  
cia, paralysis, morbi viscerum asthenici,  
pituïtosi.

Dos. Selibra omni nocte.

SOLUTIO ACETATIS CUPRI ET  
MURIATIS AMMONIÆ.

*Aqua sapphirina.*

R. Aquae Calcis recentis uncias octo,  
Muriatis Ammoniae scrupulos duos,  
Acetatis cupri grana quatuor.

Misce, et digere per viginti quatuor horas;  
dein per chartam cola.

Us. *Externus*: phagedæna, palpebræ ulceratæ. Aquæ duplici quantitate diluta, ophthalmia asthenica, maculæ corneæ. Plura lege in prima parte.

## SOLUTIO ACETATIS PLUMBI CRYSTALLISATI FORTIOR.

### *Aqua vegeto-mineralis.*

R. Acetatis Plumbi crystallisati scrupulum,  
Acidi acetici impuri, vel diluti drachmam,  
Aquæ destillatæ, vel fontanæ uncias quinque.  
Misce.

vel

R. Acetatis Plumbi liquidi scrupulos quatuor,  
Alcoholis diluti,  
Acidi acetici diluti, vel impuri,  
singulorum drachmam,  
Aquæ destillatæ, vel fontanæ libram. Misce,  
ut fiat A Q U A S U P E R - A C E T A T I S  
P L U M B I L I Q U I D I.

Si addas duplicem aquæ quantitatem, solutionem ejus dilutiorem habebis.

Us. Inflammationes, vi extrinsecus illata, motæ, adusta, contusiones, luxationes, fracturæ, morbi ocularii inflammatorii; vel linteis eadem humectis, vel cataplasmatibus parti affectæ superdatis, curantur.

P R A E P. *Cat. acetat. plumbi.*

## SOLUTIO ACETATIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci drachmam,  
Aquae destillatae uncias decem. Solve,

dein

R. Acetatis Plumbi crystallisati scrupulos  
quatuor,  
Aquae destillatae uncias decem. Solve.

Misceantur solutiones, quiescant paulisper; dein coletur liquor.

V. Adstringens, ut solutionis Sulphatis Zinci.

Us. Videsis: Sulphatem Zinci.

SOLUTIO ACIDI ARSENICOSI ET  
NITRATIS POTASSÆ.

R. Acidi Arsenicosi scrupulum,  
Nitratis Potassae scrupulos duos,  
Aquae fontalis uncias decem pondere.

Committito vitreæ lagenæ, subere, ut vapores evadere queant leviter occlusæ, quæ in ducentorum duodecim graduum calore thermometri Fahrenheitiani, vel octoginta Reaumuriani posita, aut suspensa in bulliente aqua, interdum lagena agitetur quoadusque Arsenicum perfecte fuerit solutum; dein per chartam colatis adde:

Tincturae A. Calami guttas ducentas, plus, vel minus, ut pondus solutionis decem unciarum, et drachmæ unius sit accuratum.

Us. In primis sordibus primarum viarum subductis, febribus intermittentibus, adcominodatissima; præterea in laude eidem ponitur, quod psoriasi, phthiriasi, elephantiasi, porrigini, impetigini, herpetibus, achoribus propulsandis sit par. Pertussi SIMMONS nuper, FOWLER; epilepsiæ vero alii opposuere.

Dos. Hujus solutionis guttæ viginti, sensim sensimque, idque cautissime, dosin ad quadraginta augendo guttas dentur.

Simulac, aut nausea, aut vomitus, qui perraro occurrunt, provocati fuerint, aut tormina, vel alvi profluvium supervenerit diluentes potiones interponere juvat; a medicamento vero interea abstinendum. — Ex quovis vehiculo conveniente sumitur.

Corpori debilitato, apyrexias tempore, roborantibus succenturiandum, et alvus, si adstricta est, liquanda congruis remedium adminiculis, ut ex. gr. pilulis aloëticis, radice Rhei palmati, aliisque.

Acidum arsenicosum, arbitrato DARWINI, in systema absorbens agit, ventriculum stimulat, torporem systematis arteriosi cohibet, et sic febres propulsat, cui opinioni, num adstipulari liceat,

subactiori aliorum iudicio relinquimus. Hæc solutio, in variis morbis; præsertim vero in febribus intermittentibus; cautim tamen adhibita, nullo non tempore mihi respondit, ita quidem, ut mileni febrientium non sine voluptatis sensu, salutem suam huic remedio in acceptis retulerint, idque brevissimo tempore. Medicamen efficax, ne noxas inferret, satius est a medentibus ipsis, qui salutem suorum ægrorum cordi habent, præparari, et præberi, quam administris credere.

### SOLUTIO ACIDI MURIATICI OXYGENATI VAPORIFERA.

R. Muriatis sodæ pulverati libras quinque,  
Committe vasi vitreo amplo, et gradatim  
affundito :  
Acidi sulphurici concentrati libras quatuor.

Contagionem correcturus, vas vaporiferum de loco in locum per cubiculum transferto, et vapores ad modum GUYTON-MORVEAU optatos habebis.

### S O L U T I O ACIDI NITRICI VAPORIFERA.

R. Acidi sulphurici,  
Nitratiss Potassæ pulverati, utriusque  
pares portiones.

Sal in vase aperto, sensim additur acido, et vapores optatos olim a JOHNSTONE laudatos; nunc vero, a CARMICHAEL SMYTH ab oblivione vindicatos, habebis.

## S O L U T I O ALEXITERIA OXYGENATA.

R. Oxydi Manganisii pulverati drachmas sex,  
Muriatis sodae pulverati, uncias quatuor.

Misce terendo; dein vase vitreo committe, et adde: Aquæ semunciam; tandem gradatim affunde Acidi sulphurici uncias duas.

Us. Vaporatio his tribus solutionibus producta corrigit aëra, et contagionem valetudinariorum, carcerum, navium, etc. tollit.

Hi vapores sunt ad modum GUITON-MORVEAU.

## S O L U T I O ARSENITIS POTASSÆ.

Secundum pharmacopœiam valetudinarii  
Regii Edinburg.

R. Acidi Arsenicosi,  
Subcarbonatis Potassae, utriusque grana duo,  
Aquae destillatae uncias quatuordecim.

Priora duo ex aqua in vitrea coquito la-



gena, donec soluta fuerint; frigefactum liquorem cola per chartam, dein adde:

Tincturae aromaticae uncias duas.

Dos. Semuncia ad unciam bis de die.

Solutio hæc ad chemiæ regulas exactior quidem est; sed quoniam virtutem ejusdem medicamentosam, nequaquam explorare mihi licuit, solutionem acidi arsenicosi et Nitratis potassæ, experientia multiplici nixam, lubens præfero.

## S O L U T I O

### MURIATIS AMMONIÆ ACETATA.

R. Muriatis Ammoniae unciam,  
Acidi acetici impuri uncias duas,  
Aquae fontalis uncias quatuor. Misce.

Dos. Drachma, (continens Muriatis Ammoniae grana decem) ad semunciam, vel etiam sex drachmas.

### SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

#### *Aqua Barytae.*

R. Muriatis Barytae partem.  
Aquae destillatae partes tres. Solve.

Dos. Guttæ quinque ad decem.

## SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

R. Subcarbonatis Calcis puri (nempe Marmoris  
 albi in frusta contusi uncias novem,  
 Acidi muriatici uncias sedecim,  
 Aquae uncias octo. ,

Misce acidum cum aqua, et adde paulatim frusta Subcarbonatis calcis. Effervescentia finita, digere per horam, liquorem effunde, et per vaporationem ad siccitatem redige. Residuum solve ex sesquialtero pondere aquæ, et demum cola.

Us. Scrofula.

Dos. Guttæ quadraginta ad drachmam, in uncia aquæ.

## SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYDATI.

*Liquor van Swietenii.*

R. Muriatis Hydrargyri oxydati grana sex,  
 ..... Ammoniae grana duodecim.  
 Solve in Aquae destillatae, vel Alcoholis dilu-  
 ti libra

Dos. Drachmæ duæ ad unciam, bis de die.

# SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYDATI CORRODENS.

## *Prima.*

R. Muriatis Hydrargyri oxydati drachmam,  
..... Ammoniae drachmas duas.  
Solve in Alcoholis diluti uncia.

## *Secunda.*

R. Muriatis Hydrargyri oxydati drachmam,  
Acidi muriatici concentrati drachmas duas. Solve.

Hæc præcedenti longe fortior est, quippe cujus guttæ binæ granum Muriatis hydrargyri continent, gutta proinde dimidium granum, cujus, si dimidiam partem, ratio morbi, exhiberi suadet, tum hæc uncia aquæ diluta, bifariam divisa, partitis exhibetur vicibus.

Us. *Externe*: condylomata, verrucæ, rhagades, ulcera supercrescentia, et id genus alia. Penicillo hoc liquore madido, semel, vel bis de die adfricando.

# SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYDATI ET AMMONIÆ FORTIOR.

## *Aqua phagedaenica.*

R. Muriatis Hydrargyri oxydati grana octodecim,  
..... Ammoniae drachmam,  
Aquæ destillatæ libram.

Solve, cola, et pro usu externo serva.

V. Corrosiva.

Us. Rhagades, condylomata, verrucae.  
Ope penicilli, vel plumaceolæ admota.

PRAEP. *Lin. superacetat. plumbi comp.*

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYDATI, ET AMMONIAE DILUTIOR fiet, si aquæ, vel alcoholis diluti quantitas sumatur triplex. —

Hæc usui interno peraccommoda, atque a duabus propinando drachmis ad semunciam, vel ad unciam.

### SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXYGENATI.

R. Muriatis Potassae oxygenati drachmam.  
Aquae destillatae libram. Misce, solve.

Us. Ulceribus herpeticis, atonicis, penicillo, aut linteo carpto excepta applicetur semel, vel bis de die.

Si loco libræ, quantitas aquæ trilibris sumatur, fiet POTIO OXYGENATA, quæ in asthenia generali, cachexia, scorbuto, hepatitide chronica, herpete, impetigine, psora, aliisque cuticularibus, laudatur.

Dos. Libra potionis ad duas, de die.

## S O L U T I O

### NITRATIS ARGENTI FUSI.

R. Nitratiss Argenti fusi scrupulum ,  
Aquæ destillatæ semunciam. Misce , solve.

Us. *Interne* , eximius in epilepsia a guttis tribus sensim sensimque dosin augendo , usque ad guttas sedecim bis , tervé de die ex quovis potu.

*Externe* : ulcera sordida , aliave rebellia ; linteo eadem madido , marginem tangendo.

Aquæ libris tribus diluta , ulcera oris , blennorrhœa. Solutionis hujus , guttæ tres continent gr.  $\frac{1}{4}$  , duodecim guttæ granum , sedecim guttæ granum  $1\frac{1}{3}$ .

## S O L U T I O S A P O N I S .

*Linimentum saponaceum.*

R. Saponis sebacei uncias quatuor ,  
Alcoholis diluti bilibram.  
Fiat solutio , et si opus , coletur.

Us. *Extrinsecus* : myodynia , et arthrodynia rheumatica , contusura , distorsio , etc.

PRAEP. *Fom. sapon. ammoniatum.* — *Fom. sapon. comp.* — *Lin. ammon. terebinthinatum.*

## SOLUTIO SUB-ACETATIS CUPRI ET AMMONIÆ.

R. Acetatis Cupri crystallisati drachmam,  
Ammoniae liquidæ unciam. Misce fiat solutio.

Us. Ulcera syphilitica, et similia: singulis aquæ frigidæ unciis additis guttis decem, plus, vel minus. Linteum carpum hacce solutione madidum ejusmodi ulceribus sæpius imponendo, egregie opitulatur.

## SOLUTIO SULPHATIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci grana sedecim,  
Aquæ fontanæ uncias octo,  
Acidi sulphurici diluti guttas sedecim.

Solve sulphatem zinci in aqua, dein addito acido, per chartam cola.

vel

R. Sulphatis zinci scrupulum,  
Aquæ ferventis sescunciam.

Fiat solutio, pro dosi sumto veneno, confestim sumenda.

V. Prioris, adstringens.

Us. Blennorrhœa, et leucorrhœa, ophthalmia atonica, fistula lacrymalis, operatione peracta.

S O L U T I O  
SULPHATIS ZINCI ALUMINOSA.

*Aqua aluminosa Batiana.*

R. Sulphatis Zinci,  
Supersulphatis Aluminæ et Potassæ,  
utriusque senunciam,  
Aquæ fervidæ bilibiam.

Misce in vase vitreo, ut fiat solutio, et cola.

Us. Vulnera, et ulcera phagedænica,  
cutisque vitia, ophthalmia, blennorrhœa.

S O L U T I O  
TARTRATIS STIBII ET POTASSÆ.

R. Tartratis Stibii et Potassae grana sex.  
Aquae destillatae selibrani. Misce, solve.

V. Emetica, nonnumquam cathartica,  
latibulante in primis acido in primis viis.

Us. Febres, catarrhus, dysenteria, pertussis, scarlatina anginosa, narcotismus, dyspepsia. Pulvis vomicus in eundem finem propinandus.

Dos. Uncia singulis horæ quadrantibus,  
donec vomitiones ciet, danda.

## SPECIES ALTHÆÆ COMPOSITÆ.

*Species pectorales.*

- R. Radicis Althææ off. concisæ,  
 Herbae Tussilaginis Farfarae  
     utriusque partes tres,  
 Radicis Inulae Helenii concisæ,  
 ..... Glycyrrhizæ gl. concisæ,  
 Florum Arnicae montanae,  
 Capsularum seminalium Papaveris Somniferi  
     contusarum, singulorum partem Misce.

Decoque sescunciam specierum in bilibra  
 aquæ ad sesquilibram, cujus sumitur cy-  
 athus sæpius de die.

## SPECIES AROMATICÆ.

- R. Herbae Artemisiae Absynthii,  
 ..... Menthae crispæ,  
 ..... Origani vulgaris,  
 ..... Thymi Serpylli.  
 Florum Matricariae Chamomillae,  
     Singulorum partes portiones.

Concisa misceantur.

Us. *Extus* cataplasmatibus, et fomen-  
 tis variis pro re nata admovendis inser-  
 vit.

PRAEP. *Foment. aromat.*

## SPECIES GUAJACINÆ COMPOSITÆ.

*Species lignorum.*

- R. Scobis ligni Guajaci officinalis partes tres,  
 Radicis Arcii Iappæ,  
 ..... Caricis arenariae,  
 ..... Saponariae off. singulorum partes duas,  
 Stipitum Solani Dulcamarae partem.



VIRT. Us. Dos. videfis: decocturam purificantem, et eandem cum D. Mezereo.

## SPECIES TURIONUM PINI COMPOSITÆ.

*Species antiscorbuticæ.*

- R. Turionum Pini sylvestris,  
 Herbae Chilleanae Millefolii,  
 ..... Fumariæ off.  
 ..... Menyanthes trifoliatae,  
 Rasuræ ligni Juniperi communis,  
 Radicis Acori Calami,  
 Singulorum pares portiones.

Us. Inservit ad decocturam earundem parandam.

## SPONGIA USTA.

Spongiæ marinæ quantum lubet, uratur in crucibulo tecto, donec fumus per commissuras exire cesset. Carbo ex refrigerato crucibulo exemptus, in subtilem pulverem redactus, usui servetur.

Ex pauca quantitate Muriatis sodæ, et Subphosphatis calcis, spongia usta constans, ad strumam averruncandam a medicis præcipue adhibenda.

✓ Resolvens, exsiccans.

Us. In bronchocele egregius, præsertim cum aptis adminiculis, qualia sequentia sunt, quæ quum nullo non tempore

mihi responderint, in medium proferenda censui:

R. Muriatis Hydrargyri oxvdulati praeparati  
granum  
..... Ferri ammoniacalis Ph. Ros. grana tria,  
Pulveris radidis Rhei palmati grana quatuor,  
Spongiae ustae grana decem  
Pulveris corticis Lauri Cassiae grana duo.

Misce fiat pulvis subtilissimus, et dentur tales duodecim; quorum unus bis in hebdomade cum tantillo cujuslibet syrupi a dormituro noctu capiatur.

R. Spongiae ustae unciam,  
Pulveris gummi Mimosae niloticae drachmam,  
..... corticis Lauri Cinnamomi grana quin-  
decim,  
Syrupi corticis Citri Aurantii quantum satis,

Ut fiat massa, longiori, lentaque tritura-  
tione, addito sensim sensimque syrupo  
subigenda, ex qua formentur trochisci vi-  
ginti quatuor, super patinam oleo illitam  
siccandi. Quotidie summo mane unus,  
ore continendus, donec solutus fuerit, de-  
in gradatim devorandus.

R. Fellis Tauri recentis unciam,  
Muriatis sodae semunciam, solve in  
Aquae tepidae uncia, adde:  
Olei Oleae europaeae semunciam, vel quantum  
satis,

Ut fiat linimentum, quo struma assidue  
perfricanda est, antequam sequens em-  
plastrum superdatum fuerit.

R. Emplastri oxydi Plumbi semivitrei compositi  
semunciam,  
Muriatis Hydrargyri oxydulati praeparati  
drachmani,  
Tartratis stibii et Potassae grana decem. Misce.

Fiat lege artis emplastrum, super alutam  
extendendum, et strumæ admovendum;  
haud secus, ac cynanche parotideæ Mumps  
a Caledonibus dictæ.

### SUB-CARBONAS AMMONIÆ.

*Carbonas ammoniae Ph. Edinb. Ammonia prae-*  
*parata Ph. Lond. Ammonium carbonicum Ph.,*  
*Bor. Sal volatile salis ammoniaci Ph. Ross.*  
Слабая летучая щелочная соль.

R. Muriatis Ammoniae partem,  
Subcarbonatis Calcis purissimi, siccati,  
partes duas.

Utrumque seorsim tritum permisceto, at-  
que ex retorta in refrigeratum excipu-  
lum, sublima.

V. Excitans, resolvens, sudorem lotium-  
que movens, antacida.

Us. Asthenia, phrenitis hydrocephali-  
ca, lethargus, asphyxia, defectio animi,  
exanthemata retrograda etc.

Dos. A quinque, decem, a quindecim  
grana, cum aquæ congrua qauntitate.

*Externe:* qua odoramentum.

PRAEP. *Acetas ammon. liquid.* — *Carbon. ammon. liquid.* — *Garg. ammon.* — *Haust. acid. carbon. evolvens.* — *Haust. Guajac.* — *Mist. F. Ammon. comp.* — *Pulv. Guajaci et carbon. ammon.* — *Subsulph. Cupri et ammoniae.*

## SUB-CARBONAS AMMONIÆ LIQUIDUS.

*Aqua Carbonatis ammoniae Ph. Edinb.* *Aqua ammoniae Ph. Lond.* *Liquor ammonii carbonici aquosus Ph. Bor.* *Spiritus salis ammoniaci aquosus Ph. Ross.* Простой нашатырной спиртъ.

E Subcarbonatis Ammoniae uncia in tribus aquae destillatae unciis soluta, paratur.

V. et Us. Ubi ammonia liquida, Alcohol ammoniatum, et ejusdem subcarbonas, ibi hic quoque prodest.

Dos. A guttis viginti ad drachmam in liquido adaptato.

PRAEP. *Dec. Cinchonae off.* — *Pil. subsulph. Cupri et ammon.*

## SUB-CARBONAS MAGNESIÆ.

*Magnesia carbonica* Ph. Bor. *Magnesia aërata*  
 Ph. Ross. Магнезія напишанная угольною  
 кислотою.

R Sulphatis Magnesiæ,  
 Subcarbonatis Potassae utriusque  
 pares portiones.

Aquæ destillatæ calidæ duplo solvantur separatim, atque per chartam colentur, dein commistis, statim adjice: aquæ bullientis octuplum, denique bulliat paulisper, moveaturque liquor, ac post brevem quietem, imminuto videlicet paulum calore, per linteum coletur, super quod remanens subcarbonas, aqua pura, vel potius destillata, donec insulsus fuerit, eluatur, siccetur, usuique servetur.

V. Egrègia, acidum, rancidumque absorbens, eccoprotica, carbonicum explicans acidum, antiseptica, ut quibusdam videtur.

Us. Ad omnia valet, quæ acido primarum viarum originem debent, hinc in inflatione, ructibus, pyrosi, vomitionibus, etc. proinde, hypochondriacis, hystericisque, huic incommodo obnoxiiis, persæpe commendabilis. Rachiticis, scrofulosis, ar-

thriticis ab eadem causa, ut et achore laborantibus prodesse existimatur. Hæmorrhœicis opportunum liquandæ alvi causa, haud secus ac infantibus ægre dentientibus, alvo in primis viridi, mollimentum non spernendum.

Dos Provectæ ætatis hominibus a scrupulo ad drachmam, absorbendi scopo; alvi autem ducendæ ergo a drachma ad semunciam, vel in aqua, vel in infuso Theæ ditioribus. Saccharum etiam recte eidem additur; subinde vero, res exigunt circumstantes, ut stimulantibus, vel tonicis conjunctus, majorem promittat utilitatem, aciditate videlicet, veluti effectum, ab imbecillitate orta. Ubi gaz carbonicum extricari e re est, cum acido citrico, vel acetico, effervescat oportet. Infantibus ad unciam syrupi quatuor, scrupuli cochlearibus parvis sæpius in die propinantur.

PRAEP. *Mist. ejusdem.* — *Murias. Magnesiae.*

## SUB-CARBONAS POTASSÆ.

*Carbonas potassae puriss. Ph. Edinb. Kali prae-*  
*paratum. Ph. Lond. Kali carbonicum Ph. Bor.*  
*Cineres clavellati depurati Ph. Ross. Sal tartari.*

Поташъ чистый.

R. Supertartratis Potassae quantum lubet.

Portiones hujus salis, charta aqua hume-  
 cta obvoluti, ardentibus circumda carbo-  
 nibus, ut calcinentur. Cineres residui in  
 destillata solvantur aqua, et liquor cola-  
 tus, sub jugi motu, ad siccitatem eva-  
 poret.

V. Antacida, mukum, gelatinamque sol-  
 vens, diuretica.

Us. Morbi e primarum viarum acido,  
 uti etiam venena quædam corporibus no-  
 stris inserta, puta: Murias Hydrargyri oxy-  
 datus, Acidum Arsenicosum; infarctus glan-  
 dularum mesenterii mucosi, infantum atro-  
 phia ex eadem causa, rachitis, lithiasis,  
 psora etc.

*Extus*: forma balnei, fots, lotionis, etc.  
 tumor glandularum ex lacte, aliisque cau-  
 sis, orchiocele scirrhusa, tinea, herpes.

Ad parandum *Subcarbon. potass. liquid.* —  
 inservit, ut et, *Aq. supercarbon. potass.* —

*Haust. acid. carbonic. evolv. — Inf. Chamom. c. subcarbon. potass. — Inf. Rhej p. — Mist. F. Ammon. comp. — Mist. subcarb. potass. — Mur. potass. oxygen. — Sap. terebinth. — Solut. arsenit. potassae. — Sulphat. potassaz. — Hydrosulphuret. potassae.*

## SUB-CARBONAS POTASSÆ LIQUIDUS.

Рѣшворъ винощелочной соли.

*Oleum tartari per solutionem Ph. Ross.*

R. Subcarbonatis Potassae partem,  
Aquae destillatae partes tres. Solve, et filtra.

vel

R. Subcarbonatis Potassae, quantum velis, in loco humido, acri expone, ut sensim deliquescat.

V. et Us. Subcarbonatis Potassæ.

Dos. Drachma cum Syrupo, et multa aqua dilutus.



## SUB-CARBONAS SODÆ.

*Carbonas sodæ. Ph. Edin. Natron præparatum  
Ph. Lond. Soda purificata. Natrum Carbonicum  
cryst. Ph. Bor. Alkali minerale Ph. Ross.*

Сода чистая.

R. Subcarbonatis sodæ impuri, quantum lubet, contundito, tum coque ex aqua, donec totius diluatur eadem sal. Haec tandem colata per chartam in ferreo vase vaporet, ut post refrigerationem crystalli concrecant.

V. Antacida, mucum, gelatinam, calculum urocysticum solvens, sudorem lotiumque movens, alvum leniter ducens.

Us. Acidum primarum viarum absorbet, ideo aphthis lactentium præcipue infantum, ut succedaneum Subborati sodæ, opponitur, quæ ubi a gingivis incipientes, palatum totumque os occupant, tum ad uvam faucesque descendunt, atque his obsessis, periculum minitantur, ad purganda hæc ulcera recte datur devorandus. Pustulosis quoque ab eadem causa, aut ficis laborantibus, aut scrofulis, achore, rachitide, etc. imo ad curandas podagras aptus esse censetur, TODÆ. Venenorum, acria acida continentium, est antidotus celebratissima, quamobrem adversus Muriatem Hydrargyri oxydatum, arsenicosum Acidum,

per cibos, vel potiones corporibus nostris inserta, valens. Nec in infarctibus glandularum mesenterii inucosis, atrophique infantum, frustrari fertur. Calculosis, hydropicisque opem fert. Pro psorico quoque habetur.

*Extrinsecus*: forma balnei, fots, lotionis etc. tumores glandularum ex lacte, aliisque causis, orchiocele scirrhusa, herpes, tinea, scrofula, ulcera phagedænica etc.

Dos. Auctior, an exigua sit danda, ex ratione quantitatis acidi absorbendi, et ætatis ægri æstimari oportebit; plerumque tamen a quinque ad quindecim grana, usque ad semidrachmam adultioribus dantur, cum congruis remediorum additamentis, vel in solutione, habita semper soluti ad solvens ratione. Subcarbonas Magnesiæ, vel alii pulveres nulla acida, aut ferentes, aut extricantes, ut Saccharum etc. recte adjunguntur eidem. In pilulis, extracto amaro, debili in primis stomacho, excipitur utiliter; urgentibus autem aphthis solutus ex melle devorandus propinatur, et in lithiasi cum sapone oleoso vices aquæ Supercarbonatis so-

dæ supplet. — Ubi usus ejusdem protrahendus est, ut in lithiasi, infarctu glandularum, et intestinorum, achore, rachitide, et id genus aliis, tum magna cura cavendum, ne dum salutem molimur majori dosi, ægrotis struamus insidias.

PRAEP. *Aq. miner. acidula.* — *Aq. miner. sulphurata.* — *Aq. Supercarbon. sodæ.* — *Carbon. ferri praecipitatus.* — *Pil. Subcarbonat. sodæ.*

### SUB-PHOSPHAS CALCIS.

*Cornu Cervi ustum.*

Frusta cornu Cervi Elaphi ure, donec penitus albescant; deinde tere in pulverem subtilissimum.

Us. Rachitis, etc.

Dos. Scrupulus, cum quinque granis Subcarbonatis sodæ.

PRAEP. *Oxydum Stibii cum Subphosph. Calcis.*

### SUB-SULPHAS CUPRI ET AMMONIÆ.

*Cuprum ammoniacum, vel ammoniacale.*

*Ammoniaretum cupri Ph. Edinb.*

Лепущещелочная мѣдь.

R. Sulphatis cupri (vulgo Vitriolum coeruleum dicti) partes duas,

Subcarbonatis Ammoniae partes tres.

In vitreo mortario rite subigito, donec effervescentia finita, placide in violaceam

coiverint massam, bibula charta obvolvendam, et super lapidem primo cretaceum, tandem calore leni exsiccandam servandamque in vitreo vase bene obturando.

V. Adstringens, antiepileptica.

Dos. A dimidio grano caute ascendendo ad grana quinque.

PRAEP. *Pilulae Subsulph. cupri et ammon.*

## S U C C U S

### COCHLEARIAE OFF. COMPOSITUS.

R. Succi Cochleariae off. bilibram,  
 .... Veronicae Beccabungae,  
 .... S. Nasturtii,  
 .... Fumariae off. singulorum libram,  
 .... Citri aurantii uncias viginti,  
 Tincturae Acori Calami selibram. Misce, et cum  
 subsiderint feces, liquorem effundito, et cola.

V. Leniter stimulans, diuretica, antiscorbutica, persæpe alvum leniter sollicitans.

Us. Cachexia, scorbutus.

Dos. Ab uncia ad duas - quatuor, bis terve de die.

## SUCCUS SPISSATUS ACONITI NEOMONTANI.

R. Herbae Aconiti n. recentis antequam effloruerit collectae quantum satis, contunde in mortario lapideo, ligneo pistillo, pauxillum aquae adspargendo. Succus dein prelo expressus, absque defecatione in bälneo aquae, continuo sub finem spatula lignea agitando evaporet ad mellis crassitudinem.

Dos. Granum ad tria. —

Eodem modo paratur :

SUCCUS SPISSATUS CONII MACULATI  
*a grano ad tria,*

..... HYOSCIAMI NIGRI. —  
*a grano ad quinque dandus.*

## SUCCUS V. OXYCOCCI CUM NITRA- TE POTASSÆ.

R. Nitratis Potassae unciam,  
Succi V. Oxycocci libram. Misce, solve.

Cui, si libet, duas, vel tres tincturæ A. Calami uncias, utiliter addes.

V. Majoribus in dosibus antiscorbutica.

Us. Scorbutus, dysenteria scorbutica.

Dos. Uncia ad selibram partitis vicibus quotidie. PATTERSON usque ad libram per diem optato cum successu propinavit. Ubi nauseam, colicos dolores, et oppressionem ventriculi producit, tunc

Camphora a grano ad quatuor singulis dosibus dari debet. Succus V. Oxycocci, vel fructus Citri m., aceto a PATTERSON commendato præferri meretur.

*Extus* etiam lotionis forma, in ecchymosi crurum utilitatem promittit.

### SULPHAS POTASSÆ.

*Kali vitriolatum Ph. Lond. Kali sulphuricum Ph. Bor. Tartarus vitriolatus Ph. Ross.* Соль купоросопоташная, или сѣрно-кислый кали.

R. Acidi sulphurici, aquae sextuplo pondere diluti, quantum libet.

In amplum vas vitreum infunde, ac gradatim Subcarbonatis potassæ purissimi sextuplo aquæ soluti pondere sufficientem quantitatem ad perfectam acidi saturationem instilla.

Finita effervescentia, liquorem filtra, atque ad crystallisandum seponito.

Commode fit quoque Sulphas potassæ ex residuo post destillatum acidum nitrico-nitrosum, in aqua calida soluto, et Subcarbonate potassæ saturato.

V. Debilitans, resolvens, leniter urinam movens, alvum ducens.

Us. Colluvies primarum viarum, febres inflammatoriæ, splanchemphraxes, hydrops, metastases lacteæ, aurigo etc.

Dos. A viginti granis ad drachmas quinque. Ad solvenda grana triginta uncia caldæ aquæ requiritur; frigidæ vero plus. Aliis quoque auxiliariis, ut C. Jalapæ, Rheo p., adjungitur recte.

PRAEP. Videsis: *Pulv. C. Ipecacuanhae et Opii*, — *Pulv. C. Jalapae cum Sulphate, vel Supertartrate potassae.*

## SULPHAS SODÆ.

*Sal mirabile Glauberi.*

Глауберова соль.

R. Residui post destillationem Acidi muriatici  
quantum libet.

Solve in sufficienti quantitate ferventis aquæ, peracta ope Subcarbonatis Sodæ saturatione, filtretur, evaporet, et in frigido loco, ut effingantur crystalli, seponatur, solutione repetita depurandæ.

V. Majoribus in dosibus cathartica; minoribus vero diuretica.

Us. Alvus dura.

Dos. A semuncia ad unciam, et amplius in aqua solutus; si vero fatiscit, di-

midium duntaxat, propositæ quantitatis exhibetur.

Aquam marinam artefactam ingreditur.

## S U L P H A S   Z I N C I.

*Zincum sulphuricum Ph. Bor. Vitriolum album*  
*Ph. Ross. Бѣлый купоросъ.*

R. Zinci puri quantum velis,  
 Acidi sulphurici diluti quantum satis. — Solve.

Solutionem rite filtratam, sub agitatione jugi ad siccitatem evapora. Plerumque apud Goslarienses paratur, et cum raro purum sit, et album, in aqua solvendum, cum Zinco granulato coquendum, filtrandum, et crystallisandum est.

V. Adstringens, diuretica, emetica, antispasmodica.

Us. Hoc remedium diu ab antiquioribus in usum internum tractum est, jamque ætate nostra abiisset in desuetudinem, ni Britannorum encomiis ornatum, revixisset. Continuatum ejusdem in chronicis diarrhœis, et morbo caduco usum, fuisse proficuum commentaria medica Edinburgensium Clinicorum referunt.

Horum suasu a grano ad tria bis terve de die in pulvere, vel misto solum



cum radice Glycyrrhizæ gl., vel Magnesia, vel cum aliis aptis conjuncto datur, duas ponderis sui portiones frigidæ aquæ, ut examussim solvatur, exigit. Solutionem hanc saturatam parvulo cochleari, et mane, et vesperi propinatam in Londinensi epidemica pertussi 1787 anni respondisse, experimenta testantur. Provocandis quoque vomitionibus aptus, præsertim ubi necessitas incidit promptioris, celerisque effectus, scrupulum hoc in casu devorasse sufficit. Communior, receptiorque Sulphatis Zinci usus est *externus* præsertim soluti per modum collyrii, in ophthalmia, collutorii in anginis serosis et aphthis, ARMSTRONG; PLENCK. Injectionis: varix ani, blennorrhœa asthenica, ulcera, et in primis corneæ.

PRAEP. Sol. Acetat. Zinci. — Sol. Sulphat. Zinci. — Eadem aluminosa.

## SULPHUR SUBLIMATUM.

*Flores sulphuris.* СѢРНЫЙ ЦВѢНЪ.

In commercio prostat.

V. Leniter stimulans, alvum sudoremque movens, antipsorica.

Us. Rheumatalgia in connubio Oxydi stibii hydrosulphurati, et gummi-resinæ Guajaci off. QUARIN. Scabies, et in primis retrograda, WEICKARD. Herpes, POU-PART. Hæmorrhoides, LEAKE. Feminis quibus sanguis per menstrua non respondet, utile, STARKE. Dysenteria, WEDEKIND. Morbi atonici pectoris, SIMS, THILENIUS. Plica Polonica, LAFONTAINE. Pro antidoto quoque Acidi arsenicosi, Muriatis hydrargyri oxydati, plumbi, cupri acetatis, habetur; NAVIER. *Extrinsecus*: per modum unguenti, vel balnei adhibetur.

Dos. Sulphur sublimatum plerumque per se datur, rarius in pilulis, perraro in mistura, idque a granis decem, scrupulo, aliquando usque ad drachmam, aut simpliciter saccharo unitum, aut Super-tartrati Potassæ, aut aliis pro re nata, stimulantibus, roborantibus, vel in electuario.

PRAEP. *Hydrosulphuret. potass.*— *Pulv. Sulph. subl. comp.* — *Ung. pic. liquid. et sulph:* — *Ung. sulphuratum.*

## SUPER SULPHAS ALUMINÆ FUSUS.

*Alumen ustum.*

R. Supersulphatis Aluminae et Potassae  
quantum vis.

Expone igni in vase ferreo, vel fictili non vitreato, amplo, donec liquescens massa ebullire cesset, atque expulsa sic omni crystallisationis aqua, in massam levem spongiosam convertatur, usui externo servandam.

V. Intense styptica, corrosiva.

Us. *Externe*: hæmorrhagia, supercre-  
scentia ulcera, luxuriantia immunda.

## SYRUPUS A. ZINGIBERIS.

R. Radicis A. Zingiberis tritae sescunciam,  
Aquae bullientis libras duas,  
Sacchari puri libras tres cum semisse.

Radicem macera vase clauso in aqua per viginti quatuor horas, dein colato liquori adde contritum saccharum, ut syrupus fiat.

Syrupus hicce, et aromate suo, et gratia, qua se commendat, ceteris plerisque omnibus, præstat.

Dos. A drachma ad tres.

PRÆP. *Mist. g. r. Myrrhae ferrata.* — aliæ-  
que misturæ, decocturæ, infusiones, pi-  
lularumque massæ.

## SYRUPUS SCILLÆ MARITIMÆ.

R. Aceti scillitis bilibram,  
Sacchari puri libras tres cum semisse.

Postremum solvatur leni calore, ut fiat syrupus.

V. et Us. videsis: Scillam maritimam præparatam.

Dos. Drachma ad tres per se, vel in connubio aliorum.

Misturam scillinam ingrediens.

## SYRUPUS SIMPLEX.

R. Aquae fontalis bilibram,  
Sacchari libras tres cum semisse.

Misce, et leni cocta igne, cola.

Decoctræ, infusiones, misturæ, haustus, eo edulcorantur, et ad formandas pillularum massas adhibetur.

## TARTRAS STIBII ET POTASSÆ.

*Antimonium tartarisatum Ph. Lond. Tartris antimonii Ph. Edinb. Tartarus stibiatus Ph. Bor. Tartarus emeticus Ph. Ross. Соль рвошная виносурьмяная.*

R. Oxydi Stibii sulphurati (vitri antimonii) in subtilissimum pulverem tenuati uncias duas, Supertartratis Potassae pulverati uncias quatuor, Aquae destillatae libras sex.

In vase vitreo per duodecim horas coquito spathula lignea movens. Jactura aquæ

affusione ejusdem nova resarciatur subinde, lixivium hinc ortum, fervidumque filtratum lente ad siccitatem evaporet, et mox massa pulveranda in vitreo vase sicco servetur.

V. Emetica, interdum cathartica; refracta dosi nauseam, lotium, sudorem movens, spasmos sedans.

Us. Præsertim in febribus biliosis, putridisque antiquitus dictis, aliisque morbis, ubi nevroblacia quædam observatur, concussioque corporis e re fore censetur, exhiberi solet; hinc eandem ob causam in hydropisi, melancholia, in suffocationibus, devoratis narcoticis venenis, aut a mephyticiis exhalationibus ortis, in apoplexia, etc. utilis esse censetur, uti etiam, ubi contenta exinanitione per superiora educi juvat.

Hunc in finem apte cum C. Ipecacuanha, ad vim ejusdem augendam, conjungitur; minus vero commode, ut MARRYAT vult cum Sulphate Cupri. Ubi alvum ab inferiore simul parte evocari lubet, pauxillum amyli, et Supertartratis Potassæ adjectum prodest. Non ita huic connubio aptus est sulphas Sodæ, aliive Sales neutri

ob decompositionis metum. Cum Muriate Sodæ, ut scite observat LASSONE, aquæ portione mistus, naturam cathartici induit.

*Extrinsecus*: forma emplastri, solutionis, unguenti, admovetur, ut stimulans, calefaciens, rubefaciens, pustulas producens, et pro re nata, in alvum, ut intestini recti irritans, per modum clysteris subterdari juvat. Unguentum hoc stimulat, resolvit; admota vero, abdomini frictione, provocat vomitiones, imo, adjecto Muriate Hydrargyri oxydulato, in tumoribus, glandularum, jecinoris, testiculorum etc. respondisse experimenta testantur.

In alvum subterdatus, plerumque duxit eandem, subinde vomitum movit, et tum in herniis incarceratis, et arthritide intestinali, profuisse fertur. Ulcera rebellia, supercrescentia, recte resperguntur pulvere ejusdem. Solutio, vix tantam in curandis ophthalmiis, et maculis corneæ promittit utilitatem, quanta a quibusdam prædicatur; commendatur etiam pro balneis ablutionibusque; si fortior erit, verrucas venereas, egregie eradicat.

Dos. An ad vomitum ciendum auctior, aut exigua sit propinanda, ex ratione æta-

tis, irritabilitatis, etc. æstimari oportebit, in anniculis ab una quarta grani parte, ad dimidium ejusdem; bimulis, vel trimulis a dimidio grani ad integrum; ætate majori usque ad octennem, fortioris habitus, a grano ad sesquigranum; adultis demum a duobus ad tria grana, in totidem unciis aquæ soluta, cochleari pro re nata, majori, vel minori, omni quadrante, vel semihora, donec vomitum ciet, propinanda.

Si pro varia ægrorum indole, in minori dosi, quam pro vomitione cienda opus sit, præscribatur, tum passim vicario cathartico munere fungitur; in dosi vero adhuc minori alterantis, antispasmodici, sudifici vices implet, addito præcipue Carbonate calcis; idque a sexta ad tertiam grani Tartratis stibii et potassæ partem, et Carbonatis calcis et Sacchari utriusque granis quinque, tertia, vel quarta quaque hora auctore FORDYCE.

PRÆP. *Pil. Mur. hydr. oxydulati stibiatae.* — *Pulv. Guajaci, et Tartr. Stibii et Potassae.* — *Pulv. vomicus.* — *Sol. Tart. Stib. et Potass.* — *Ung. Tartr. Stib. et Potassae.* — *Vinum Tartr. Stib. et Potassae.* — *Empl. ad strumam.*

## TINCTURA ACORI CALAMI.

R. Radicis A. Calami sescunciam,  
 conscissae affunde:  
 Alcoholis diluti libram.

Vase clauso ad sufficientem extractionem digeratur, tinctura filtretur, usui servanda.

Perraro sola a drachma ad duas, et amplius propinatur, sæpius misturis additur, ut succedanea, exoticis aromaticis majoris dispendii, merito subrogatur.

PRAEP. *Inf. Valerianae.*—*Succus Cochlear. off.*

## TINCTURA AROMATICA.

R. Pulveris aromatici uncias quatuor.  
 Alcoholis diluti, libras duas cum dimidia.  
 Digere per septimanam, et cola.

Dos. Drachma ad semunciam.

PRAEP. *Dec. Orchid. M.*—*Haust. saponac.*—*Haust. tereb.*—*Inf. M. Catechu c. Opio.*—*Inf. Valerian.*—*Mist. Carb. Calc. comp.*—*Mist. Cinchon. off.*—*Mist. F. ammon comp.*—*M.st. F. Asae foet.*—*Mist. Subcarbon. Magnes.*



## TINCTURA CINCHONÆ OFFICINALIS COMPOSITA.

R. Corticis Cinchonae off pulverati uncias sex,  
 Acori Calami radicis concisae,  
 Fructus Citri Aurantii inuncti, utriusque  
 semunciam,  
 Alcoholis diluti libras tres.

Digere per dies septem, et cola.

Dos. Drachma ad tres per se, vel in quovislibet liquido convenienti.

PRAEP. *Dec. et mist. Cinchonae. — Mist. Myrrhae ferrata.*

## TINCTURA CONORUM HUMULI LUPULI.

R. Pulveris conorum Humuli Lupuli unciam,  
 Alcoholis diluti selibram. Digere per dies octo, et cola.

Dos. Guttæ triginta ad quadraginta, (vel deficiente hac tinctura) exhibe:

Pulveris conorum Humuli Lupuli grana tria,  
 hora decubitus, superbibendo succi Citri medicæ, vel acidi acetici impuri cochlear.  
 Iisdem virtutibus gaudet, ut Opium.

## TINCTURA DIGITALIS PURPUREÆ.

R. Foliorum recentium Digitalis purpureae  
 unciam,  
 Alcoholis diluti uncias octo.

Misce, et digere leni calore per dies septem, dein tincturam per chartam cola,

MACLEAN. Hujus guttæ quindecim ad viginti, foliorum grano æquiparabiles.

Dos. Guttæ decem, ascendendo gradatim ad triginta, et amplius ter de die cum uncia aquæ cujuslibet aromaticæ, v. g. Menthæ, vel infusi amari propinantur. Addito succo Citri m. majores quoque doses feruntur.

PRAEP. *Mist. F. Asae foetid.*

vel

R. Foliorum Digitalis purpureae in pulverem  
crassum tenuat unciam,  
Alcoholis diluti uncias quinque.

Digere leni calore per dies septem, dein per chartam colato.

Dos. Guttæ quindecim, viginti, ascendendo ad 90 vel 100 DRAKE.

## TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

R. Pulveris radiceis A. Calami,  
..... Gentianae l. utriusque unciam,  
Fructuum Citri Aurantii immaturorum,  
Pulveris aromatici utriusque drachmam,  
Alcoholis diluti libram.

Digere per quatrimum, cola, et servato.  
TINCTURAE WHYTII subpar, e privatis  
obtentæ officinis.

Dos. A semidrachma ad duas drachmas commode datur.

## TINCTURA GUMMI-RESINÆ GUAJACI.

R. Gummi-resinae Guajaci off. libram,  
Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

Us. Rheumatalgia, arthritis, podagra.

Dos. A drachma ad tres, bis terve de die, in quovis idoneo vehiculo.

PRAEP. *Dec. Cinchonae off.*

## TINCTURA GUMMI-RESINÆ GUAJACI AMMONIATA.

R. Gummi-resinae Guajaci off. uncias quatuor,  
Alcoholis ammoniati sesquilibram.

Misce, et macera per septimanam in vase bene clauso, et per chartam cola.

Dos. Drachma ad duas, mane, et vespere in quovis vehiculo, lacte praesertim, vel sero ejusdem.

## TINCTURA HYOSCIAMI NIGRI.

R. Foliorum Hyosciami n. siccatorum unciam,  
Alcoholis diluti uncias octo.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

Tincturæ Opii, medicamentosa virtute, in variis, præsertim externis morbis, vix cedit.

Dos. Guttæ viginti ad sexaginta.

## TINCTURA LYTTÆ VESICATORIÆ.

*Tinctura Cantharidum.*

R. Lyttæ vesicatoriæ pulveratæ semunciam,  
Alcoholis diluti libram.

Digere per quatrimum, et per chartam cola.

Us. Hydrops; diabetes uterque, mellitus pariter, ac insipidus; gonorrhœa; enuresis a paralyti vesicæ urinariæ orta; anaphrodysia; raro tamen interne adhibetur, idque a guttis sex, decem, viginti, aucta cautim dosi, in vehiculo quopiam idoneo, uti cum aqua, vel aptius cum mucilagine gunni Mimosæ niloticæ, vel mistura gummi-resinæ F. Ammon, ad guttas triginta ter quaterve de die. Interdum singulis præbiis, tincturæ Opii camphoratae drachma additur, præcipue in pertussi, quoadusque levis stranguria fuerit oborta. *Extrinsecus*: in primis pro fricationibus, vel sola, vel cum linimento quovis irritante, adversus arthrodyniam, rheumatalgiam, debilitatem membrorum, paralytin, etc. adhibetur.

PRAEP. *Embroc. sapon. rubefac.* — *Ung. stimulans.* — *Lin. ammoniato-terebinthinatum.*

## TINCTURA MIMOSÆ CATECHU.

*Tinctura terrae Japonicae.*

R. Extracti Mimosae Catechu sescunciam,  
Corticis Lauri Cassiae unciam,  
Alcoholis diluti libram.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

V. Leviter stimulans, adstringens.

Us. Alvi profluvia, hæmorrhagiæ.

Dos. Drachma ad tres in quolibet vehiculo idoneo.

Eodem modo parantur TINCTURA KINO, et EXTRACTI TORMENTILLÆ ERECTÆ, medicamentosa virtute vix postponendæ præcedenti, quibus haud male anodyna, et aromatica adduntur, præsertim ubi citæ alvo medicinam fieri expedit.

## T I N C T U R A .

### MURIATIS FERRI ALCOHOLISATA.

R. Ferri limati præparati uncias tres, vel  
.... Oxvdi nigri purificati tantundem, vel  
Carbonatis ferri præparati tantundem  
Acidi muriatici concentrati uncias circiter decem,  
vel quantum sufficit ad solvendum pulverem.  
Digere leni calore et soluto pulvere adde:  
Alcoholis quantum sufficiet ut sint totius liquoris librae duae cum semisse.

Us. Est excellens tonicum, leniter adstringens, quod in omnibus adhiberi potest casibus, ubi talia remedia e re fore existimantur, et quidem a guttis decem ad viginti bis terve de die; in dysuria a strictura urethræ spasmodica guttæ decem ad quindecim singulis horæ quadrantibus, donec nausea, aliæve notæ universalis relaxationis supervenerint.

*Externe*: tumores scirrhusi, verrucæ.

### TINCTURA MYRRHÆ.

R. Gummi-resinae Myrrhæ tritæ uncias tres,  
Alcoholis diluti uncias viginti,  
Aquæ uncias decem.

Digere per dies septem, et per chartam cola.

Us. In primis externus: cariei ossium, ulceribusque sordidis apta; gargarismatibus pariter, ac lotionibus quoque non erit aliena.

*Interne*: Asthenicis, dyspepsia laborantibus interdum a semidrachma ad drachmam propinatur.

PRAEP. *Garg. antisepticum.*

## TINCTURA OPII.

R. Opii colati in pulvere unciam,  
Alcoholis diluti libram.

Terendo solve, dein leni calore digere per dies septem, et tunc colaturam per chartam coactam serva.

Drachma tincturæ, vel guttæ 100 ejusdem Opii grana quinque continent; evaporatione attamen grana tria cum semisse tantummodo redintegrantur.

Dos. Guttæ viginti, granum, ad 40 guttas grana opii duo continent, in quovis vehiculo idoneo, per se, vel in connubio aliorum, quæ effectum ejus intendunt, vel morantur.

PRAEP. *Clyst. adstring. c. Opio.* — *Clyst. F. Asae foetidae.* — *Clyst. opiat.* — *Clyst. terebinth.* — *Dec. Cinchon.* — *Haust. Guajac.* — *Haust. acetat. ammon. et stib.* — *Haust. opiato-stibiatus.* — *Inf. M. Catechu c. Opio.* — *Mist. Carb. calc. comp.* —

## TINCTURA OPII AMMONIATA.

*Elixir paregoricum Ph. Edinburg.*

R. Opii drachmas duas,  
Olei destillati P. Anisi semidrachmam,  
Alcoholis ammoniati uncias sedecim.

Macera frigide per septimanam, et per

chartam cola. Drachma (vel 100 guttæ)  
granum circiter opii, continet.

Dos. A guttis triginta ad drachmam  
cum semisse.

## TINCTURA OPII CAMPHORATA.

*Elixir paregoricum Ph. Dub.*

R. Opii colati,  
Camphoræ,  
Olei destillati P. Anisi. singulorum drachmam,  
Alcoholis diluti libras duas.

Digere per quatrimum lenissimo calore,  
et cola. Semuncia tincturæ hujus, men-  
sura, continet granum circiter Opii.

Dos. A guttis triginta, ad drachmam,  
duas.

Addita triplici tincturæ Scillæ quanti-  
tate, egregium aptumque fit, lussi, catar-  
rhoque medicamen.

P R A P. *Mist. F. Ammon comp.*

## TINCTURA RHEI AMARA.

R. Radicis Rhei palmati unciam,  
..... Gentianæ luteæ drachmas duas,  
..... A Zingiberis drachmam,  
Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere per dies septem, et per char-  
tam cola.

Dos. Semuncia ad sescunciam.

Interdum præcedenti additur Aloës per-





Us. Morbi spasmodici, epilepsia, etc.

Dos. Drachma ad tres, in vehiculo idoneo.

PRAEP. *Dec. Cinchonae off.*

## U N G U E N T U M ACETATIS CUPRI CRYSTALLISATI.

R. Unguenti resinosi partes quindecim,  
Acetatis Cupri partem. Misce.

Quandoque pauxillum Adipis suillæ additur commode, debitæ crassitudinis gratia.

V. Stimulans, detergens, leniter escharotica.

Us. Phagedæna, ophthalmia scrofulosa, etc.

## U N G U E N T U M ACETATIS PLUMBI.

R. Cerati Acetatis plumbi,  
Olei Oleae europeae, utriusque pares  
portiones.

Colliquefiant in unguentum.

V. et Us. ut cerati ejusdem nominis.

PRAEP. *Liniment. Superacetat. plumbi comp.*

## U N G U E N T U M ACIDI SULPHURICI.

R. Adipis Suis Scrofae praeparatae unciam,  
Acidi Sulphurici guttas triginta. Misce.

Us. Psora, herpes, etc.

# UNGUENTUM INULÆ HELENII.

R. Pulveris radice Inulae Helenii selibram,  
 Aquae fontis libram. Coque ad consistentiam  
 pultis, dein adde probe movendo:  
 Adipis Suis Scrofae praeparatae uncias tres.

Fiat unguentum, quo partes affectæ, omni vespere, inungantur.

Us. Egregius in psora, aliisve morbis cutis similibus.

# UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS.

*Unguentum Citrinum.*

R. Hydrargyri purificati partem,  
 Acidi nitrico-nitrosi partes duas,  
 Adipis Suis Scrofae partes tres,  
 Olei Napi sylvestris, vel  
 Olivi, partes novem.

Hydrargyro cum acido super arenam rite digesto fiat solutio, quæ adhuc calens, cum suilla adipe commisceatur, denuoque frigesceat, probe in mortario vitreo subacta, unguentum exhibet.

Haud dispari ratione cum triplici adipe fit UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS.

# UNGUENTUM NITRICATUM FORTIUS.

R. Adipis Suis Scrofae recentis insulsae uncias octo,  
 Acidi nitrici unciam,

Adipi in vase figulino vitreato, leni calore liquefacto adfunditur acidum, ebulliente dein massa, vas removetur ab igne, ut frige fiat eadem.

Dum hæc fiunt, acidum decomponitur, oxygenio cum adipe conjuncto; azoto autem avolante.

Vase clauso obscuroque loco servetur.

Us. Indurationibus glandularum, ulceribus venereis, herpeticis, psoræ, extrinsecus unguendo admotum, peraccommodum.

## U N G U E N T U M

### N I T R I C A T U M M I T I U S.

R. Adipis Suis Scrofae praeparatae libram,  
Acidi nitrico - nitrosi unciam.

Massa igni exposita, baculo vitreo, jugique motu, et diligenter agitetur, donec ebullire cœperit; dein ab igne remota teratur, donec frigefacta fuerit.

## U N G U E N T U M

### O P H T H A L M I C U M C U P R A T U M.

R. Acetatis Cupri crystallisati semunciam,  
Oxydi Ziuci,  
Camphoræ. (ope aliquot guttularum Alcoholis  
in subtilem pulverem tenuatae),  
utriusque sescunciam,  
Probe contritis in calente mortario adde:  
Adipis Suis Scrofae,  
..... Ovis Arietis, utriusque uncias quatuor.

vel

R. Acetatis Cupri crystallisati,  
Camphorae,  
Oxycarbonatis Zinci praeparati singulorum  
drachmas sex,  
Oxydi ejusdem impuri praeparati (vulgo Tutia  
dicti) drachmiam,  
Adipis Suis Scrofae praeparatae uncias octo.

Conterendo longiori tempore examussim,  
fiat lege artis unguentum.

Hæc formula antiquior est, atque eidem usui, cui præcedens, servit.

Us. Ophthalmia palpebrarum chronica, trichiasis. — Linimentum hocce, illi, quod Londini SMELLOME'S OINTMENT, nomine insignitur, fere æquiparabile; palpebris noctu dormituris inungendo, adhibetur.

UNGUENTUM OXY-NITRATIS HY-  
DRARGYRI ET AMMONIÆ.

R. Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae  
Adipis Suis Scrofae praeparatae,  
partem,  
partes duodecim. Misce.

Us. Admota internis femoribus, cruribus, brachiisve, juxta vasorum lymphaticorum decursum, fricatione valentissimum.

U N G U E N T U M  
OXY-NITRATIS HYDRARGYRI ET  
AMMONIÆ COMPOSITUM.

R. Oxytritis Hydrargyri et Ammoniae,  
Oxydi Zinci, utriusque partem,  
Adipis Suis Scrofae partes quatuor. Misc.

Us. Ophthalmiæ syphiliticæ, et ulce-  
ribus prodest; frambæsiæ etiam non alie-  
num.

UNGUENTUM PICIS ARIDÆ.

*Unguentum basilicum.*

R. Olei empyreumatici Pini sylvestris exsiccati  
 uncias duas,  
 Cerae flavae unciam,  
 Olei Oleae Europaeae semunciam. Misce.

Colliquefiant leni calore in unguentum.

U N G U E N T U M  
P I C I S L I Q U I D Æ E T S U L P H U R I S.

R. Olei empyreumatici Pini sylvestris libram,  
Sulphuris sublimati uncias quatuor,  
Cerae flavae unciam.

Cera , et pice liquefactis gradatim adde sulphur, ut in unguentum coëant.

Idem subinde, sine cera quoque parabile.

Us. Tinea; psora.

# U N G U E N T U M RESINOSUM LOCO BALSAMI ARCEI.

## *Primum.*

- R. Balsami Pini sylvestris partes septem,  
..... exsiccati,  
Adipis Suis Scrofae praeparatae  
utriusque partem. Misce.

## *Secundum.*

- R. Adipis Suis Scrofae praeparatae,  
Balsami Pini sylvestr. exsiccati,  
Cerae flavae,  
Olivi, singulorum partem.  
Misce, colliquefiant in unguentum.

## *Tertium.*

- R. Adipis Suis Scrofae praeparatae partes octo,  
Balsami Pini sylvestris exsiccati partes quinque,  
Cerae flavae, partes duas. M. colliquefiant in  
unguentum.

Si lubet, et quum opus, singulis unciis prioris admisce: Oxydi Hydrargyri per acidum nitricum drachmam, et tum idem praestantius erit.

PRAEP. *Cat. pus maturans.* — *Lin. resinoso-terebinth.* — *Ung. Acet. cupr. cryst.*

# U N G U E N T U M S I M P L E X.

## *Unguentum emolliens.*

- R. Olivi partes quinque, vel  
Adipis Suis Scrofae praeparatae partes quatuor,  
Cerae flavae, vel albae partem.  
Misce, colliquefiant in unguentum.

Si singulis ejusdem unciis liquefactis, et

jam frigescentibus addas: Tincturæ Lyt-  
tæ vesicatoriæ drachmas duas ad semun-  
ciam, egregium UNGUENTUM STIMULANS,  
fonticulis, et fricationi paralyticorum ad-  
commodatissimum habebis.

P R A E P. *Cat. discutiens.*

## U N G U E N T U M S U B - O X Y D I H Y D R A R G Y R I .

R. Hydrargyri purificati unciam,  
Balsami Pini Laricis semunciam.  
Terantur simul quamdiu guttula Hydrargyri,  
vel minima apparuerit, dein adde:  
Unguenti simplicis drachmas quatuordecim, vel  
Adipis Suis Scrofae praeparatae tantundem.

Dos. Drachma ad tres, pro una frictione.

## U N G U E N T U M S U L P H U R A T U M .

R. Sulphuris sublimati partem,  
Adipis Suis Scrofae praeparatae partes quatuor.

Misce in unguentum.

## U N G U E N T U M T A R T R A T I S S T I B I I E T P O T A S S A E .

R. Tartratis stibii et Potassae scrupulum,  
Adipis Suis Scrofae praeparatae unciam. Misce.

Interdum additur, Muriatis Hydrargyri  
oxydulati praeparati, vel Oxynitratis Hy-  
drargyri et Ammoniae, et Camphoræ,  
utriusque scrupulus.



## VAPORES ACIDI ACETICI.

*Liquor alexiterius acetatus.*

- R. Acetatis Plumbi crystallisati, vel  
 ..... Cupri . quantum vis ,  
 Acidi sulphurici quantum satis ad aceticum aci-  
 dum penitus liberandum. Committe phialae.

## V A P O R E S

## MURIATIS CALCIS OXYGENATI.

*Liquor alexiterius oxygenatus.*

- R. Muriatis Calcis oxygenati , quantum placet.

VAPORES OXY-MURIATICI  
ACIDI.*Liquor alexiterius extemporalis.*

- R. Oxydi Manganesii nigri grosso modo pulverati ,  
 drachmam ,  
 Committe phialae vitreae continenti circiter un-  
 cias duas, eique affunde:  
 Acidi nitrico - muriatici (vulgo Aqua regia dicti)  
 quantum satis, ut phiala ad duas tertias circi-  
 ter repleatur, et obturamento vitreo claude.

Us. Trium liquorum supra propositorum  
 est valens adversus profluvia putrida.

## VINUM C. IPECACUANHÆ.

- R. Radicis C. Ipecacuanhae contusæ unciam,  
 Vini Hispani albi uncias quindecim.

Macera per dies septem, et per chartam  
 cola.

Dos. Semuncia ad unciam , scopo vo-  
 mitum ciendi. Minoribus vero dosibus a

guttis duodecim ad quadraginta, vices supplet C. Ipecacuanhæ refracta dosi propinatae, videsis: C. Ipecacuanham. Si singulis præbiis, succi Hyosciami n. spissati sesquigranum, succi Aconiti n. spissati, vel Conii maculati granum, vel Opii tantumdem additur, vis ejusdem medica in catarrho intenditur; asthma spasmodicum, declinante dysenteria, diarrhœa, etc.

PRAEP. *Mist. Carbonat. Calc. comp.*

## V I N U M

### LUSITANICUM ARTEFACTUM.

*Anglice Port Wine.*

R. Liquoris fermentati pomorum (Cyder dicti)  
libras tres,  
 Alcoholis diluti, (vulgo spiritus vini gallici  
 dicti), libram,  
 Gummi resinae Kino drachmam. Misce, et obturatum probe servetur.

Si loco gummi-resinae Kino, Ætheris nitrici alcoholisati drachmam addideris VINUM, æmulans vetustum RHENANUM, Anglice OLD HOCK, habebis.

## V I N U M

### TARTRATIS STIBII ET POTASSÆ.

*Vinum antimoniale.*

R. Tartratis Stibii et Potassae,  
grana viginti quatuor,  
 Vini albi Hispani libram. Misce, ut solvatur.

In singulis unciis vini hujusce continetur Tartratis Stibii et Potassæ grana duo.

Dos. Semidrachma ad drachmam; si vero libet vomitionem movere, semuncia ad unciam detur.

Cujus singulo præbio, si Aconiti n. succi spissati, semigranum ad sesquigranum, vel succi spissati Hyosciami n. vel Conii maculati sesquigranum, vel extracti conorum Humuli Lupuli tantundem addatur, juvat præsertim in rheumatalgia, catarrho, pertussi, et aliis ejus generis.

PRÆP. *Haust. acetat. ammon. et stibii — Haust. opiato-stibiatus.*

---

Qui legis ista, tuam reprehendo, si mea laudes,  
Omnia, notitiam; si nihil invidiam.

Res ardua vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam dubiis fidem; omnibus vero naturam, et naturae suae omnia: itaque jam non adsecutis voluisse abunde pulchrum, atque magnificum est.

PLIN. in Præfat. Historiæ naturæ

FINIS.



## I N D E X,

NOVISSIMAM, ET ANTIQUATAM, MEDICA-  
MINUM, PHARMACOPOEIA HAC CONTEN-  
TORUM, NOMENCLATURAM, SISTENS.

	Pag.
Abies . . . . .	125
Absinthium vulgare . . . . .	27
Acetas Ammoniae liquidus . . . . .	179
..... Cupri . . . . .	180
..... mellitus . . . . .	267
..... Plumbi crystallisatus . . . . .	181
..... liquidus . . . . .	183
Acetum camphoratum . . . . .	184
..... commune . . . . .	I
..... crudum . . . . .	—
..... destillatum . . . . .	186
..... Saturni . . . . .	183
..... scillites alcoholisatum . . . . .	184
..... Vini . . . . .	I
..... destillatum . . . . .	186
Achillea Millefolium . . . . .	8
Acidum aceticum . . . . .	185
..... dilutum . . . . .	186
..... impurum . . . . .	I
..... acetosum . . . . .	185
..... destillatum . . . . .	186
..... forte . . . . .	185
..... arsenicosum . . . . .	6
..... citricum concretum . . . . .	186
..... muriaticum concentratum . . . . .	188
..... oxygenatum . . . . .	189

	Pag.
Acidum nitri concentratum . . . . .	191
..... nitrico - muriaticum . . . . .	190
..... nitrosum . . . . .	191
..... dilutum . . . . .	192
..... nitricum . . . . .	191 - 193
..... nitrosum . . . . .	191
..... salis dephlogisticatum . . . . .	189
..... succinicum . . . . .	292
..... sulphuricum . . . . .	193
..... aromaticum . . . . .	195
..... dilutum . . . . .	—
..... Tartari crystallisatum . . . . .	196
..... tartaricum . . . . .	—
..... vitriolicum . . . . .	193
• Aconitum Napellus . . . . .	9
..... neomontanum . . . . .	—
• Acorus Calamus . . . . .	10
Adeps Ovis Arietis . . . . .	11
..... Suis Scrofae purificata . . . . .	198
Aër fixus . . . . .	253
... hepaticus . . . . .	254
... inflammabilis . . . . .	—
... mephiticus . . . . .	253
Aerugo Aeris . . . . .	180
..... crystallisata . . . . .	—
Aether nitricus alcoholisatus . . . . .	199
..... sulphuricus . . . . .	—
..... alcoholisatus . . . . .	202
..... camphoratus . . . . .	—
..... cum Alcohole . . . . .	—
• Agaricus chirurgorum . . . . .	29

	Pag.
Alkali causticum . . . . .	312
..... minerale . . . . .	353
..... vegetabile causticum . . . . .	312
Alcohol . . . . .	203
..... absolutum . . . . .	206
..... ammoniatum . . . . .	204
..... camphoratum . . . . .	203
..... dilutum . . . . .	204
..... amarum . . . . .	205
..... antiscorbuticum . . . . .	206
..... purissimum . . . . .	—
..... vini . . . . .	203
..... alcoholisatum . . . . .	206
Allium Ceba . . . . .	12
..... sativum . . . . .	13
Aloë perfoliata . . . . .	14
..... socotorina . . . . .	—
Althæa officinalis . . . . .	16
Alumen . . . . .	162
..... ustum . . . . .	363
Ammonia liquida . . . . .	208
..... præparata . . . . .	347
Ammoniacum sal depuratum . . . . .	107
Ammoniaretum Cupri . . . . .	355
Ammonium carbonicum . . . . .	347
..... muriaticum depuratum . . . . .	107
Amomum Cardamomum . . . . .	16
..... Zingiber . . . . .	17
Amylum seu Fecula Tritici . . . . .	168-169
Amyris Kataf . . . . .	18
Anethum Fœniculum . . . . .	19

	Pag.
Angelica Archangelica . . . . .	20
..... sativa . . . . .	—
Anisum . . . . .	125
Anthemis nobilis . . . . .	21
Antimonium crudum . . . . .	160
..... tartarisatum . . . . .	364
Aqua acetitis ammoniæ . . . . .	—
..... acidi carbonici . . . . .	209
..... nitrici diluti . . . . .	211
..... sulphurici diluti . . . . .	212
..... aëris fixi . . . . .	209
..... aluminosa Batiana . . . . .	343
..... ammoniæ . . . . .	348
..... ammoniæ acetatæ . . . . .	179
..... puræ . . . . .	203
..... Anethi fœniculi . . . . .	214
..... Barytæ . . . . .	337
..... Calcis . . . . .	212
..... Carbonatis ammoniæ . . . . .	348
..... cardiaca . . . . .	213
..... Cari Carvi . . . . .	214
..... corticis fructus Citri aurantii . . . . .	215
..... medicæ . . . . .	—
..... Lauri Cassiæ . . . . .	—
..... destillata . . . . .	214
..... Ferri aërata . . . . .	210
..... fortis . . . . .	192
..... fructus Myrti Pimentæ . . . . .	216
..... marina artefacta . . . . .	215
..... Menthæ crispæ . . . . .	214-216
..... piperitæ . . . . .	215



	Pag.
Aqua Menthæ Pulegii . . . . .	216
..... mineralis acidula . . . . .	—
..... sulphurata . . . . .	217
..... petalorum Rosæ centifoliæ . . . . .	216
..... phagedænica . . . . .	339
..... Pimpinellæ Anisi . . . . .	214
..... Potassæ . . . . .	313
..... purificata . . . . .	217
..... regia . . . . .	190
..... Sapphirina . . . . .	331
..... seminum A. Foeniculi . . . . .	216
..... Super-acetatis Plumbi liquidi . . . . .	332
..... Super-carbonatis Potassæ . . . . .	218
..... Sodæ . . . . .	219
..... vegeto-mineralis . . . . .	332
..... vulneraria . . . . .	250
Arctium Lappa . . . . .	22
Argentum . . . . .	23
Aristolochia Serpentaria . . . . .	24
Arnica montana . . . . .	25
Arsenicum album . . . . .	6
Artemisia Absinthium . . . . .	27
..... Santonica . . . . .	28
Asa foetida . . . . .	62
Aurantiorum poma . . . . .	44
Avena sativa . . . . .	29
Axungia Porci purificata . . . . .	198

## B.

Baccæ Oxycocci . . . . .	171
Balsamum Arcaeï . . . . .	383

	Pag.
Balsamum Pini laricis . . . . .	126
..... liquidum . . . . .	128
..... sylvestris . . . . .	127-128
..... exsiccatum . . . . .	—
Balsamus peruvianus . . . . .	111
..... vitæ externus . . . . .	329
Bardana . . . . .	22
Baryta muriatica . . . . .	277
Boletus igniarius . . . . .	29
Borax officinalis . . . . .	155
Bos Taurus . . . . .	30
Brassica Napus . . . . .	—
Bubon Galbanum . . . . .	31

## C.

Calamus aromaticus . . . . .	10
Calcaria muriatica . . . . .	278
Callicocca vel Cephaëlis Ipeca-	
cuanha . . . . .	32
Calomelas . . . . .	282
Calx . . . . .	34
.... muriatica Bergmanni . . . . .	278
.... Plumbi alba . . . . .	119
.... recens usta . . . . .	34
.... viva . . . . .	—
.... Zinci . . . . .	293
Camphora . . . . .	82
Cancrorum lapilli . . . . .	220
Cannabis sativa . . . . .	34
Cantharides . . . . .	92
Capsicum annuum . . . . .	35

Capsulae seminales Papaveris somni-	
feri . . . . .	124
Carbo ligni . . . . .	36
Carbonas Ammoniae . . . . .	347
..... Calcis . . . . .	37
..... praepratus . . . . .	20
..... Ferri praecipitatus . . . . .	—
..... praepratus . . . . .	221
..... Potassae purissimus . . . . .	351
..... Sodae . . . . .	353
Cardamomum minus . . . . .	16
Carex arenaria . . . . .	58
Carum Carvi . . . . .	—
Carvi semina . . . . .	—
Cascarilla . . . . .	52
Cassia lignea . . . . .	87
..... Senna . . . . .	39
Cataplasma Acetatis Plumbi . . . . .	221
..... acetatum . . . . .	222
..... aluminosum . . . . .	—
..... antisepticum . . . . .	—
..... Cicutae compositum . . . . .	223
..... Conii maculati ammo-	
niatum . . . . .	—
..... Dauci Carotae . . . . .	—
..... discutiens . . . . .	224
..... emolliens, seu domesti-	
cum . . . . .	—
..... fermentans . . . . .	225
..... Nicotianae Tabaci . . . . .	—
..... pus maturans . . . . .	—

	Pag.
Cataplasma sinapium acre . . . . .	226
..... mite . . . . .	—
Catechu . . . . .	102
Cera . . . . .	39
Cera alba . . . . .	—
Cera flava . . . . .	—
Ceratum . . . . .	270
Ceratum Acetatis Plumbi . . . . .	227
..... lapidis calaminaris . . . . .	228
..... Oxy-carbonatis Zinci præ-	
parati . . . . .	—
..... Saturni . . . . .	227
..... simplex . . . . .	228
Cerevisia antiscorbutica . . . . .	—
Ceromel . . . . .	229
Cerussa . . . . .	119
..... acetata . . . . .	181
Cervus Elaphus . . . . .	40
Chamomilla romana seu Chamæmelum	21
..... vulgaris . . . . .	96
Chinæ cortex . . . . .	40
Cicuta major . . . . .	49
Cinchona officinalis . . . . .	40
Cineres clavellati depurati . . . . .	351
Cinnamomum verum . . . . .	88
Citrus aurantium . . . . .	44
..... medica . . . . .	45
Clyster acetatus . . . . .	229
..... adstringens cum Opio . . . . .	—
..... aloëticus . . . . .	230
..... Amyli . . . . .	—

	Pag.
Clyster catharticus . . . . .	231
..... communis . . . . .	—
..... gummi-resinæ F. Asæ foetidæ. . . . .	—
..... nutriens . . . . .	—
..... opiatum . . . . .	232
..... Tabacinus . . . . .	—
..... terebinthinatus . . . . .	—
Cochlearia Armoracia . . . . .	46
..... hortensis . . . . .	47
..... officinalis . . . . .	—
Collyrium Acetatis Ammoniae liquidi . . . . .	233
..... Super-sulphatis Aluminæ et Potassæ . . . . .	—
Colomba . . . . .	48
Colophonium . . . . .	126-127
Conium maculatum . . . . .	49
Convolvulus Jalapa . . . . .	51
Cornu cervi ustum . . . . .	355
Cremor tartari . . . . .	163
Creta præparata . . . . .	220
..... pura . . . . .	37
Croton Eleutheria . . . . .	52
Cuprum . . . . .	54
..... ammoniacale . . . . .	355
..... ammoniacum . . . . .	—
Daphne Mezereum . . . . .	54
Daucus Carota . . . . .	56
..... sativus . . . . .	—
Decoctura Althææ officinalis . . . . .	234
..... antiscorbutica . . . . .	—
..... Arctii Lappæ . . . . .	235

	Pag.
Decoctura Cinchonæ officinalis . . .	235
..... Daphnes Mezerei . . . .	236
..... Furfuris . . . . .	—
..... Hæmatoxyli Campechiani	237
..... Hordei nitrata . . . . .	—
..... ..... per se . . . . .	—
..... Lichenis islandici . . . .	238
..... Lignorum . . . . .	242
..... Malti Hordei acidula . .	239
..... ..... composita	238
..... ..... per se . .	239
..... mucilaginea . . . . .	—
..... Orchidis Morionis aroma-	
tica . . . .	240
..... ..... per se	—
..... Polygalæ amaræ . . . . .	—
..... Quercus aluminosa . . . .	—
..... Rhododendri Chrysanthi	241
..... Salicis composita . . . .	—
..... Specierum Guajaci com-	
positarum	242
..... Spec. Guajac. comp. cum	
Daphne Mezereo . .	—
..... Ulmi campestris . . . . .	243
Digitalis purpurea . . . . .	57
Dulcamara . . . . .	151

## E.

Elæosaccharum A. Fœniculi . . . .	243
..... C. Carvi . . . . .	—
..... Menthæ C. . . . .	—
..... P. Anisi . . . . .	—

	Pag.
Electrum . . . . .	156
Elixir acidum Halleri . . . . .	195
..... paregoricum . . . . .	375-376
Embrocatio vel linimentum Saponis	
rubefaciens . . . . .	243
Emplastrum adhæsivum . . . . .	245
..... ad strumam . . . . .	347
..... cereum . . . . .	247
..... commune . . . . .	245
..... Diachylon simplex . . . . .	—
..... Gummi-resinosum . . . . .	244
..... Lythargyrii . . . . .	245
..... Lyttæ vesicatoriæ . . . . .	244
..... mercuriale . . . . .	246
..... Oxydi plumbi semivitrei . . . . .	245
..... . . . . . comp. . . . .	246
..... . . . . . resinos. . . . .	245
..... Oxy-nitratis Hydrargyri	
et Ammoniaë . . . . .	246
..... saponatum . . . . .	—
..... simplex . . . . .	247
..... T. Meliloti . . . . .	—
Enula Campana . . . . .	78
Extractum amarum . . . . .	247
..... corticis Salicis . . . . .	248
..... Gentianæ luteæ . . . . .	—
..... Glycyrrhizæ glabræ . . . . .	—
..... ligni Hæmatoxyli C. . . . .	—
..... radicis Tormentillæ erectæ . . . . .	—
..... Saturni . . . . .	183
..... turionum Pini . . . . .	243

## F.

Farina . . . . .	149
Fermentum panis : . . . . .	—
Ferri squamæ purificatæ . . . . .	293
Ferrum selectum . . . . .	60
..... sulphuricum crystallisatum	157
Ferula Ammon. . . . .	61
..... Asa foetida . . . . .	62
Ficus Carica . . . . .	64
Flores Sulphuris . . . . .	361
..... Zinci . . . . .	298
Foeniculum . . . . .	19
Fomentum aluminosum . . . . .	249
..... aromaticum . . . . .	—
..... commune cum Muriate am-	
moniae . . . . .	—
..... per se . . . . .	—
..... tepidum . . . . .	250
..... Saponis ammoniatum . . . . .	—
..... compositum . . . . .	—
..... vulnerarium acidum . . . . .	—
Fructus siccati Vitis viniferæ . . . . .	175
Fumaria officinalis . . . . .	65
Furfur . . . . .	168-169

## G.

Gallæ turcicæ . . . . .	133
Gallina domestica . . . . .	124
Gargarisma aluminosum . . . . .	251
..... ammoniatum . . . . .	—
..... antisepticum . . . . .	252





	Pag.
Gummi-resina Lauri Myrrhæ . . . . .	89
..... Stalagmitidis Cam-	
bogioidis . . .	153

## H.

Hæmatoxylon Campechianum . . . . .	70
Hautus acetatis ammoniæ et Sti-	
bii . . . . .	256
..... acidum carbonicum evol-	
vens . . . . .	255
..... camphoratus . . . . .	256
..... guajacinus . . . . .	257
..... opiato-stibiatus . . . . .	—
..... opiatus . . . . .	—
..... salinus effervescens . . . . .	255
..... saponaceus . . . . .	257
..... terebinthinatus . . . . .	258
Hepar Sulphuris . . . . .	259
Hordeum distichon . . . . .	71
Humulus Lupulus . . . . .	72
Hydrargyrum . . . . .	73
..... muriaticum mite . . . . .	282
..... oxydatum rubrum . . . . .	293
..... oxydulatum nigrum . . . . .	300
..... purificatum . . . . .	258
Hydrargyrum muriatus mitis . . . . .	282
Hydro-sulphuretum oxydi Stibii au-	
rantiacum . . . . .	296
..... Potassæ . . . . .	259
Hyosciamus niger . . . . .	76
Hyper-oxydum Arsenici . . . . .	6



	Pag.
Inŭla Helenium . . . . .	78
Ipecacuanha . . . . .	32
Jalapa . . . . .	51
Juniperus communis . . . . .	79
..... Sabina . . . . .	86

## K.

Kali carbonicum . . . . .	351
.... causticum siccum . . . . .	312
.... nitratum . . . . .	289
.... nitricum . . . . .	—
.... præparatum . . . . .	351
.... purum . . . . .	312
.... sulphuratum . . . . .	259
.... sulphuricum . . . . .	358
.... vitriolatum . . . . .	—
Kino . . . . .	81

## L.

Lac . . . . .	36
Lapis Calaminaris præparatus . . . . .	293
..... infernalis . . . . .	287
Laurus Camphora . . . . .	82
..... Cassia lignea . . . . .	87
..... Cinnamomum . . . . .	88
..... Myrrha . . . . .	89
Lavandula Spica . . . . .	90
Lichen islandicus . . . . .	91
Lignum Campechense . . . . .	70
Lunatura Ferri purificata . . . . .	266
Linimentum acetatis Cupri . . . . .	267
..... Acidum vel muriaticum . . . . .	—

	Pag.
Linimentum ad strumam . . . . .	346
..... albuminis ovi . . . . .	268
..... ammoniato - terebinthi-	
natum . . . . .	—
..... ammoniatum . . . . .	—
..... aquæ Calcis . . . . .	269
..... calcareum . . . . .	—
..... camphorato-ammoniatum . . . . .	—
..... muriaticum, vel acidum . . . . .	267
..... resinoso-terebinthinatum . . . . .	269
..... Saponaceum . . . . .	341
..... Saponis rubefaciens v. . . . .	
embrocatio . . . . .	243
..... simplex . . . . .	270
..... sulphurico - terebinthi-	
natum . . . . .	—
..... Super-acetatis Plumbi	
compositum . . . . .	—
..... vel embrocatio Sapo-	
nis rubefaciens . . . . .	243
..... volatile . . . . .	268
Linum usitatissimum . . . . .	91
Liquiritia . . . . .	67
Liquor æthereus oleosus . . . . .	202
..... Etheris nitrosus . . . . .	199
..... alexiterius acetatus . . . . .	385
..... extemporalis . . . . .	—
..... oxygenatus . . . . .	—
..... Ammonii acetici . . . . .	179
..... carbonici aquosus . . . . .	348
..... causticus . . . . .	208

	Pag.
Liquor Ammonii vinosus . . . . .	204
..... Hoffmanni anodynus . . . . .	202
..... van Swietenii . . . . .	338
Lixivium causticum . . . . .	313
Lythargyrum . . . . .	120
Lytta vesicatoria . . . . .	92

## M.

Magnesia . . . . .	271
..... aërata . . . . .	349
..... carbonica . . . . .	—
..... pura . . . . .	271
..... sulphurica . . . . .	158
..... vitrariorum . . . . .	118
Matricaria Chamomilla . . . . .	96
Mel commune purum . . . . .	97
.... cupratum . . . . .	267
.... despumatum . . . . .	271
.... ..... inspissatum . . . . .	—
.... virgileum . . . . .	97
Meloë vesicatorius . . . . .	92
Mentha crispa . . . . .	98
..... piperita . . . . .	99
..... Pulegium . . . . .	100
Menyanthes trifoliata . . . . .	101
Mercurius corrosivus sublimatus . . . . .	279
..... dulcis . . . . .	282
..... præcipitatus ruber . . . . .	293
..... solubilis Hahnemanni . . . . .	300
..... vivus . . . . .	73-258
Mezereum . . . . .	54
Mimosa Catechu . . . . .	102



## N.

Naphtha Vitrioli . . . . .	199
Napus sylvestris . . . . .	30
Nasturtium aquaticum . . . . .	151
Natron præparatum . . . . .	353
Natrum carbonicum crystallisatum . . . . .	—
..... muriaticum . . . . .	110
Nicotiana Tabacum . . . . .	112
N tras Argenti fusus. . . . .	287
..... Hydrargyri liquidus . . . . .	288
..... Potassæ . . . . .	289
..... impurus . . . . .	114
Nitrogenium . . . . .	253
Nitrum depuratum . . . . .	289
..... nativum . . . . .	114

## O.

Oculi cancrorum præparati . . . . .	220
Olea Europea . . . . .	115
..... essentialia, volatilia, destillata . . . . .	291
Oleum empyreumaticum Pini sylv. . . . .	128
..... syl-	
vestris exsiccatum . . . . .	—
..... destillatum Pini sylvestris . . . . .	128
..... olivarum . . . . .	115
..... Succini rectificatum destil-	
latum . . . . .	292
..... Tartari per solutionem . . . . .	352
..... Terebinthinæ . . . . .	128
Olivum . . . . .	115
Opium . . . . .	120
Orchis Morio . . . . .	116



	Pag.
Origanum vulgare . . . . .	117
Oryza sativa . . . . .	118
Ova gallinacea . . . . .	124
Oxy-carbonas Plumbi . . . . .	119
..... Zinci impuri præpa- ratus . . . . .	293
Oxydum Arsenici album . . . . .	6
..... Ferri nigrum purificatum . . . . .	293
..... Hydrargyri nigrum . . . . .	300
..... rubrum . . . . .	293
..... per aci- dum nitricum : —	
..... Manganesii nigrum . . . . .	118
..... Plumbi album . . . . .	119
..... semivitreum . . . . .	120
..... Stibii cum Sub-phosphate Calcis . . . . .	294
..... hydro-sulphuratum præcipitatum . . . . .	296
..... sulphuratum . . . . .	297
..... Zinci . . . . .	298
Oxymel Æruginis . . . . .	267
..... scillinum . . . . .	299
..... simplex . . . . .	—
Oxy-nitras Hydrarg. et Ammoniae . . . . .	300
..... mellitus . . . . .	302

## P.

Papaver somniferum . . . . .	120
Passulæ . . . . .	175
Phasianus Gallus . . . . .	124
Phosphas Calcis stibiatus . . . . .	294



	Pag.
Pimpinella Anisum . . . . .	125
Pinus Abies . . . . .	125
..... Larix . . . . .	126
..... sylvestris . . . . .	127
Piper indicum . . . . .	35
..... longum . . . . .	128
..... nigrum . . . . .	129
..... rotundum . . . . .	—
Pix burgundica . . . . .	126
... liquida nigra . . . . .	128
Plumbum . . . . .	129
..... aceticum . . . . .	181
Polygala amara . . . . .	129
Polypodium Filix mas . . . . .	130
Potassa . . . . .	312
..... liquida . . . . .	313
Potio oxygenata . . . . .	340
Potus acidus mineralis . . . . .	314
..... vegetabilis . . . . .	315
..... ætheris sulphurici alcoholisati . . . . .	—
Prunus domestica . . . . .	131
Pulpa Melimelorum . . . . .	316
..... Pomorum dulcium . . . . .	—
..... Prunorum . . . . .	—
Pulvis absorbens . . . . .	317
..... ad strumam . . . . .	346
..... antimonialis . . . . .	294
..... aromaticus . . . . .	317
..... C. Ipecacuanhæ et Opii . . . . .	318
..... Carbonis acidulus . . . . .	319

Pulvis C. Jalapæ et Muriatis Hydrargyri oxydulati . . .	319.
..... et Super-tartratis Potassæ .	—
..... cort. Quercus Rob. et Anthemidis nobilis . .	320
..... Salicis compositus . . .	321
..... Doveri . . . . .	318
..... escharoticus . . . . .	325
..... Gummi-resinæ Guajaci et Subcarbonatis Ammoniaë . .	321
..... Gummi-resinæ Guajaci et Tartrat. Stib. et Potas. .	—
..... Gummi-resinæ Guajaci opiatum	322
..... Juniperi Sabinæ compositus	—
..... Nitratis Potassæ compositus	323
..... pro suffimento . . . . .	—
..... purgans . . . . .	319
..... Rhei palm. et Mur. Hydrarg. oxydulati . .	323
..... stypticus . . . . .	—
..... Sulphatis Ferri et gummi Kino	—
..... Sulphuris sublimati compositus . .	324
..... Super-sulphatis Aluminæ et Potassæ comp. . .	325
..... Super-tartratis Potassæ et Digitalis purpureæ . .	—
..... Super-tartratis Potassæ et Stalagmitid. Cambog. . .	326
..... vomicus . . . . .	—

## Q.

Quassia amara . . . . .	132
..... excelsa. . . . .	—
Quercus Cerris. . . . .	133
..... Robur . . . . .	134

## R.

Raphanus rusticanus . . . . .	46
Resina liquida . . . . .	126
..... nigra . . . . .	127
..... Succini balsamica . . . . .	327
Rhabarbarum verum . . . . .	135
Rhododendron Chrysanthum . . . . .	137
Rheum palmatum . . . . .	135
Roob baccarum Juniperi communis . . . . .	327
..... Vaccinii Oxycocci . . . . .	328
Rosa centifolia . . . . .	139
..... damascena . . . . .	—
Rubigo Ferri præparata . . . . .	221

## S.

Sabadilla . . . . .	173
Sabina . . . . .	80
Saccharum album . . . . .	140
..... officinarum . . . . .	—
..... Saturni . . . . .	181
Sal amarum . . . . .	158
.... Ammoniacum depuratum . . . . .	107
.... Ammoniacus fixus . . . . .	278
.... anglicus . . . . .	158

	Pag.
Sal communis . . . . .	110
... essentielle Tartari . . . . .	196
... mirabile Glauberi . . . . .	359
... Tartari . . . . .	351
... volatile salis Ammoniaci . . . . .	347
Salep . . . . .	116
Salix alba, amygdalina, pentandra . . . . .	141
Salvia officinalis . . . . .	142
Sambucus nigra . . . . .	143
Santonicum . . . . .	28
Sapo alicantinus . . . . .	144
..... antimonialis . . . . .	328
..... domesticus . . . . .	146
..... niger . . . . .	145
..... oleosus . . . . .	144
..... piceus . . . . .	145
..... sebaceus . . . . .	146
..... stibiatus . . . . .	328
..... terebinthinatus . . . . .	329
..... wologdensis . . . . .	146
Saponaria officinalis . . . . .	—
Scilla maritima . . . . .	148
..... præparata . . . . .	329
Secale cereale . . . . .	149
Sennæ folia . . . . .	39
Serpentaria virginiana . . . . .	24
Serpillum . . . . .	166
Serum lactis vaccinum . . . . .	150
..... acetosum . . . . .	330
..... aluminosum . . . . .	331
..... sinapinum . . . . .	—

	Pag.
Sesamum orientale . . . . .	150
Sevum ovile . . . . .	11
..... vervecinum . . . . .	—
Sinapis nigra . . . . .	165
Sinapis mus . . . . .	226
..... mitior . . . . .	—
Sisymbrium Nasturtium . . . . .	151
Soda purificata . . . . .	353
Solanum Dulcamara . . . . .	151
Solutio Acetatis Cupri et Muriatis am-	
moniae . . . . .	331
..... Plumbi crystallisati-	
fortior . . . . .	332
..... Zinci . . . . .	333
..... Acidi Arsenicosi et Nitratis	
Potassae . . . . .	—
..... muriatici oxygenati va-	
porifera . . . . .	335
..... nitrici vaporifera . . . . .	—
..... alexiteria oxygenata . . . . .	336
..... Arsenitis Potassae . . . . .	—
..... Hahnemanni saponacea . . . . .	7
..... Muriatis Ammoniae acetata . . . . .	337
..... Barytae . . . . .	—
..... Calcis . . . . .	338
..... Hydrargyri oxydati . . . . .	—
..... corrosivus . . . . .	339
..... Mur. Hydrarg. oxydati et Am-	
moniae fortior . . . . .	—
..... Mur. Hydrarg. oxydati et Am-	
moniae dilutior . . . . .	340





	Pag.
Solutio Vini tenuior . . . . .	204
..... vinosus tenuior . . . . .	—
Spiritus Vitrioli . . . . .	195
..... Vitrioli dulcis . . . . .	202
..... tenuis . . . . .	195
Spongia maritima . . . . .	153
..... officinalis . . . . .	—
..... usta . . . . .	345
Stalagmitis Cambogioides . . . . .	153
Stibium præparatum . . . . .	160
..... striatum . . . . .	—
..... sulphuratum nigrum . . . . .	—
Sub-boras Sodæ . . . . .	155
Sub-carbonas Ammoniaë . . . . .	347
..... liquidus . . . . .	348
..... Magnésiaë . . . . .	349
..... Potassæ . . . . .	351
..... liquidus . . . . .	352
..... Sodæ . . . . .	353
Sub-murias Hydrargyri . . . . .	282
Sub-posphas Calcis . . . . .	355
Sub-sulphas Cupri et Ammoniaë . . . . .	355
Succinum . . . . .	156
Succus Cochleariaë officinalis com-	
positus . . . . .	356
..... spissatus Aconiti neomontani . . . . .	357
..... Conii maculati . . . . .	—
..... Hyosciami nigri . . . . .	—
..... Vaccinii Oxycocci cum Nitrate	
Potassæ . . . . .	—
Sulphas Barytæ . . . . .	156

	Pag.
Sulphas Cupri . . . . .	157
..... Ferri . . . . .	—
..... Magnesiae . . . . .	158
..... Potassae . . . . .	358
..... Sodae . . . . .	359
..... Zinci . . . . .	360
Sulphur . . . . .	159
..... auratum Antimonii . . . . .	296
..... stibiatum aurantiacum . . . . .	—
..... rufum . . . . .	—
..... sublimatum . . . . .	361
Sulphuretum Stibii nigrum præpa- raturum . . . . .	160
Summitates Pini . . . . .	125
Super-sulphas Aluminæ et Potassae . . . . .	162
..... fusus . . . . .	363
Super-tartras Potassae . . . . .	163
Syrupus Amomi Zingiberis . . . . .	363
..... Molasses . . . . .	141
..... Scillæ maritimæ . . . . .	364
..... simplex . . . . .	—

## T.

Tartarus emeticus . . . . .	—
..... stibiatus . . . . .	—
..... vitriolatus . . . . .	353
Tartras Stibii et Potassae . . . . .	364
Tartris antimonii . . . . .	—
Terebinthina communis . . . . .	128
..... larigna . . . . .	126
..... veneta . . . . .	—





	Pag.
Unguentum Nitricatum mitius . . .	386
..... ophthalmicum cupratum	—
..... oxydi Hydrargyri ru- brum Tittmanni	294
..... oxy-nitratis Hydrargyri et ammoniæ	381
..... oxy nitratis Hydrarg. et ammoniæ compositum	382
..... Picis aridæ . . . . .	—
..... . . . . liquidæ et Sulphu- ris . . .	—
..... resinosum . . . . .	383
..... simplex . . . . .	—
..... stimulans . . . . .	384
..... sub-oxydi Hydrargyri . .	—
..... sulphuratum : . . . .	384
..... Tartratis Stibii et Potassæ	—

## V.

Vaccinium Oxycoccus . . . . .	171
Valeriana officinalis . . . . .	—
..... sylvestris . . . . .	—
Vapores Acidi acetici . . . . .	385
..... Muriatis Calcis oxygenati .	—
..... oxy-muriatici acidi . . . .	—
Veratrum Sabadilla . . . . .	173
Veronica Beccabunga . . . . .	174
Vinum antimoniale . . . . .	386
..... C. Ipecacuanhæ . . . . .	385
..... Lusitanicum artefactum . . .	386
..... Nicotianæ Tabaci . . . . .	263

	Pag.
Vinum Rhenanum artefactum . . .	386
..... scillites . . . . .	149
..... Tartratis Stibii et Potassæ .	386
Viride aeris crystallisatum . . . . .	180
Vitis vinifera . . . . .	175
Vitriolum album . . . . .	360
..... cœruleum . . . . .	157
..... martis . . . . .	—
Vitrum Antimonii . . . . .	297

## Z.

Zincum . . . . .	175
..... calcinatum . . . . .	298
..... sulphuricum . . . . .	360
Zingiber . . . . .	17

---

# DELECTUS MEDICAMINUM

ALIORUMQUE ADMINICULORUM, E PHARMACEUTICIS CAESAREIS OFFICINIS QUOT ANNIS PROCURANDORUM, ADJECTA EORUMDEM QUANTITATE 2000 MILITIBUS DESTINATA, SUPPOSITO, QUOD DECEM E 100 VALETUDINE TENTENTUR.

<i>Lib.</i>	<i>unc.</i>	
.	6	Acetatis Cupri crystallisati.
3	.	..... Plumbi crystallisati.
.	1	Acidi Arsenicosi, in pulvere.
4	.	..... Muriatici oxygenati.
4	.	..... Nitrico-nitrosi.
6	.	..... Sulphurici.
6	.	Ætheris sulphurici alcoholisati.
20	.	Alcoholis.
10	.	Ammoniae liquidæ.
4	.	Balsami Pini Laricis.
10	.	..... sylvestris.
10	.	..... exsiccati.
.	6	Boleti igniarii præparati.
1	.	Cacuminum Artemisiæ santonicæ in pulvere.
4	.	Camphoræ.
10	.	Ceræ flavæ.
2	.	Conorum Humuli Lupuli in pulvere.
4	.	Corticis Cinchonæ officinalis.

<i>Lib.</i>	<i>unc.</i>	
4	.	Corticis Cinchonæ off. in pulv.
2	.	..... Croti Eleutheriæ in pul- vere
2	.	..... Daphnes Mezerci.
4	.	..... Lauri Cassiæ in pulvere.
10	.	..... Quercus Rob. concisi.
2	.	..... in pulvere:
6	.	..... Salicis concisi.
4	.	..... in pulvere.
15	.	Emplastri gummi-resinosi.
4	.	..... Lyttæ vesicatoriæ.
10	.	..... Oxydi Plumbi semi- vitrei resinosi.
15	.	..... Trifolii Meliloti.
30	.	Extracti amari.
2	.	..... Glycyrrhizæ glabræ.
1	.	..... Mimosæ Catechu in pulvere.
1	.	..... Tormentillæ erectæ.
10	.	..... turionum Pini sylves- tris.
2	.	Ferri limati præparati.
2	.	Florum Arnicæ montanæ.
6	.	..... Matricariæ Chamomillæ.
4	.	..... Sambuci nigræ.
2	.	Foliorum Cassiæ Sennæ.
4	.	..... Salviæ officinalis.
4	.	Fructuum Capsici annui in pul- vere.



<i>Lib.</i>	<i>unc.</i>	
4	.	Fructuum immaturorum Citri Aurantii.
1	.	Gallarum Quercus Cerris.
8	.	Gummi Mimosæ niloticæ in pul- vere.
.	6	Gummi resinæ Aloës socotorinæ.
2	.	..... Asæ foetidæ.
3	.	..... Ferulæ Ammon depuratae.
2	.	..... Guajaci officinalis.
4	.	..... Myrrhæ in pul- vere.
.	4	..... Stalagmitidis Cambogioidis.
1	.	Herbæ Digitalis purpureæ con- cisæ.
4	.	..... Menthæ crispæ concisæ.
1	.	Hydrargyri.
.	6	Hydro-sulphureti Potassæ in pulvere.
8	.	Lichenis islandici concisi.
3	.	Ligni Guajaci officinalis rasi.
3	.	..... Quassiæ excelsæ rasi.
2	.	Lyttæ vesicatoriæ in pulvere.
10	.	Muriatis Ammoniae in pulvere.
.	3	..... Barytæ
1	.	..... Hydrargyri oxydati.
2	.	..... oxydulati præparati.

<i>Lib.</i>	<i>unc.</i>	
.	2	Nitratis Argenti fusi.
10	.	..... Potassæ.
.	3	Olei destillati Menthæ piperitæ.
.	3	..... Origani vulgaris.
.	3	..... Pimpinellæ Anisi.
12	.	..... Pini Laricis, vel sylvestris.
10	.	.... expressi Lini usitatissimi purificati.
.	6	Opii puri.
2	.	Oxy-carbonatis Zinci præparati.
.	8	Oxydi Hydrargyri rubri per aci- dum nitricum.
4	.	..... Manganesii in pulvere.
.	6	..... Stibii cum Sub-phospha- te Calcis.
.	6	..... hydro-sulphurati.
.	3	..... Zinci.
1 $\frac{1}{2}$	.	Oxy-nitratis Hydrargyri et Am- moniaë.
.	4	Potassæ in baculis.
20	.	Radicis Acori Calami concisæ.
2	.	..... in pulvere.
5	.	..... Althææ officinalis con- cisæ.
2	.	..... Amomi Zingiberis.
2	.	..... in pul- vere.

<i>Lib.</i>	<i>unc</i>	
15	.	Radicis Angelicæ Archangelicæ concisæ.
1	.	..... Aristolochiæ Serpenta- riæ concisæ.
1	.	..... Aristolochiæ Serpenta- riæ in pulvere.
3	.	..... Calioccæ Ipecacuan- hæ in pulvere.
4	.	..... Convolvuli Jalapæ in pulvere.
4	.	..... Gentianæ lut. concisæ.
2	.	..... in pulvere.
4	.	..... Glycyrrhizæ glabræ in pulvere.
4	.	..... Inulæ Helenii concisæ.
3	.	..... Orchidis Morionis in pul- vere.
3	.	..... Polygalæ amaræ con- cisæ.
1	.	..... Polypodii filicis Maris in pulvere.
4	.	..... Rhei palmati in pul- vere.
3	.	..... Scillæ maritimæ in pul- vere.
4	.	..... Valerianæ officinalis in pulvere.
4	.	Roob baccarum Juniperi com- munis.

<i>Lib.</i>	<i>unc</i>	
8	.	Sacchari purissimi.
3	.	Saponis oleosi.
1	.	Seminum Amomi Cardamomi in pulvere.
2	.	..... Anethi Fœniculi in pul- vere.
50	.	..... Lini usitatissimi con- tusorum.
10	.	..... Sinapis nigræ in pul- vere.
1	.	..... Veratri Sabadillæ in pulvere.
30	.	Specierum Althææ composita- rum.
50	.	..... aromaticarum.
30	.	..... Guajaci composita- rum.
4	.	..... pro suffimento.
30	.	..... turionum Pini syl- vestris composita- rum.
1	.	Spongiæ officinalis.
2	.	Stipitum Solani Fulcamaræ con- cisorum.
2	.	Sub-boratis Sodæ.
2	.	Sub-carbonatis Ammoniaë.
1	.	..... Magnesiæ.
4	.	..... Potassæ.
1	.	..... Sodæ.

<i>Lib.</i>	<i>unc.</i>	
.	2	Sub-sulphatis Cupri et Ammoniae.
.	6	Succi Aconiti neomontani spissati.
.	6	..... Conii maculati spissati.
.	6	..... Hyosciami nigri spissati.
1	.	Sulphatis Ferri.
12	.	..... Magnesiae astrachanensis.
5	.	..... Potassae in pulvere.
2	.	..... Zinci.
6	.	Sulphuris sublimati.
1	.	Summitatum ramorum Juniperi Sabinæ concisarum.
4	.	Super-sulphatis Aluminæ et Potassae in pulvere.
24	.	Super-tartratis Potassae in pulvere.
1	.	Tartratis Stibii et Potassae.
U T E N S I L I A.		
No 1	.	Bilanx aurichalcea ad $\mathfrak{z}$ iiij.
1	.	..... $\mathfrak{z}\beta$ .
1	.	Bilanx Orichalcea ad gr. j.
1	.	..... eburnea . . . . gr. j.
1	.	Cacabus æneus stanno obductus cum operculo ad 30 lb.
1	.	..... 12 lb.
1	.	..... 4 lb.

Lib. 2	.	Chartæ bibulæ.
... 2	.	..... ceratæ.
5 1	.	Fili serici contorti.
No 3	.	Forfices.
1	.	Infundibulum vitreum.
150	.	Lagenæ semunciariæ ad libram.
1	.	Mensura stannea ad bilibram.
1	.	..... ad selibram.
2	.	..... vitrea a semidrachma ad unciam.
2	.	Mortaria lapidea cum pistillis variæ magnitudinis.
1	.	Mortarium aurichalceum cum pistillo No. 1.
1	.	..... No. 4.
1	.	Mortarium vitreum cum pistillo.
1000	.	Obturamenta suberea variæ ma- gnitudinis.
200	.	Ollæ figulinæ ab uncia ad li- bram.
2	.	Pondera medicinalia cum cap- sulis.
2	.	Sartagines.
2	.	Spathulæ ferreæ.
2	.	Siphones stannei pro clysteri- bus.
4	.	Siphunculi ex toto stannei pro injectionibus.

Quum quantitas medicaminum simplicium præparatorum, et compositorum, secundum hancce ordinationem de Pharmaceuticis Cæsareis officinis depromendorum, sufficiat omnigenis morbis præstituto tempore curandis, nullus dubito, quin MEDICO-CHIRURGI, tum castrenses, quum valetudinarii, ingenio, assiduitate, et intermerato reipublicæ studio conspicui, si adminicula sibi proposita æqui bonique consuluerint, munia sua obire ita possint, ut de patria, humanitate, armigerisque non mediocriter meruisse existimentur: ex adverso, si huicce defuerint officio, irrogatione mulctæ, pœnas luent, pro ratione medicinarum, aliarumque rerum citra præscriptionem, insubide erogatarum.

---

DELECTUS MEDICAMINUM,  
 ALIORUMQUE ADJUMENTORUM, QUAE  
 PRAEFECTURA MILITARIS COMPARARE  
 DEBET.

Acidum aceticum impurum.

Acus minores.

Adeps Ovis Arietis, vel

..... Suis Scrofæ.

Alcohol dilutum impurum.

Aluta alba.

Baccæ recentes Vaccinii Oxycocci.

Butyrum vaccinum.

Carbonas Calcis.

Cerevisia.

Charta emporetica.

..... scriptoria.

Fecula Tritici.

Fructus Pruni domesticæ pro pulpa.

Furfur Tritici.

Lac recens.

Linteum novum.

..... usitatum.

Maltum.

Mel.

Molasses.

Nicotiana Tabacum.



Oleum empyr. Pini sylvestris.

..... empyr. Pini sylvestris ex-  
siccatum.

..... expressum Brassicæ Napi se-  
minum.

..... Oleæ Europææ.

..... Sesami orientalis  
seminum v. aliud simile.

Ova gallinacea.

Piper nigrum.

Radix Allii Cepæ.

..... sativi.

..... Cochleariæ Armoraciæ.

..... Dauci Carotæ.

Saccharum album.

Sapo piceus.

..... sebaceus.

Semina Avenæ sativæ decort:

..... Cannabis sativæ.

..... Hordei distichi.

..... Oryzæ sativæ.

..... Secalis cerealis in pulvere.

Tæniolæ, et plura alia, quæ ad pro-  
curandam rem medicamentariam, præpa-  
rationemque remediorum, et ceterorum  
adjumentorum necessaria sunt; summa ta-  
men legionibus vel majoribus cohortibus,

2000 armigeros numerantibus, supposito, quod (si ratio incolumitatis exercitus habebitur) non plures quam decem e singulis centenis valetudine tentabuntur, nova ordinatione præstituenda, 450 Rubellos nequaquam excedere debet, eosque vel sumtibus legionariis, vel præfecturarum, quibus hæc provincia demandabitur, quotannis, erogandos. Quod cetera, quibus valetudinariis prospiciendum est, spectat, ut amictum, victum ægrotorum etc. hæc eadem summa, quæ hucusque destinabatur, procurari possunt, donec novæ ordinationes aliam agendi normam injunxerint.

Hæ normæ, et permanentibus, et extemporalibus valetudinariis habita semper ægrotorum numeri ratione; præscribi poterunt.

---

М Н Ъ Н І Е

## МЕДИЦИНСКАГО СОВѢТА.

---

Уже нѣсколько вѣковъ признано о фарма-  
необходимо нужнымъ , въ великихъ копѣяхъ  
Государствахъ, при ежедневно уве-вообще.  
личивающемся числѣ естесствен-  
ныхъ и химическихъ произведеній,  
употребляемыхъ въ видѣ цѣлитель-  
ныхъ пособій, издавать законное на-  
черпаніе аптекарямъ , о простыхъ  
средствахъ и способъ приуготовле-  
нія оныхъ. По истиннѣ ни коимъ об-  
разомъ не возможно бы было заго-  
товить почти всѣ роды растѣній и  
споль многія произведенія царства  
животныхъ и ископаемыхъ, копо-  
рымъ опъ времени до времени при-  
писывали цѣлительную силу. Весь-

ма не надежно для врачей и вредно для больныхъ было бы позволить аптекарямъ, при химическихъ приуготовленіяхъ, руководствоваться по собственному ихъ произволу тѣмъ или другимъ способомъ; ибо они весьма между собою разнствуютъ, какъ на прим. приуготовленіе рвотнаго виннаго камня, ртутныхъ извесей и проч. Таковыя лѣкарственныя предписанія или фармакопей должны быть соотвѣтственны пому Государству, для котораго они предназначаются, и преимущественно заключать въ себѣ отечественныя произведенія, наипаче же тогда, когда они свойствами и дѣйствіями своими не только не уступаютъ чужеземнымъ, но еще имѣютъ предъ ними превосходство.

Въ послѣдствіи вспрѣшались побудительныя причины, снабдить особыми фармакопеями нѣкоторыя

Государственныя состоянія, и преимущественно армію и флотъ.

Естьли Медицинское управленіе, О преж-  
во всякомъ Государствѣ, имѣеть о-нихъ Рос-  
бязанность издавать приличную вре-сійскихъ  
мени и обспоятельствамъ фарма-фармако-  
копею, то колыми паче обязанность-пеяхъ.  
сія должна бытъ соблюдаема въ Рос-  
сійской Имперіи, въ обширныхъ пре-  
дѣлахъ кошорой производятся, или  
по крайней мѣрѣ могутъ и должны  
бытъ производимы важнѣйшія лѣ-  
карственныя вещества. Наши врачи  
обратили вниманіе на сей предметъ,  
особенное уваженіе заслуживающій.  
Не говоря о вновь изданной для фло-  
та и для госпиталей при благодѣ-  
тельныхъ заведеніяхъ, фармакопей,  
бывшая Медицинская Коллегія дву-  
кратно сославляла диспензаторіи  
апшекамъ и сдѣлала особый выборъ  
медикаментамъ, по копорому и по  
нынѣ снабжается войско. А дабы се-

му выбору придашь вящую пользу и преподашь наспавленіе въ разномобразномъ его употребленіи, въ 1798 году издана фармакологія, сочиненная Членомъ Медицинскаго Совѣша Докторомъ Элизеномъ.

Сущест- За всѣмъ тѣмъ однакоже, пред-  
венная на- спавилась существенная необходи-  
добностъ мость въ сочиненіи для арміи новой  
въ новой фармакопей. Главнѣйшія основанія  
полевой фармако- сего соспожали въ слѣдующемъ: 1)  
фармако- Химія въ послѣднія 12 лѣтъ имѣла  
пей для важныя преобразованія, и для приуго-  
Россіи. товленія химическихъ тѣлъ откры-  
лись новые способы вошедшіе въ упо-  
ребленіе преимущественно предъ  
бывшими доселѣ; 2) Врачебная наука  
въ печеніи сего времени получила  
значущее приращеніе во вновь от-  
крытыхъ распѣніяхъ и химическихъ  
тѣлахъ; изобрѣтены вовсе новыя  
средства и способы лѣченія, какъ то:  
животная слизь, желудочный сокъ

хищныхъ птицъ, вяжущая корка и камедь изъ Мексики; минеральныя куренія, и искусственное подражаніе минеральнымъ водамъ; 3) необходимость въ настоящихъ обстоятельствахъ, обратиться къ употребленію многочисленныхъ сокровищъ, въ нѣдрахъ отечества заключающихся, и наконецъ 4) опытнось доказавшая возможность сдѣлать значущее збереженіе въ издержкахъ; ибо по внимательномъ разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельствъ, не только съ точностію опредѣлить можно, какіе именно аптечныя матеріялы, но даже въ какомъ количествѣ потребно ихъ будетъ для войска, дабы обезпечить оное во всѣхъ Медикохирургическихъ потребностяхъ.

Г. Дѣйствиельный Спашскій Со- Предпрі-  
вѣтникъ, Лейбъ-Хирургъ Его Им-ятія Гна  
ператорскаго Величества, Глав-Вилліе.

ный Инспекторъ Медицинской части по арміи и Членъ Медицинскаго Совѣта Яковъ Васильевичъ Вилле, руководствуясь изложенными началами, далъ свободный ходъ достохвальному усердію и дѣятельности своей къ общей пользѣ, издавъ новую военную фармакопею. По напечатаніи онъ представилъ ея на разсмотрѣніе Медицинскаго Совѣта, который вмѣняетъ себѣ въ обязанность мнѣніе свое по сему предмету основать на спровергающихъ законахъ истинны; ибо здѣсь дѣло идетъ о пользѣ и облегченіи храбрыхъ защитниковъ отечества.

Содержаніе сочиненія. Новая военная фармакопея раздѣлена на 2 главныя части; первая содержитъ простыя врачебныя шѣла, въпорая наставленіе для сложныхъ, при которыхъ не токмо показаны вѣсы для твердыхъ и мѣра для жидкихъ веществъ, какъ по обыкновен-



но дѣлается, но и помѣщены нѣкоторыя наблюденія, кои, не смотря на ихъ необходимоспѣ, въ другихъ наставленіяхъ не встрѣчаются. Они состоятъ во первыхъ въ таблицѣ, показывающей приемы соопвѣтственно возрасту; во вторыхъ во всеобщихъ замѣчаніяхъ о свойствахъ земли, удобной для произведенія прозябаемыхъ, на врачеваніе годныхъ, о преимуществѣ дико-растущихъ предъ произращенными помощію искусства, о способѣ и времени, какимъ образомъ собирають цвѣты и травы.

Первая часть, относящаяся къ простымъ лечебнымъ тѣламъ, содержитъ не только тѣла сіи взятыя въ строжайшемъ смыслѣ, но и такія, копорыя произведены искусствомъ, съ тѣмъ предметомъ, чтобы преобразованиемъ придасть имъ лечебную силу. Какъ на примъ: уксусъ,

I. О первой части.

самородная мѣдь, ртуть и другіе металлы и полуметаллы, нашатырь, мыло и многія имъ подобныя на ряду съ растѣніями и животными, которыя входятъ въ Матерію Медику. Здѣсь находятся разныя наименованія, данныя имъ Естествоиспытателями и Химиками; по возможности вѣрное показаніе по новѣйшей Натуральной исторіи, къ которому роду Линнеевой системы пошъ или другой корень принадлежишъ, классъ, искусственный и естественный порядокъ, свойства, дѣйствія и силы, признаки неподложности и доброты, способъ употребленія, и наконецъ шѣ составы, въ которыя матеріалъ употребляется.

II. О второй части.

Вторая часть занимается способами приготовленія химическихъ препаратовъ, и направленіемъ лѣкарственныхъ составовъ. Весьма очевидно, сколь великихъ трудовъ

стоило сочинителю, дать вѣрнѣйшую терминологію, на правилахъ новѣйшей Химіи основанную; и дѣйствительно онъ отступаетъ даже отъ многихъ новыхъ авторовъ, вводя обыкновенныя наименованія извѣстнѣйшихъ сочиненій, особливо Россійскія, и объяснивъ ихъ съ большею опредѣлительностію. За симъ слѣдуетъ простой и легкій способъ приуготовленія; иногда же преподается нѣсколько способовъ, какъ то въ самомъ началѣ при Миндереровомъ спиртѣ, названномъ здѣсь *Acetas Ammoniae liquidus*. После того показываетъ свойства, силы, дѣйствія, способъ употребленія, приемы, и гдѣ нужно, тѣ составы, въ которые они входятъ.

Здѣсь присовокупленъ подроб. III. Реест-  
 ный реестръ всѣхъ, въ фармакопееѣ тра.  
 встрѣчающихся наименованій, како-  
 го бы рода оныя ни были, на пошъ

конецъ , дабы и старое и среднихъ  
временъ и новое наименованіе мо-  
жно было найти въ ономъ съ озна-  
ченіемъ, гдѣ именно и прочія на-  
именованія того же лѣкарственнаго  
шѣла находяшся.

Заключеніе состоитъ изъ каша-  
лога , содержащаго выборъ medica-  
ментовъ и другихъ средствъ , ко-  
порыя ежегодно могутъ быть пре-  
букемы изъ казенныхъ аптекъ , съ  
опредѣленіемъ количества на 2000  
человѣкъ войска, на которое число  
въ сложности полагается 200 чело-  
вѣкъ больныхъ.

Замѣча- По таковомъ краткомъ изложе-  
ніи. ній содержанія фармакопей Меди-  
I. Общія. цинскій Совѣтъ почитаетъ нуж-  
нымъ , изъяснить обстоятельно  
мнѣніе свое какъ о всемъ твореніи  
вообще, такъ и о частныхъ пред-  
метахъ онаго. Замѣчанія Совѣта  
будутъ имѣть въ виду сдѣланный въ

средствахъ выборъ, естествослов-  
ныя опредѣленія, химическія приуго-  
товленія, избранную номенклату-  
ру и практическія сужденія сочи-  
нителя; потомъ сдѣлаетъ сличеніе  
между употребляемымъ до сего и  
симъ новымъ лѣкарственнымъ ка-  
талогомъ; такимъ образомъ пред-  
варительныя разсужденія сіи послужатъ  
основаніемъ, изъ котораго  
весьма удобно извлечь заключеніе о  
достоинствѣ сочиненія.

Каждая почти строка являетъ,  
такъ сказать, слѣды того, что со-  
чинитель пользовался наилучшими  
пособіями, безъ которыхъ вообще  
не возможно приступить къ начер-  
танію фармакопей. Нѣтъ ни малѣй-  
шаго сомнѣнія, чтобъ онъ не упо-  
требилъ здѣсь въ пользу всего но-  
ваго и достойнаго вниманія, по се-  
му предмету изданнаго какъ едино-  
земцами его Англичанами, такъ Нѣм-

цами, Испаліянцами, Шведами и Датчанами; ежели мы Французскихъ врачей не спавимъ здѣсь на ряду съ прочими, то сіе происходитъ отъ того, что они въ повѣйшихъ временахъ кромѣ новой системы Химіи, по истинѣ не оказали никакихъ отличныхъ заслугъ врачебной наукѣ; между тѣмъ, какъ прочіе народы видѣ и самое существо ея вовсе преобразовали. Сочинитель со всею опроверженностію показалъ тѣ источники, изъ коихъ онъ почерпалъ истинну своихъ положеній, и тѣмъ самымъ утвердилъ важность и достоинство онаго. Онъ не токмо привелъ здѣсь новыя сочиненія, до Врачебнаго искусства относящіяся, но и древнія всѣхъ временъ, прославившія своихъ Авторовъ, какъ то: Иппократа, Галена, Борсіери, Мида, Коллена, Бюргера, Гофмановъ и имъ подобныхъ.

Часть относящаяся до естественной исторіи обработана съ такою точностію, какъ и все сочиненіе. Но она доказываетъ непосредственно существованіе человѣческихъ свѣденій. Распѣніе, изъ котораго берутъ извѣстный рвотный корень, именовалось до сего *Viola Ipecacuanha*, потомъ *Psychotria emetica*, въ семъ сочиненіи распѣніе сіе названо *Callicossa Ipecacuanha*, какъ называютъ ее Брошерь, между шѣмъ какъ Вильденовъ называютъ ее *Serphaëlis Ipecacuanha*. *Olibanum* именуется согласно съ Форсколомъ *Amyris Kataf*, при чемъ однакожь замѣчается, что другіе называютъ оное *Juniperus Lycia*. Мирра или смирна получается изъ *Laurus Myrrha*: до сего почитали оный произведеніемъ одной изъ мимозъ. Не безизвѣстно въ прочемъ, сколь похвальное стараніе употребилъ сочинитель, что-

II. Относите-  
льно ес-  
тествен-  
ной исто-  
риі.

бы и сей части творенія дать возможную степень совершенства, и сколь охотно онъ вызывается украсить оную вѣщимъ достоинствомъ, издавая впредь прибавленія.

III. Отно-  
сительно  
Химии.

Тоже самое можно сказать и о химической части сего сочиненія. Входя въ разсмотрѣніе и сужденіе оной, должно обратишь вниманіе на два предмета, и. е. со стороны предписанныхъ способовъ химическихъ дѣйствій, и со стороны избранной номенклатуры или наименованій. Выше сего замѣчено уже, что иногда показывается болѣе нежели одно дѣйствіе, но вообще всегда почти пріемлется вѣрнѣйшій и простѣйшій способъ приуготовленія. Несомнѣннымъ доказательствомъ сего служишь приуготовленіе соляной кислоты, разныхъ газовъ и куреній, искусственныхъ минеральныхъ водъ и тому подобнаго. Не лзя не



замѣнить безъ изъясненія отличной благодарности Авибору, что онъ не только главныя, но и полковыя аптеки снабдилъ нужными къ тому снарядами.

Въ разсужденіи номенклатуры должно признасться, что перемѣничивость въ наименованіяхъ, употребляемыхъ новѣйшими Химиками, имѣетъ свои неудобства. Съ нѣкошораго времени они постановили себѣ правиломъ, выражать ими и самыя химическія составныя части; но какъ первые въ семъ родѣ опыты не могли имѣть желаемого совершенства и не заслужили всеобщаго одобренія, то занимались исподоволь улучшеніемъ оныхъ; сіе было причиною, что одинъ и тотъ же самый препаратъ со временемъ получилъ разныя наименованія; а какъ сіе должно приписать настоящему, такъ скажемъ, образованію Химіи, то каж-

дому сочинителю не остается иного средства, какъ следуя сему общему порыву, исполнять долгъ свой, руководствуясь тою номенклатурою, которая болѣе соотвѣтствуетъ принятымъ основаніямъ. Между тѣмъ желательнo бы было, чтобы въ отвращеніе опяточенія памяти и ошибокъ отъ сего производимыхъ, сіи основанія не заслужили одобренія современниковъ. Сколь затруднительно бы было, ежелибъ всѣ ботаническія свойствакакого либо растѣнія спарались выразить наименованіемъ его! Сколько напротивъ того логически, опредѣлительно и выгодно для памяти, употребляемое показаніе родового сходства и разности видовъ (*Congruentia generica et differentia specifica*), которое содержится въ двухъ краткихъ наименованіяхъ, данныхъ растѣнію. Совершенно про-

шивное мы видимъ шеперь въ наименованіяхъ медикаментовъ; сколь они многосложностію своею обширны, и сколь много наименованій получило то же самое шѣло въ короткое время! Нѣкоторыя, безъ всякаго выбора взятые примѣры, послужатъ доспапочноымъ тому доказательствомъ, какъ то: *Pulvis Resinae Guajaci et Tartratis Stibii et Potassae. Pulvis Sulphatis Ferri et Gummi Kino. Acidum nitrico-nitrosum dilutum. Oxydum Stibii Hydro-sulphuratum praecipitatum.* Перемѣнивъ наименованій мы довольствуемся доказать послѣднимъ изъ нихъ, которое въ разныхъ фармакопеехъ имѣетъ слѣдующія названія: въ Прусской *Sulphur Stibiatum aurantiacum*, въ Дублинской *Sulphur Stibiatum rufum*, въ другихъ сочиненіяхъ *Hydro-Sulphuretum Oxydi Stibii aurantiacum*, и наконецъ въ

Россійской фармакопее Sulphur auratum Antimonii. Медицинскій Совѣтъ весьма далекъ отъ того, чтобъ упрекать симъ Авторъ военной фармакопеи, и напротивъ того здѣсь усматриваетъ попечительность и справедливость его суждений. На примѣръ: онъ соблюлъ всю строгость, назвавъ Alkali minerale, Sub-carbonas Sodae, а не Carbonas Sodae, какъ оное называютъ въ Единбургѣ; или Natron praeparatum, какъ въ Лондонѣ; или также Natrum carbonicum crystallisatum, употребляемое въ Берлинѣ. Жженный олений рогъ именуется Sub-phosphas calcis, сѣра желто-сюрмяная Oxydum Stibii Hydro-sulphuratum praecipitatum. Но Авторъ не рѣдко и самъ чувствовалъ затрудненія, причиняемые симъ излишне строгимъ наблюденіемъ, и пошому охотнѣе назвалъ крѣпкій

уксусъ *Acidum aceticum*, а слабый *Acidum aceticum dilutum*, не давъ имъ наименованіе *Acidum acetosum vini destillatum* или *forte*. *Ammonia liquida* предпочелъ онъ другимъ названіямъ, какъ то: *Aqua Ammoniae purae*, *Liquor Ammonii causticus*, *Spiritus Salis Ammoniaci causticus*. По истиннѣ названія почти всѣхъ взваровъ просты и при всемъ томъ значительны. Авторъ заслужилъ бы вящее одобреніе, ежелибъ онъ при другихъ приугошовленіяхъ, наипаче при сложныхъ смѣшеніяхъ, какъ то: порошкахъ, пилюляхъ, мазяхъ и сему подобнаго, держался того же правила.

Поелику намѣреніе Автора клонилось не только къ тому, чшобъ полевымъ аптекарямъ дать наставленіе, для руководства въ выборѣ простыхъ медикаментовъ и въ при-

IV. Относительно пользованія болѣзней.

гоповленіи химическихъ препаратовъ и медико-хирургическихъ формулахъ, но чѣмъ и военнымъ врачамъ, которые не могутъ возить съ собою собранія книгъ, показавъ разнообразное употребленіе принятыхъ средствъ; но необходимо должно коснуться и той важной части пворенія сего, которая занимается показаніемъ силъ и употребленія оныхъ; хотя въ немъ нѣтъ особыхъ записокъ о встрѣчающихся въ войскѣ болѣзняхъ и средствахъ противъ оныхъ въ сочиненіи его находящихся, но сіе опнудъ не можешь почестъся недоспапкомъ, поелику таковыя записки никогда не могутъ имѣть должнаго совершенства. Прилѣжное чтеніе сего сочиненія удостовѣрило Медицинскій Совѣтъ, что какая бы болѣзнь, припадокъ, эпидемія и особенный случай ни встрѣпились, то иску-

снѣй врачъ найдешъ здѣсь найдѣй-  
 ствительнѣйшія средства по нынѣ-  
 шней врачебной наукѣ. Таковое опре-  
 дѣленіе силъ и наставленіе въ упо-  
 требленіи, служатъ новымъ дока-  
 зательствомъ, съ коликою попе-  
 чительностію Авторъ пользовался  
 практическими сочиненіями, и имѣлъ  
 точъ вѣрный взглядъ и практичес-  
 кое чувствіе, кои руководствовали  
 его въ столь важномъ предметѣ. При  
 существующей разности системъ  
 врачебныхъ, сочинитель избралъ  
 вѣрнѣйшій путь: онъ не присталъ ни  
 къ одной изъ нихъ, но принялъ за ос-  
 нованіе слѣдствія, выведенныя изъ  
 ясныхъ разсужденій, сдѣлалъ спра-  
 ведливую оцѣнку уваженія и вѣроя-  
 тія достойныхъ людей, и наиболѣе  
 руководился опытностію. Со спо-  
 роны выраженій Авторъ не менѣе  
 показалъ себя безприспашнымъ;  
 ни одинъ техническій терминъ дре-

внихъ, заключающій въ себѣ существенный смыслъ, не былъ имъ отвергнутъ, такъ какъ и новыя выраженія, однимъ словомъ, онъ избралъ изъ нихъ, кои были опредѣлительныѣ и знаменательныѣ. Такъ наприм: спенія, гиперспенія, аспенія, спенический, аспенический способъ лѣченія, суть выраженія такого рода, что они не только вообще означаютъ болѣзни, но обращающъ вниманіе врача на всѣ болѣзнію одержимыя системы организма, между тѣмъ, какъ до сего времени, для одного только болѣзненнаго соспоянія, а именно для спеническаго, мы имѣли выраженіе *diathesis phlogistica*, которое сверхъ того неправильно, по тому что оно намѣкаетъ на горючее вещество, въ природѣ вовсе не существующее, и едва принимается въ уваженіе одну только систему о теплотѣ животныхъ.



Г. Виллте взялъ на себя трудъ показать тѣхъ писателей, на уваженіи коихъ основано выхваляемое дѣйствіе какого либо средства; но весьма рѣдко ссылается онъ на свои собственные опыты. По истиннѣ онъ скромности своей пожертвовалъ Авторскимъ славолюбіемъ, ибо умалчивая о томъ, что онъ сдѣлалъ множество опытовъ, для коихъ никто другой не имѣлъ столько случаевъ и удобства; Медицинскому Совѣту не безизвѣстна похвальная осторожность, наблюдаемая имъ иначе въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ вмѣсто иностраннаго средства, желалъ ввести отечественное, и не прежде приступалъ къ таковой перемѣнѣ, пока не удостовѣрялъ его въ томъ самые опыты, сдѣланные имъ въ подчиненныхъ ему госпиталяхъ. Сколь велики были его старанія, чтобъ удостовѣрить себя

въ дѣйствіяхъ хмѣля, но не прежде, какъ по многократномъ испытаніи успѣховъ, осмѣлился онъ употребить его въ замѣнъ опиума; однакоже и шушъ Г. Виллие ссылается на Едимбургскую Диссертацію 1803 года.

Авторъ, говоря о хинной коркѣ, замѣчаетъ весьма справедливо, что въ количествѣ спа фунтахъ, едва ли заключается пять фунтовъ настоящей. Тѣмъ болѣе уваженія заслуживало бы напомнить здѣсь, что гораздо лучше употреблять оную въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, выбирая однакоже наилучшіе куски, и оспавя вовсе наружное ея употребленіе. Онъ совѣдуетъ замѣнить ее вешловою, или дубовою коркою, съ цвѣтами ромашки и пряными кореньями. Весьма желательнo бы было, чпобы дѣлаемыми въ госпишальяхъ наблюденіями, именно опредѣлены

были тѣ случаи, въ которыхъ вещества сіи производятъ одинаковое дѣйствіе. Выгода уже весьма велика, ежели они хотя только во многихъ случаяхъ могутъ замѣнить хину. Противъ червей, гнойныхъ язвъ, каменной болѣзни и молочницы, Авторъ совѣтуетъ употреблять морковь; даже и въ губномъ ракѣ сіе средство оказывало весьма великую пользу. При Исландскомъ мохѣ ни мало не упомянуто о смѣшиваніи его съ мукою въ печеніи хлѣба, что въ прочемъ могло бы быть употреблено съ успѣхомъ. Авторъ замѣчаетъ о пользѣ нашатыря, (когого вкусъ для Русскихъ не столь противенъ какъ для прочихъ народовъ), въ пѣнисныхъ поносахъ, и даже въ гнилыхъ горячкахъ. Нѣкоторые сочинители совѣтуютъ употребленіе бѣлилъ въ молочницѣ; но Г. Вилле оное совершенно опро-

вергаетъ ; и по истиннѣ свинцовые препараты суть такого рода яды, кои бывъ поглощены — смертоносны, въ кровообращеніе же безвредно приняты быть могутъ. Лисья ивы имѣютъ такое же дѣйствіе, какъ и самая кора, преимущественно предлагаемая. Все о винѣ вообще сказанное, опредѣлительно и вѣрно. Не нужно ли бы въ прочемъ было изъясниться нѣсколько подробнѣе о разныхъ родахъ употребляемаго вина, какъ то: о вареныхъ Гишпанскихъ и Греческихъ, о крѣпкихъ Португальскихъ, наипаче же о употребляемыхъ въ Южной Россіи Донскихъ, Кавказскихъ, Валлахскихъ и Крымскихъ, и извѣстныхъ вымороженныхъ? Сіи вина хотя и имѣютъ общее наименованіе, однако же въ своихъ силахъ почти столько же различуются между собою, какъ дубовая кора, мускъ, ефиръ и сонное

зелье. Превосходный способъ есть предписаніе морсколуковаго вина.

При укусу, который какъ и всѣ почти, наипаче же распишельныя кислоты, имѣешь ядовитое дѣйствіе на нѣкоторыя сложенія, замѣчаемъ мы, что пропиво-показанія при нѣкоторыхъ шокмо средствахъ сдѣланныя, были бы весьма полезны и при многихъ другихъ. Польза нашатырнаго спирта обширнѣе, нежели каковою она здѣсь показана. Окисленная соляная кислота одобряется Авторомъ болѣе, нежели обыкновенная. Что обѣ сіи кислоты въ цынгѣ дѣлительнѣе прочихъ кислотъ, то доказываютъ опыты Минстерскаго Гофмана; весьма вѣрояшно однакожъ, что при настаивающей цынгѣ. вспрѣчаются случаи, не терпящіе никакой кислоты. Показанныя здѣсь пропивоцынготныя средства просны и дѣй-

ствишельны. Цвѣты красныхъ розъ, будучи нѣсколько разъ въ день употребляемы въ видѣ чая опъ кашля, бывающаго послѣ кровохарканія, споль цѣлишельны, что заслужи-вали бы здѣсь одобреніе.

Подъ главнымъ названіемъ *воды* здѣсь находяпся всѣ прііугошвлелніа, въ сославѣ коихъ заключается большая часпъ воды, какъ то: извеспковая вода, ослабленная сѣрная кислота, морская вода, и имъ подобныя. Сердце - крѣпительная вода есть смѣшеніе изъ алкоголя, сахара и воды, кошорому клюквенный сокъ придаетъ пріятный вкусъ. Здѣсь помѣщено также наспавленіе къ дѣланію искуспвенной морской воды и минеральныхъ водъ, между коими есть: сѣрная баня, кислая вода, и родъ Карлсбадской. Также приларки изъ кашпцы съ уксусомъ; квасцами; съ мукою; пивомъ и камфорою; съ бо-

лиголовомъ; шабакомъ; мягчипельная и гной производящая изъ муки, мыла, меду и луку. — Попомъ *клизтиры* съ уксусомъ; чернильными орѣшками; опиумомъ; дубовою коркою; квасцами опъ упорныхъ поносовъ, мокрошныхъ гемороедовъ, выпаденій задней кишки; сабурные опъ червей; или съ чеснокомъ или сабадильными сѣмянами; другіе же съ крахмаломъ; обыкновенный изъ соли, мыла, ячменнаго декокта, льнянаго масла; пипапельный изъ бульёна и крахмала съ опиумомъ; съ шабакомъ и шерпеншиномъ. Равнымъ образомъ одобряются для многихъ случаевъ *жидкія мази*. *Взвары* показаны здѣсь въ великомъ числѣ: изъ хиннаго порошка, счишая 1 унцъ на 1 фунтъ воды, съ многими припомъ перемѣнами; вообще же предлагается здѣсь 16 примѣсей. Изъ волчьяго плюща, опрубей, ячменя, камфоры, Исланд-

скаго моха: ( $\frac{1}{2}$  унцію на 6 унцовъ воды): ячменнаго солода, салеба, морскаго луку и горькаго изюда, дубовой корки и квасцовъ, кашкары, вепловой корки, бакаупа, и наконецъ Лепсомовъ опваръ изъ ильмовой корки. Пластырей показано здѣсь 8 родовъ. *Екстракт*овъ 6, а именно изъ горечавки, солодковаго корня, кампешеваго дерева, завязнаго корня, ивовыхъ и сосновыхъ оппрысковъ. Изъ *приларокъ* опличаемъ мы преимущественно дѣлаемую изъ квасцовъ для ознобовъ; сверхъ того находящіяся наспавленія къ дѣланію ихъ съ нашатыремъ и уксусомъ, водою; пузырь съ теплою водою, изъ мыла и Миндерерова спирта; наконецъ Теденову поспрѣльную воду, гдѣ вмѣсто сахара предписывается медъ. Споль же обильны и для всѣхъ разнообразныхъ случаевъ исчислены и прочія спашьи, какъ то: припарки,



разные роды гасовъ; нѣсколько перемѣненный Риверіевъ напитокъ, настойки, коихъ составныя части выбраны съ разсудительностію, ибо летучія части не терпятъ ни малѣйшаго варенія, другія же на пропивъшаго извлекающа дѣйствіемъ сильнаго огня, и слѣдовательно должны быть варимы. За симъ слѣдуютъ *и мазей* и *то микстуръ*, мѣсто не позволяюща намъ входить въ частное разсужденіе объ каждой изъ нихъ. При соленокислой тяжелой землѣ показаны нѣкоторыя обстоятельства, воспреещающія употребленіе оной; въ прочемъ она можетъ быть употребляема не только въ тѣхъ случаяхъ, кои здѣсь исчислены, но и во многихъ другихъ какъ на прим. при ипохондрическихъ припадкахъ нервовъ, въ коихъ она производитъ въ больномъ желаемое чувство облегченія и веселости. Должно также замѣ-

нишь, что способъ приутопвленія сего цѣлительнаго средства весьма важенъ; ибо по нѣкопорымъ методамъ оно спановилося совершеннымъ ядомъ. Спанъи подъ названіемъ Murias, о адскомъ камнѣ, селипрѣ, не менѣ полезны. Изъ перегнаныхъ маслѣ находилося здѣсь перечной мясы, Донскаго можжевельника, аниса, можжевеловыхъ ягодъ, Ямайскаго перца. Похвала о янтарномъ маслѣ здѣсь, кажется, нѣсколько увеличенною въ отношеніи онаго до женскихъ болѣзней. Окислы (Oxuda) составляютъ также новое главное отдѣленіе. Желѣзныя опилки должны быть очищаемы магнишомъ. Ни единая замѣчательная извѣсть не пропущена, даже и спекловадая сюрма, копорая въ прочемъ для того только, кажется, описана, что идесть въ другіе препараты. Цинковая извѣсть

предлагается отъ 1 до 8 грановъ въ падучей болѣзни, и въ наружномъ употребленіи отъ заворачиванія рѣсницъ (Trichiasis). При Ганемановой ртутіи діэпа обстоятельно показана, воспрещая припомъ употреблять предъ нѣмъ яблоки. Лихорадка отъ ртутныхъ средствъ здѣсь подтверждается. *Пилюль* означено 15 родовъ для разнообразныхъ намереній. Новыя изъ нихъ суть нѣ, которыя приуготовляются изъ хмѣля; изъ 2 скрупуловъ порошка дѣлаюшъ съ хлѣбомъ или сиропомъ 30 пилюль, ихъ дается по 2 или по 3 въ нѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе выхваляюшъ дѣйствіе опиума. — Предписываемые 8 родовъ *литъя* дѣлаюшся или съ разными кислотами или съ эфиромъ. Яблочный мякишъ для глазной мази; вмѣсто шамариндовъ, черносливная кашка. 15 родовъ *порошковъ*, разнообразны какъ выбо-

ромъ средствъ, такъ и употребленіемъ оныхъ. Въспомогая хины предлагается дубовая кора съ цвѣтами ромашки по 1 скрупулу каждой.

Заключе- Медицинскій Совѣтъ предс-  
 ніе. вилъ споль многія доказательства  
 что сія фармакопея достаточно из-  
 обилуетъ медикаментами и слож-  
 ными пѣлами, коихъ сила и дѣйстви-  
 е признаны, такъ, что не можемъ  
 въспрѣпятъ случаю, въ которомъ  
 бы армейскіе врачи не могли по-  
 черпнуть достаточныхъ наставле-  
 ній, оканчивающъ симъ свои рассу-  
 денія. Все, что Матерія Медика,  
 Химія и практическая опытность  
 искусныхъ врачей намъ предска-  
 зываютъ, конечно здѣсь находясь,  
 въ точномъ смыслѣ и вкусѣ нынѣ-  
 шняго образа преподаванія. Но пре-  
 имущественное достоинство сочи-  
 ненія сего состоитъ въ предпочте-  
 нии отечественныхъ дѣйствитель-

ныхъ средствъ и въ сипараніи дока-  
зашъ великую ихъ пользу. Такъ на  
прим: находимъ мы здѣсь дубовую  
и ивовую корку, хмѣлевья почки,  
горечавку, ромашку и имъ подоб-  
ныя, кои совершенно могутъ замѣ-  
нить подложную хину, драгоцѣн-  
ную каскариллу, ангустуру, копо-  
рая часно бываетъ ядовиша, и даже  
самый опіумъ.

Сколь ни многочисленны соѣспа-  
вы, при всемъ томъ однако число  
простыхъ средствъ, опускаемыхъ  
въ армейскія аптеки, весьма ограни-  
чено. Новая фармакопѣя содержитъ  
132 спашьи; прежній каталогъ раз-  
рѣшалъ требованіе на 115. Сей из-  
лишекъ, изъ 17 спашей состоящей,  
самъ по себѣ споль малозначущъ и  
найденъ необходимымъ; ибо доселѣ  
куренія, морская вода и искусствен-  
ныя минеральныя воды и пому по-  
добное, были вовсе неизвѣстны. Всѣ

они вмѣстѣ съ многими другими вновѣ изобрѣшенными вещесивами украшають сіе твореніе. Въ особенности же заслуживають уваженіе значущее сбереженіе расходовъ. Прѣжде сего армейскіе, наипаче же госпитальные врачи чинили прѣбыванія по произволу своему, и самое количесиво нѣкоторыхъ вещей какъ то: уксуса, вина, воску и проч: не было надлежащимъ образомъ ограничено. Все сіе приведено нынѣ въ такое устройсиво, каковаго можно было желать при настоящей опышности. Здѣсь присовокуплено прибавленіе, въ которомъ опредѣлено, какое количесиво можетъ быть опущено на корпусъ, изъ 2000 чловѣкъ состоящій; на основаніи коего весьма легко можно сдѣлать расчисленіе для большаго или меньшаго корпуса. А какъ опытъ научаетъ насъ, что едва 10 солдатъ заболѣ-

ешъ, слѣдовательно изъ 2000 чело-  
вѣкъ не болѣе 200 человекъ, и пое-  
лику въ госпиталяхъ не встрѣча-  
ется иныхъ болѣзней, каковыя бы-  
ваютъ въ армейскихъ лазаретахъ,  
по основываясь на семъ, весьма лег-  
ко можно сдѣлать смѣшу на госпи-  
таль, 600, 800 или 1000 постелей со-  
держащую.

Медицинскому Совѣту остается  
только желать, чтобъ сіе творе-  
ніе было переведено на Россійскій  
языкъ, ибо нѣкоторые изъ вра-  
чей; наипаче же изъ аптекарей не  
имѣютъ въ Латинскомъ языкѣ до-  
вольно свѣдѣній, чтобъ сей полн-  
ко обработанный и не простой  
слогъ, могли понимать надлежа-  
щимъ образомъ.

Медицинскій Совѣтъ вмѣняетъ  
себѣ въ удовольствіе объявить здѣсь  
по всей справедливости, что Гнъ  
Вилліе симъ сочиненіемъ не только

оказалъ весьма важную услугу Россійскому войску, Военному и Главному Медицинскому Управленію; но по всѣмъ вѣрояніямъ пріобрѣнешь уваженіе просвѣщенныхъ врачей всѣхъ чужеспиранныхъ Государствъ.

По опредѣленію Медицинскаго Совѣта въ собраніи 1 Іюля 1808 года, подписали :

Деканъ Докторъ *Валлеріанъ*.

Членъ и Ученый С. *Уденъ*.

---













